RB53400

UNIVERSITY OF
TORONTO LIBRARY

The
Jason A. Hannah
Collection
in the History
of Medical
and Related
Sciences

E.H

TRAITÉ
D'ANATOMIE
DESCRIPTIVE.

TRAITÉ D'ANATOMIE DESCRIPTIVE

De Xav. BICHAT,

Médecin du Grand Hospice d'Humanité de Paris,
Professeur d'Anatomie et de Physiologie.

TOME QUATRIÈME,

Par M. F. R. BUISSON.

A PARIS,

Chez { Brosson, Libraire, rue Pierre-Sarrazin, n°. 6;
Gabon et Cie, Libraires, place de l'École de Médecine.

AN XI. (1803.)

DISCOURS

PRÉLIMINAIRE.

Nous terminons enfin le travail entrepris par Bichat, et nous acquittons envers le public l'engagement que nous avions contracté de ne point laisser incomplet un ouvrage dont les premières parties avoient été accueillies avec un empressement si unanime, dont la fin étoit attendue avec tant d'impatience. On conçoit facilement combien cette disposition des esprits étoit propre à nous rendre onéreuse une tâche que l'amitié et la reconnoissance nous eussent fait trouver d'ailleurs très-légère. Il est pénible de succéder de quelque manière que ce soit à un homme qui par ses talens avoit acquis une confiance aussi générale, et ses continuateurs doivent s'attendre à un jugement d'autant plus sévère, que les rapprochemens et les comparaisons seront plus faciles. En vain donc nous solliciterions ici l'indulgence du lecteur, il ne seroit point disposé à nous l'accorder, et nous n'aurions aucun droit pour l'exiger de lui. Disons seulement que nous n'avons rien négligé pour éviter une disproportion trop grande entre nous et notre modèle, que ne pouvant offrir autant

de richesses, nous avons fait nos efforts pour offrir la même exactitude, et du reste ne soyons point surpris si dans ce monument élevé à la gloire de notre ami commun, on reconnoît et la main habile qui le commença et les mains plus foibles qui l'ont achevé.

Ce ne sera point d'ailleurs sur quelques différences inévitables de rédaction et de style que les esprits justes et éclairés porteront ici leur attention principale. Ils examineront si la marche de l'auteur a été suivie, si l'on a été fidèle au plan général de l'ouvrage, ou si on s'est fondé sur des raisons solides pour s'en écarter quelquefois sur des points de peu d'importance. Ils examineront si l'on s'est conformé à l'esprit de Bichat pour la précision et la clarté de la méthode descriptive, si on a imité son exactitude dans l'observation des faits et sa sévérité dans les inductions. C'est là effectivement tout ce qu'on peut nous demander, c'est la seule espèce de critique à laquelle nous devions nous attendre, la seule que nous ayons dû prévoir et tâcher de prévenir. Sans doute on regrettera plusieurs découvertes intéressantes, plusieurs vues lumineuses dont Bichat auroit enrichi la dernière partie de son ouvrage s'il y eût travaillé lui-même; mais ces regrets, ce sera nous qui les formerons les premiers, puisque personne n'est plus que nous à portée d'en sentir toute l'étendue et d'en apprécier tous les motifs.

Nous avions espéré terminer cet ouvrage beaucoup plus tôt ; nous avions même annoncé, en publiant le troisième volume, que le dernier pourroit servir aux jeunes gens pour les dissections de l'hiver où l'on entroit alors. Mais tous ceux qui cultivent l'anatomie savent combien, dans les travaux relatifs à cette science, il est difficile de ne pas se tromper quand on calcule le temps. La précipitation est ici plus encore que par-tout ailleurs, inconciliable avec l'exactitude, et on ne nous pardonneroit pas sans doute d'avoir défiguré ou tronqué l'ouvrage de Bichat sous le vain prétexte de satisfaire un peu plus tôt la juste impatience du lecteur.

Les mêmes considérations nous ont engagés à ne pas avoir égard d'une manière trop scrupuleuse au nombre des volumes. On s'étonnera peut-être d'en voir paroître deux, au lieu d'un seul que nous avions annoncé. Mais nous n'étions point les maîtres de resserrer à volonté le sujet qui nous restoit à traiter. Pour suivre l'esprit de l'auteur, il falloit, 1°. tâcher de décrire les objets déjà connus avec plus de clarté et de soin qu'on ne l'avoit fait encore; 2°. faire de nouvelles recherches sur plusieurs organes trop superficiellement décrits, et en exposer le résultat; 3°. ne point oublier les considérations physiologiques locales qui se trouvent si souvent liées d'une manière nécessaire avec les détails anatomiques. En un mot, ce n'étoit point notre ou-

vrage, mais l'ouvrage de Bichat que nous avions à terminer, et quoique l'auteur, peu accoutumé à préparer d'avance ce qu'il se proposoit de faire, ne nous eût laissé aucuns matériaux, nous devions marcher autant qu'il se pouvoit sur la même ligne que lui, et suivre le plan qu'il avoit tracé dans les volumes déjà publiés. Bichat lui-même avoit annoncé dans une foule d'occasions qu'il devoit présenter *un grand nombre de faits et de considérations nouvelles* dans les articles de la respiration, de la circulation, des sécrétions; et ceux qui ont été formés à son école savent assez qu'il tint toujours beaucoup plus qu'il n'avoit promis. On peut donc être assuré que cette dernière partie de son travail, auroit eu sous sa plume beaucoup plus d'étendue encore que sous la nôtre, et tous ceux qui s'intéressent aux progrès des sciences ne trouveront ici qu'un motif de plus à leurs regrets.

Ces deux volumes comprennent six parties, 1°. l'appareil respiratoire; 2°. l'appareil circulatoire; 3°. l'appareil absorbant; 4°. les appareils sécréteurs; 5°. l'appareil de la génération; 6°. l'histoire du fœtus. Les trois dernières parties formant le cinquième volume ont été traitées par M. Roux. Je dirai un mot sur la marche que j'ai suivie en traitant les trois premières.

L'appareil respiratoire ne consistant, à proprement parler, qu'en deux organes, il semble que sa

description devoit être la partie la plus courte de mon travail, d'autant plus que je ne prétendois point y comprendre, comme on l'a fait quelquefois, la théorie de la respiration. Mais ces organes sont sujets à beaucoup de variations dans leur volume, dans leur forme, dans leur couleur, etc., selon les divers temps de la fonction qu'ils remplissent. Leur structure très-compliquée comprend, outre la membrane qui enveloppe chacun d'eux, plusieurs ordres de vaisseaux, deux ordres de nerfs et enfin un tissu propre. Il falloit insister sur tous ces objets dont plusieurs avoient été examinés assez superficiellement. C'est à quoi je me suis attaché, et c'est ce qui a donné à cet article un peu plus d'étendue qu'on ne s'y attendroit d'abord.

L'appareil circulatoire beaucoup plus considérable comprend, 1°. le cœur; 2°. le système artériel; 3°. le système veineux.

On sait qu'aucun organe n'a été étudié avec plus de soin que le cœur. J'ai donc eu peu de chose à ajouter ici au travail des anatomistes déjà connus; seulement j'ai insisté un peu plus sur l'organisation du péricarde, sur celle de différentes parties du cœur envisagées isolément, enfin sur le mécanisme des mouvemens de cet organe et sur le rôle que joue chaque partie dans ces mouvemens. Les considérations nouvelles qu'on trouvera répandues dans ces divers articles appartiennent pour la plupart à

Bichat et seront facilement reconnues par tous ceux qui ont suivi quelque temps ses cours.

Il y avoit moins encore à ajouter à l'exposition du système artériel sur lequel divers auteurs, et spécialement Haller, ont fait des recherches si profondes et si multipliées. Je n'ai donc eu le plus souvent ici qu'à constater par une observation nouvelle des faits déjà connus, sauf quelques variétés dans la disposition de plusieurs vaisseaux particuliers, variétés que j'ai indiquées lorsque l'inspection cadavérique me les a offertes.

Il n'en étoit pas tout-à-fait ainsi du système veineux sur lequel on glisse pour l'ordinaire assez légèrement soit dans les cours, soit dans les traités manuels d'anatomie. Bichat remarquoit qu'en particulier la description du système veineux cérébral avoit été presqu'entièrement négligée, et annonçoit dans son Anatomie générale l'intention de travailler à remplir cette lacune. Mais il n'avoit point encore commencé ce travail; il a donc fallu le faire tout entier. Ceci demandoit du temps, et ce n'est pas une des moindres raisons du retard qu'a éprouvé la publication de ce volume.

Quant à l'appareil absorbant, je ne dissimulerai pas qu'ici beaucoup plus qu'ailleurs j'ai profité des descriptions données par les meilleurs auteurs, et spécialement par Mascagni. Toute autre marche eût été téméraire et même impossible. Il faudroit plu-

sieurs années pour réitérer, même grossièrement, les recherches pénibles faites sur ces ordres de vaisseaux par d'illustres anatomistes qui y ont consacré la meilleure partie de leur vie, et pourroit-on sans une présomption outrée se permettre de juger leurs travaux après une vérification aussi imparfaite? Ces monographies anatomiques, aussi-bien que les monographies médicales, doivent être considérées comme des matériaux préparés d'avance par des hommes laborieux pour servir à des ouvrages plus étendus, et il est aussi naturel de les employer dans un traité complet, pourvu qu'on le fasse avec choix et discernement, qu'il l'est à celui qui écrit l'histoire de puiser dans les mémoires de ses prédécesseurs ou de ses contemporains. D'ailleurs, il faut le dire, l'appareil absorbant est de toutes les parties de l'anatomie celle où il est le moins nécessaire d'insister rigoureusement sur les détails particuliers; l'essentiel est de se former une image exacte de l'ensemble des vaisseaux et des termes où ils aboutissent en se réunissant. C'est là le seul but que le plus grand nombre des étudians peut se proposer, et l'impossibilité où l'on est dans les amphithéâtres de se procurer ici le secours habituel de l'inspection cadavérique rend les descriptions trop détaillées non-seulement fastidieuses, mais inintelligibles. C'est à ces considérations que j'ai eu égard, et ma principale attention a été de favoriser dans l'esprit des lecteurs la formation de

cette image collective, quoique exacte, de l'appareil absorbant. Dans cette vue, j'ai cru devoir suivre l'ordre naturel de la disposition des vaisseaux et les examiner depuis les rameaux jusqu'aux troncs. Cette méthode n'avoit point ici l'inconvénient qu'elle auroit eu dans l'exposition du système veineux, où un grand nombre de vaisseaux doivent être décrits chacun en particulier.

Il m'eût été très-difficile de suffire seul à remplir la tâche longue et pénible dont j'étois chargé. La nécessité de recourir sans cesse à l'inspection cadavérique sur les objets même les plus connus, le temps considérable que demandoient des rédactions dans lesquelles il falloit réunir la concision la plus rigoureuse à l'exactitude et à la clarté, enfin le danger de s'en rapporter exclusivement à soi dans les recherches nouvelles qu'il y avoit à faire sur plusieurs organes, tout m'obligeoit à m'aider d'un secours étranger. Je l'ai trouvé, ce secours, dans mon excellent ami, M. Fizeau. Ce jeune médecin, dont l'École de Paris a reconnu solemnellement le mérite en lui faisant partager cette année les honneurs du premier prix, s'est rendu plus recommandable encore depuis par ses *Recherches pour servir à l'histoire des fièvres intermittentes*, ouvrage rempli des faits les plus curieux, des vues les plus solides, et vraiment nécessaire désormais à quiconque voudra étudier avec succès ces maladies sous le

point de vue soit nosographique, soit pratique (1). L'auteur qui avoit déjà pris part aux travaux anatomiques de Bichat, a bien voulu partager aussi les miens, et il m'est doux de reconnoître ici que je dois à sa sagacité dans l'observation, la découverte de plusieurs faits qui peut-être m'auroient échappé sans lui.

On se tromperoit d'ailleurs si l'on croyoit que M. Roux et moi nous ayons été entièrement isolés l'un de l'autre dans notre travail respectif. Nous nous sommes communiqué mutuellement tous les faits remarquables qui se sont présentés ; plus d'une fois nous les avons vérifiés ensemble, et toujours nous nous sommes concertés pour partir des mêmes principes et pour suivre en général le même ordre.

Cet ouvrage sera probablement le dernier publié sous le nom de Bichat. Mon projet avoit d'abord été de présenter en abrégé, sous le titre d'*Œuvres posthumes*, la doctrine du même auteur sur l'anatomie pathologique et sur la matière médicale. Quelques matériaux qu'il a laissés, et surtout ses leçons recueillies par un grand nombre d'élèves, pouvoient servir à ce travail que diverses personnes m'ont pressé vivement d'entreprendre. Mais de très-

(1) Voyez le témoignage que lui rend M. Pinel dans la nouvelle édition de la *Nosographie philosophique*, tome III, page 526.

fortes raisons m'en ont détourné. Bichat avoit vraiment ouvert une route nouvelle en anatomie pathologique en distinguant le premier les maladies des tissus et les maladies des organes, en développant mieux qu'on ne l'avoit fait les avantages des ouvertures cadavériques, et en donnant des règles à suivre dans ce genre d'étude. Lui-même avoit parcouru une partie de la carrière et enrichi la science de plusieurs faits nouveaux. Cependant il ne croyoit pas pouvoir encore mettre au jour le fruit de ses recherches. Il sentoit qu'en traitant pour la première fois un sujet aussi étendu, il avoit été comme impossible de ne pas laisser échapper bien des erreurs, qu'une observation longue et réitérée des altérations organiques pouvoit seule servir de base à des principes solides, et qu'en se pressant trop on risquoit de généraliser mal-à-propos des assertions qui ne convenoient qu'à certains faits particuliers. Il savoit aussi par expérience que pour exposer avec quelque utilité les changemens produits par les maladies dans le tissu des organes, il faut fixer en même temps les caractères et les phénomènes essentiels des maladies elles-mêmes ; que par conséquent un traité d'anatomie pathologique devient nécessairement et pour ainsi dire sans qu'on s'en aperçoive, un traité nosographique, ce qui exige de la part de l'auteur une étude clinique longue et réfléchie. Si ces considérations ont retenu Bichat, ne doivent-elles pas à

plus forte raison nous retenir encore ? Seroit-ce honorer dignement sa mémoire que d'aller directement contre ses intentions en publiant un travail qu'il jugeroit lui-même imparfait ? Non sans doute, et cette entreprise seroit d'autant moins utile que déjà depuis Bichat l'anatomie pathologique, cultivée de toutes parts avec une prodigieuse activité, a fait des progrès inattendus et se trouve augmentée d'un grand nombre de découvertes. Je sais que Bichat fut le principal agent de cette impulsion générale, que presque par-tout on suit, sauf quelques légères modifications, le plan qu'il a tracé et les principes qu'il a établis, quelquefois même sans lui en rendre aucun hommage. Mais toute l'École est instruite de ce fait. La doctrine de Bichat, soutenue avec honneur dans plusieurs dissertations particulières (1), est aisément reconnue par le moindre élève par-tout où elle est enseignée, d'autant plus qu'il est facile de retrouver dans l'*Anatomie générale* tous les principes fondamentaux de la marche qu'on suit aujourd'hui en anatomie pathologique.

Ce que je viens de dire s'applique avec plus de

(1) Parmi ces dissertations je dois citer spécialement, 1°. celle de M. Gasc sur *la Fièvre puerpérale*, 2°. celle de M. Garnier sur *les Hémorrhagies*, 3°. celle de M. la Halle sur *l'Inflammation du Système séreux*, 4°. celle de M. Hay sur *les Affections du Système muqueux*.

raison encore au travail de Bichat sur la matière médicale. Occupé à étudier les médicamens moins sous le rapport de leur composition que sous celui de leur action soit directe, soit sympathique, écartant avec soin toutes les fausses théories dont la médecine se trouvoit ici surchargée, et profitant avec la plus grande sagesse des facilités qu'il trouvoit à l'Hôtel-Dieu pour s'instruire par la voie d'une expérience positive, il étoit déjà parvenu à fixer de très-importantes vérités pratiques. On le voyoit avec une satisfaction inexprimable porter la lumière dans cette science si utile et cependant jusqu'alors si confuse et si incertaine. Mais la mort l'arrêta lorsqu'il n'avoit encore parcouru qu'une petite partie de cette nouvelle carrière. Les principes généraux qu'il avoit établis et les développemens les plus importans qu'il en avoit donnés se trouvent consignés dans la dissertation de M. Pairier sur les émétiques, et dans celle de M. Gondret sur les purgatifs. Ce qu'on pourroit recueillir de plus ne formeroit que des articles incomplets sur lesquels, d'après Bichat lui-même, il y avoit encore plusieurs faits à vérifier ou à découvrir.

Je le répète, la meilleure et même la seule manière de rendre à la mémoire de Bichat de dignes hommages, c'est de respecter les dernières intentions que Bichat avoit clairement manifestées. Or ces intentions étoient de ne rien imprimer sur l'ana-

tomie pathologique et sur la matière médicale avant d'avoir réitéré ses recherches et fait disparoître quelques erreurs qu'il reconnoissoit ou qu'il soupçonnoit dans ce qu'il avoit déjà enseigné de l'une et de l'autre science. Les esprits justes et droits voudront bien en croire un témoin fidèle à qui Bichat avoit accordé sa confiance la plus intime et qui connoissoit d'autant mieux les projets de son ami, qu'il devoit coopérer à leur exécution.

Eh! quel champ n'ouvriroit-on pas à ces critiques amers et injustes qui ont attaqué en tant d'occasions les points les plus solides de la doctrine de Bichat, si l'on offroit à leur censure des fragmens que Bichat critiquoit tout le premier! Que ne diroient-ils pas contre un ouvrage nécessairement défectueux sous plusieurs rapports, puisqu'encore aujourd'hui on les voit traiter avec un mépris affecté les ouvrages que l'auteur avoit travaillés avec le plus de soin, nier hardiment les vérités qu'il avoit le mieux constatées, traiter d'*imaginaires* des expériences faites aux yeux de plus de deux cents personnes, et répétées sous les yeux de l'Ecole elle-même (1); enfin qualifier d'*opinion puérile et ridicule* une classification fondée sur l'observation la plus simple et qui sert aujourd'hui de base à la plus belle partie

(1) On sait que Bichat avoit réitéré ses principales expériences devant MM. Hallé et Duméril.

du système des connoissances anatomiques et médicales (1) !

Ce n'est point au reste sur quelques points particuliers de doctrine qu'on s'est contenté d'attaquer Bichat dans ces derniers temps. Plusieurs qui, pendant sa

(1) Il s'agit ici de la division des membranes en trois classes et des caractères généraux par lesquels ces trois classes sont distinguées entre elles. Ces caractères ont paru sensibles, évidens à tous ceux qui ont lu avec quelque attention l'Anatomie générale. Cependant on a prétendu les nier dans un Mémoire physiologique publié après la mort de Bichat. L'auteur de ce Mémoire se fonde sur quelques différences d'espèce, d'organisation, de sensibilité que présente la membrane muqueuse du conduit alimentaire selon les divers organes où on l'examine, quelquefois même sur divers points d'un seul organe, et particulièrement de l'estomac. Il conclut que *les membranes muqueuses ne sont point une continuation de la peau*, que ce n'est point une membrane unique et de même nature qui tapisse les voies alimentaires dans toute leur étendue.

Mais d'abord, dire que les membranes muqueuses ne sont point une continuation de la peau parce qu'elles ne ressemblent pas tout-à-fait à la peau, c'est s'appuyer sur un raisonnement faux pour nier un fait évident. Dire que les membranes muqueuses diffèrent beaucoup de la peau, c'est affirmer une vérité que personne ne conteste. Bichat a dit simplement que ces membranes *naissent primitivement de la peau, communiquent entre elles par la peau, se con-*

vie, gardoient sur lui un profond silence, ou même lui prodiguoient des éloges, n'ont plus observé de ménagemens depuis sa mort et se sont efforcés de le représenter comme un esprit brillant, mais superficiel, dont la réputation éphémère ne devoit point s'étendre au-delà du tombeau; comme un écrivain

---

tinuent avec la peau, etc; il n'a dit nulle part que ces membranes fussent la peau elle-même. Il est vrai qu'il a montré des *analogies* frappantes de structure, de phénomènes et d'usages entre l'organe cutané et les membranes muqueuses, mais c'est par des faits qu'il a prouvé ces analogies; ce sont ces faits qu'il faudroit attaquer, et c'est ce qu'avec raison on n'a point osé entreprendre.

Il y a des différences d'aspect, d'organisation, de sensibilité dans les diverses parties de la surface muqueuse du conduit alimentaire! Eh! qui en doute? il n'est aucune vérité sur laquelle Bichat ait insisté davantage. Peut-on en conclure que ce n'est point une membrane unique et de même nature qui tapisse tout ce conduit? Disons donc aussi que la peau n'est point un organe unique et continu, puisque la portion qui recouvre l'extrémité des doigts ne présente ni précisément *la même texture, ni le même degré de sensibilité* que la portion qui recouvre la poitrine ou l'abdomen, puisque la peau du scrotum ne ressemble point à celle des cuisses, ni la peau du crâne à celle des paupières, etc., etc., etc.

On voit combien est futile cette nouvelle attaque livrée à la doctrine de Bichat, et combien il seroit inutile de s'arrêter plus long-temps à y répondre.

subtil mais dépourvu de jugement, et qui n'avoit que le mérite dès-lors inutile d'avoir été *fécond et laborieux*, etc., etc.

Ne répondons plus à ces reproches calomnieux, à ces insinuations malignes si évidemment dictées par un aveugle esprit de parti, et si hautement démenties par le suffrage unanime de tous les vrais savans. Disons une fois pour toutes, que si Bichat a laissé échapper quelques erreurs dans ses ouvrages, ce qu'aucun homme n'a jamais entièrement évité, ces erreurs faciles à corriger sont surabondamment compensées par la marche imposante et sûre qu'il a donnée à la physiologie et à l'anatomie, et par les faits nombreux dont il a enrichi ces deux sciences. C'est dans les écrits de cet homme illustre qu'il faut chercher désormais son apologie. Malheur à celui qui ne l'y trouveroit pas dès la première lecture, et qui s'arrêtant à dessein sur quelques passages inexacts, mais indifférens au fonds même de la doctrine, condamneroit l'ensemble parce que quelques détails auroient choqué sa vue. Malheur à quiconque ne comprendroit pas que toute science se perfectionne nécessairement d'une manière lente et progressive, et n'a jamais pu être embrassée sous tous ses rapports par celui qui sut en vaincre les premières et les plus grandes difficultés.

S'il se trouve encore quelques-uns de ces censeurs injustes qui, s'érigeant de leur propre autorité en juges

suprêmes de tous les talens, veuillent, sous le voile de l'impartialité, affoiblir les éloges que nous avons donnés à Bichat, et soutiennent qu'avant eux ce savant *n'a jamais été bien connu de personne*, si, dis-je, ces discours insidieux se répètent encore, nous nous tairons, à la bonne heure, et nous conviendrons sans beaucoup de peine que nos voix étoient trop foibles pour rendre à Bichat le juste tribut de louanges qui lui étoit dû. Mais ce sera la voix de l'École toute entière que nous substituerons à la nôtre. Nous citerons le témoignage éclatant et solemnel qu'elle a rendu à Bichat par l'organe d'un de ses plus estimables membres. Qu'ils l'écoutent, ceux qui craignent si fort d'en trop dire, et que leurs orgueilleuses préventions disparoissent sous l'autorité d'un nom auquel se rattachera toujours l'idée du mérite à-la-fois le plus distingué, le plus équitable et le plus modeste.

« Il n'a fait que passer au milieu de nous, cet » homme qui, dès son entrée dans la carrière, mar- » choit de front avec ceux qui s'y étoient illustrés » depuis long-temps. Qu'est-il besoin de vous le » nommer? vous dont il fut l'ami, le camarade et » le maître; et vous surtout qu'il instruisoit à rem- » porter les palmes de l'École, vous qui vous em- » parâtes de ses restes inanimés et changeâtes ses » obsèques en un triomphe; vous qui couvrîtes son » cercueil de larmes et de fleurs! vous nous direz

» comme il développoit dans vos ames l'enthou-
» siasme de la science; vous nous apprendrez com-
» ment les froids débris de l'homme sembloient s'a-
» nimer sous ses mains pour vous révéler les secrets
» de la nature. L'Europe ne croira pas que ce soit
» avant trente ans que, se saisissant en maître des
» idées que quelques hommes de génie n'avoient
» encore qu'effleurées, Bichat ait pu jeter les fon-
» demens d'une nouvelle anatomie et d'une physio-
» logie nouvelle. Le dernier élève qu'enfanta l'école
» fameuse de Leyden, le célèbre Sandifort, l'a dit à
» l'un de vous (Bichat vivoit alors! mais cette pré-
» diction ne devoit point être accomplie): *dans six*
» *ans votre Bichat aura passé notre Boerhaave.*
» Ainsi parlent les étrangers. Mais nous, nous di-
» rons que Bichat fut aussi le meilleur des hommes,
» que jamais la médisance ne se plaça sur ses lèvres,
» qu'aucun laurier ne fut flétri par ses mains, et
» que modeste sans effort, il ne parla jamais que
» de ce qui lui restoit à faire. Non, il est impossible
» qu'un pareil homme ait eu des ennemis; il est im-
» possible qu'il ait eu des détracteurs et des ja-
» loux, etc. etc. (1)».

---

(1) *Discours de M. Hallé à la séance publique de l'Ecole de Médecine*, le 15 brumaire an 11. Pag. 22.

APPAREIL

DE

LA RESPIRATION.

Considérations générales.

La description de l'appareil respiratoire se place naturellement à la suite de celle de l'appareil digestif, vu les caractères fondamentaux qui rapprochent l'une de l'autre les deux grandes fonctions dont ils sont les agens. Toutes deux en effet supposent l'introduction de substances jusqu'alors étrangères à l'économie, la séparation de ces substances en deux portions, dont une seule est conservée, la transmission au sang de la portion utile, l'expulsion de l'autre portion devenue inutile et désormais nuisible. Toutes deux ont pour but et pour effet le renouvellement du sang, et se terminent à la circulation.

Les appareils organiques de ces deux fonctions se rapprochent également par des caractères sensibles et faciles à saisir. L'un et l'autre nous offrent des cavités tapissées par une membrane muqueuse commune, sur laquelle se passent les phénomènes essentiels de la fonction. Dans l'un et dans l'autre nous voyons des appareils locomoteurs concourir à former l'appareil général, et servir de moyens nécessaires à

l'exécution des phénomènes, qui par-là sont soumis en partie à l'empire de la volonté.

Mais, outre les différences de forme et d'organisation, l'appareil respiratoire se distingue du digestif, 1°. parce qu'il est composé d'un plus petit nombre d'organes; 2°. parce qu'il est nécessairement dans une action continuelle; 3°. parce qu'il tient d'une manière beaucoup plus prochaine à l'appareil circulatoire.

Deux organes semblables constituent l'appareil de la respiration. Leur volume est considérable; un grand nombre de tissus différens sert à les composer, ce qui rend leur structure très-compliquée. Presque tous ces tissus sont vasculaires, ce qui donne aux organes cet état spongieux, mou, peu résistant sous lequel ils se présentent. En effet, aucun de ces tissus ne jouit de la contractilité organique sensible, tous sont bornés aux *propriétés de tissu* indépendantes de la vie, et à la contractilité organique insensible ou tonicité dans l'état de vie, à l'exception peut-être de quelques fibres musculeuses que l'on croit reconnoître sur les conduits aériens, comme nous le verrons. Rien n'indique donc que les poumons puissent se mouvoir sensiblement par eux-mêmes, car le mouvement général d'un organe ne peut résulter que de la somme des mouvemens particuliers exercés par les divers tissus qui le composent, et jamais une multitude de mouvemens toniques exercés à la fois ne peut donner un mouvement général, apparent et sensible. Aussi les poumons sont immobiles quand aucune cause étrangère à eux ne les détermine à se mouvoir; et lorsqu'on les comprime, ils reviennent

toujours lentement à leur état primitif, souvent même n'y reviennent qu'en partie.

Cependant les fonctions des poumons exigent que ces organes soient agités d'un mouvement continuel de dilatation et de resserrement, pour que l'air s'introduise dans leur intérieur, et en soit expulsé après un certain séjour : si ce double mouvement cesse un instant, le sang cesse d'être élaboré par l'air, et la circulation s'arrête bientôt. Les poumons ont donc besoin d'un moyen auxiliaire pour remplir les fonctions auxquelles ils sont destinés : ce moyen, nous le trouvons dans l'appareil locomoteur considérable dont les poumons sont environnés et qui leur forme en même temps une cavité assez solide pour les protéger contre les lésions extérieures les plus ordinaires. Les côtes forment par leur disposition la partie solide de cette cavité, les muscles intercostaux, le diaphragme en forment la portion mobile, et la cavité elle-même, résultant de l'ensemble de ces parties et de quelques autres, se nomme *le thorax :* c'est à lui seul qu'il faut rapporter les phénomènes de dilatation et de resserrement des poumons qui, toujours passifs, suivent rigoureusement l'impulsion qu'il leur donne. Le thorax forme donc partie essentielle de l'appareil respiratoire, puisque sans lui la respiration est impossible (1).

Mais le thorax renferme aussi l'organe central de

(1) J'ai développé avec plus d'étendue ce rapport entre les poumons et le thorax, dans la seconde partie de mon ouvrage *sur la division la plus naturelle des phénomènes physiologiques considérés chez l'homme.*

la circulation et ses premiers vaisseaux. L'appareil circulatoire se trouve donc rapproché et en quelque sorte confondu à son origine avec l'appareil respiratoire. L'un et l'autre sont cependant très-distincts par la disposition même de la cavité commune qui les contient ; car le cœur correspond à cette région de la poitrine qui constitue en arrière la colonne vertébrale, en devant le sternum, en bas le centre aponévrotique du diaphragme : or, de toutes ces parties, les unes sont immobiles, les autres jouissent d'un mouvement très-obscur et peu étendu. Au contraire, les poumons occupent les régions les plus mobiles du thorax, puisqu'en dehors ils répondent aux côtes et aux muscles intercostaux, et qu'en bas le diaphragme leur offre pour appui sa portion musculeuse toute entière.

Le thorax ayant été décrit avec les autres appareils locomoteurs, nous ne parlerons ici que des poumons.

Des Poumons.

§ Ier. *Disposition. Organisation extérieure.*

Les poumons occupent les régions latérales de la cavité thorachique dont ils remplissent la plus grande partie. Distincts l'un de l'autre puisque les deux plèvres rapprochées forment entre eux une cloison intermédiaire dans laquelle le cœur et ses vaisseaux se trouvent renfermés, ils sont cependant réunis d'une manière essentielle, puisqu'un conduit commun et une artère commune leur transmettent l'air et le

sang, matériaux nécessaires de leurs phénomènes. A juger des poumons d'après ces considérations et d'après la forme régulière de la grande cavité qui les renferme, on croiroit retrouver chez eux la symétrie exacte qui caractérise les organes de la vie extérieure; mais en les observant attentivement, on voit que cette symétrie est incomplète, et que les deux poumons, inégaux en étendue, un peu différens pour la forme, offrent déjà en partie l'irrégularité qui distingue la vie organique, ou plutôt tiennent le milieu, pour la structure comme pour les fonctions, entre ces deux grandes classes d'organes.

On doit remarquer au reste que le défaut de symétrie exacte des poumons dépend beaucoup de la disposition des organes qui les avoisinent. En effet, d'un côté le cœur dirigé un peu à gauche, diminue par sa présence le diamètre transversal de la cavité correspondante; de l'autre, le foie soulevant le diaphragme, diminue sensiblement le diamètre vertical de la cavité droite. Le poumon gauche s'étend donc plus en longueur qu'en largeur, tandis que le droit, plus libre de s'étendre en largeur, a nécessairement une longueur beaucoup moindre : je suppose, en m'exprimant ainsi, que chaque poumon se développe plus ou moins en tel ou tel sens, suivant que la cavité qu'il doit remplir présente telle ou telle forme. Cette idée, présentée par presque tous les anatomistes, est avantageuse à l'étude, parce qu'elle s'accorde assez bien avec ce que nous savons sur la structure spongieuse et peu résistante des poumons comparée à la structure beaucoup plus solide des organes qui les environnent; mais on ne doit pas y attacher

d'importance, et la regarder comme l'énoncé exact de ce qui est dans la nature. Tous les organes en effet sont conformés primitivement les uns pour les autres, destinés à se trouver mutuellement dans certains rapports, et il répugne aux lois de l'organisation d'admettre, comme cause essentielle de la forme d'un organe, la gêne qu'il a éprouvée à se développer dans un sens plutôt que dans l'autre.

1°. *Volume.*

Le volume des poumons est toujours, dans l'état naturel, exactement relatif à l'étendue de la cavité thorachique : incapables de se dilater par eux-mêmes, ces organes correspondent constamment par leur surface externe à cette enveloppe osseuse et musculeuse dont ils doivent suivre les mouvemens : ils augmentent de volume à mesure qu'elle-même augmente de capacité, diminuent à mesure qu'elle se rétrécit, en sorte que jamais il ne se trouve d'espace vide entre eux et elle. On s'assure facilement de ce fait en mettant à découvert, dans quelque point que ce soit, la surface extérieure de la plèvre costale, soit que l'on enlève avec précaution les muscles intercostaux, soit qu'après avoir ouvert l'abdomen on écarte les fibres du diaphragme. La couleur du poumon s'observe alors au travers de la membrane diaphane qui circonscrit sa cavité, et on voit qu'il lui est toujours appliqué par tous ses points d'une manière immédiate. Cette expérience faite un grand nombre de fois sur le cadavre, répétée, quoiqu'avec plus de difficulté, sur les animaux vivans, a démontré à Haller

la fausseté de l'opinion de certains physiologistes qui croyoient le poumon habituellement séparé de la plèvre costale par une certaine quantité d'air.

Ce rapport exact entre le volume du poumon et la largeur de la cavité thorachique est prouvé d'une manière plus positive encore, lorsqu'après avoir plongé un cadavre dans l'eau, on fait une ouverture à la poitrine. Aucune bulle ne s'élève alors à la surface de l'eau, comme il arriveroit sans doute s'il y avoit entre le poumon et le thorax un espace occupé par quelque fluide aériforme : cette expérience est aussi de Haller, qui l'a répétée plusieurs fois après d'autres physiologistes.

On peut donc juger en partie le volume des poumons d'après l'étendue de la cavité pectorale; mais cette appréciation ne peut être que très-vague; car, 1°. le cœur interposé entre les deux poumons, a lui-même un volume très-variable; et selon qu'il est plus ou moins considérable, il laisse à ces deux organes plus ou moins de place. Je parle de l'état naturel et non point des cas morbifiques dans lesquels le cœur ou l'aorte, dilatés extraordinairement par un anévrisme, diminuent, par la compression qu'ils exercent, le volume des deux poumons, et spécialement du gauche. 2°. Le foie varie à l'infini pour la grosseur, et peut, par un accroissement excessif, soulever tellement le diaphragme, qu'il reste très-peu de place au poumon droit (1).

(1) M. Fizeau a vu, sur le corps d'une fille morte dans un état d'obésité extraordinaire, le foie accru en hauteur au point d'atteindre à peu de distance de la première côte :

Souvent sur le cadavre on ne trouve point ce rapport exact entre le volume des poumons et l'étendue de la cavité thorachique; souvent même la poitrine ouverte paroît vide en grande partie, les poumons étant comme relégués dans sa partie la plus reculée sur les côtés de la colonne vertébrale. Ceci tient uniquement à l'accès de l'air extérieur dans la poitrine au moment de l'ouverture. Comprimé par ce fluide, le poumon s'affaisse sur lui-même de la même manière qu'une vessie à moitié pleine d'air, distendue dans le vide de la machine pneumatique, reprend sa flaccidité au moment où l'air est rendu dans le récipient. Dans les ouvertures ordinaires de cadavres, on ne remarque point cet affaissement des poumons, qui commence dès qu'on a enfoncé le scalpel, et qui s'achève pendant le temps que l'on met à couper les cartilages des côtes. Mais, comme l'observe Haller, si après avoir découvert en dehors la plèvre dans une certaine étendue, et avoir reconnu au travers de sa transparence le poumon qui lui est contigu, on incise cette membrane avec précaution pour ne point blesser en même temps le poumon, on verra cet organe s'éloigner avec lenteur de la plèvre costale, surtout antérieurement, et diminuer sensiblement de volume en paroissant se rapprocher de la région dorsale. Jamais, dit Haller, cette expérience ne manque quand il n'y a point adhérence entre la plèvre costale et le poumon. Il

---

il ne débordoit point les côtes abdominales inférieurement. On peut juger de l'état extrême de reserrement dans lequel se trouvoit le poumon droit.

faut excepter encore les cas où le poumon est très-gorgé de sang, et ceux où la plus grande partie de sa substance désorganisée présente cet état de solidité qu'on désigne sous le nom de *carnification*. Semblable alors aux autres organes solides, le poumon demeure dans le même état et n'obéit point à la pression de l'air extérieur. Chez les enfans, l'affaissement des poumons supposés sains est moins marqué en général que chez les sujets adultes, et souvent ces organes sont encore immédiatement contigus à la plèvre costale, quoique la poitrine soit ouverte depuis long-temps de tous côtés.

D'après tout ce que nous venons de dire, on voit que le volume des poumons ne dépend point de la substance solide qui les constitue, mais uniquement des fluides qui les remplissent, et principalement de l'air, qui ne cesse jamais d'y séjourner depuis qu'il s'y est introduit pour la première fois au moment de la naissance. Plus dilatés dans l'inspiration, ces organes sont encore tout pénétrés d'air dans l'expiration la plus complète; et si par une compression longue et soutenue, si par l'action d'une pompe aspirante on les prive entièrement de ce fluide, comme Bichat l'a fait tant de fois sur les animaux vivans, ils se réduisent à un volume si petit, qu'ils ne remplissent pas le quart de la cavité qui leur appartient. Ceci s'observe, non-seulement dans nos expériences, mais encore dans tous les cas pathologiques où un fluide quelconque se trouve accumulé en grande abondance dans le thorax. Jamais je n'en ai vu d'exemple plus frappant que celui qui s'offrit un jour à Bichat sur le cadavre d'un enfant de dix à douze

ans. Une énorme collection purulente produite par l'affection de la seule plèvre, remplissoit tout un côté du thorax. Au premier aspect, on ne découvroit point le poumon qui, réduit à un volume à peine sensible, relégué sur les côtés de la colonne vertébrale, aplati sur lui-même, conservoit d'ailleurs sa forme naturelle, et présentoit dans toute sa substance propre la plus parfaite intégrité.

Le sang qui, habituellement se trouve en si grande quantité dans les poumons, concourt avec l'air à déterminer leur volume, mais d'une manière secondaire, et en quelque sorte accessoire. Les poumons en effet ne pourroient, dans l'état de vie, livrer passage à cette masse énorme de sang qui les traverse sans cesse, s'ils n'étoient d'avance distendus par l'air dont le séjour habituel dans ces organes est la condition nécessaire pour que les phénomènes circulatoires puissent s'y opérer. La preuve que l'entrée de l'air préexiste ici à l'entrée du sang est facilement acquise par l'observation de ce qui se passe au moment de la naissance où l'inspiration précède toujours les derniers changemens dans le mode de circulation (1).

Sur les cadavres que nous observons ordinaire-

(1) Ceux qui sont au courant des connoissances physiologiques ne m'accuseront point de donner ici dans l'erreur ancienne sur la prétendue difficulté du passage du sang dans le poumon pendant l'expiration, difficulté qu'on attribuoit aux replis que les vaisseaux, disoit-on, font alors sur eux-mêmes. J'ai eu soin effectivement de remarquer plus haut que le poumon étoit encore tout pénétré d'air dans l'ex-

ment, le sang occupe dans les poumons beaucoup plus de place que pendant la vie, et concourt davantage à déterminer leur volume actuel. On sait qu'à l'instant de la mort naturelle ces organes s'engorgent toujours plus ou moins de ce fluide, et l'examen anatomique en fournira bientôt les preuves les plus frappantes. C'est par cette raison que le plus souvent les incisions légères faites sur les poumons des cadavres ne produisent pas dans les organes un affaissement aussi considérable qu'on le croiroit d'abord. Ces incisions, en effet, ne peuvent donner issue qu'à l'air et non au sang, et l'air et le sang sont alors à-peu-près en égale proportion. En second lieu, pour que ces incisions donnent issue à la plus grande partie de l'air contenu dans le poumon, il faut qu'il y ait liberté de communication des cellules aériennes entre elles; or, le sang qui stagne de toutes parts dans l'organe, empêche cette communication libre, et incarcère, pour ainsi dire, dans les poumons, les diverses portions d'air qui y séjournent, en sorte que la partie incisée est presque la seule d'où cet air puisse s'échapper.

Aussi chez les sujets morts avec hémorragie,

---

piration la plus complète, et différoit entièrement alors du poumon privé absolument d'air par la compression ou par d'autres moyens. Or, il est démontré aujourd'hui, comme l'on sait, que la quantité d'air que contient le poumon dans l'état d'expiration, est suffisante pour empêcher ces prétendus replis des vaisseaux pulmonaires, et pour permettre le libre passage du sang.

dont les poumons presque entièrement privés de sang, doivent à l'air seul leur volume, ces incisions superficielles dont je parle ont un succès beaucoup plus marqué et produisent un affaissement subit analogue à celui qui résulte de l'ouverture de plusieurs petites vésicules réunies que l'on auroit remplies d'air. J'ai fait cette remarque sur des poumons de criminels péris par le supplice de la guillotine : chaque coup de scalpel donné à la surface étoit suivi d'une diminution très-marquée de volume dans tout l'organe, et après avoir fait trois ou quatre incisions semblables, je vis au bout d'un instant le poumon réduit presqu'à la moitié du volume qu'il avoit d'abord offert,

J'observe, au reste, que jamais par les incisions les plus multipliées on ne parvient à faire entièrement sortir tout l'air que les poumons contiennent, même lorsque le sang n'y stagne point en même temps : il en reste toujours assez pour porter le poumon fort au-delà du volume que sa seule portion solide lui donneroit. Coupés par morceaux, ces organes conservent encore cet air dans chaque morceau isolé, et ne l'abandonnent tout-à-fait que par une forte compression, par l'ébullition, la macération et autres moyens qui détruisent en même temps sa structure intime. Il semble que l'air, fluide essentiel aux fonctions du poumon, devienne, dès qu'il y est entré pour la première fois, partie constituante de son organisation, aussi bien que les tissus vasculaire, bronchique, cellulaire, etc. dont se compose sa substance propre.

2°. *Pesanteur.*

Les poumons sont proportionnellement les plus légers de tous les organes : plongés dans l'eau, soit en entier, soit par portions séparées, ils surnagent constamment. Il est évident que cette légèreté dépend de la même cause que leur volume, car le poumon privé entièrement d'air et réduit à son tissu propre, ne surnage point ainsi. On le voit lorsqu'un de ces organes, comprimé à l'excès et aplati sur lui-même par le séjour d'une grande quantité de fluide épanché dans le thorax, a cessé depuis long-temps de servir aux phénomènes respiratoires : plongé dans l'eau, il va au fond comme celui du fœtus. Il en est de même des cas où le poumon entièrement désorganisé offre dans son tissu une solidité qui le rapproche de la structure des autres organes ; mais ceci regarde uniquement l'anatomie pathologique.

L'immersion dans l'eau est donc le moyen ordinaire de reconnoître la pesanteur absolue du poumon ; et toutes les fois qu'il conserve une certaine quantité d'air, cette expérience donne toujours les mêmes résultats.

Mais les poumons comparés sur divers sujets offrent une pesanteur relative très-variable, suivant la plus ou moins grande quantité de sang qui s'y trouve et qui les a engorgés au moment de la mort. On ne peut douter que le poumon d'un asphyxié ne pèse plus, par cette raison, que celui d'un homme mort d'hémorragie ; qu'à la suite d'une maladie chronique qui a épuisé les forces vitales et diminué à l'excès l'énergie de la circulation, le poumon ne soit plus

léger qu'il ne l'est après la strangulation, où une masse considérable de sang a afflué dans cet organe jusqu'au dernier moment, etc., etc. Il pourroit être curieux d'apprécier ces différences de pesanteur relative suivant les divers genres de mort; mais ce travail regarde plutôt l'anatomie pathologique que la descriptive.

Ici se placeroient assez naturellement les considérations très-importantes sur la différence des poumons chez le fœtus et chez l'adulte; mais comme elles appartiennent à un ordre de faits fort étendu, relatif au mode général de la vie avant la naissance, nous renvoyons ces détails à l'histoire du fœtus traitée à la fin du volume suivant par M. Roux: nous suivons en ceci l'intention de Bichat.

3°. *Forme et Rapports.*

Les poumons ont en général une forme conoïde, en sorte que la base est inférieure, le sommet supérieur. Cette forme est assez constante, parce qu'elle dépend en grande partie de celle du thorax qui varie peu dans l'état naturel, vu la solidité de sa structure. Mais les poumons ne correspondent immédiatement à la portion solide du thorax qu'en dehors et en haut: en dedans ils avoisinent le cœur, en bas les organes abdominaux, dont le diaphragme seul les sépare: aussi leur forme, toujours à-peu-près la même en dehors et à leur sommet, varie d'ailleurs suivant la disposition des organes environnans. Le cœur, toujours dévié à gauche, ne permet pas au poumon de ce côté de s'étendre en largeur inférieurement autant que le pou-

mon droit; et tandis que celui-ci s'étend beaucoup transversalement près de sa base, le gauche plus resserré dans la place qu'il occupe, paroît moins conoïde et plus uniformément allongé; quelquefois même, forcé de céder à une dilatation extraordinaire du cœur anévrismatique ou du péricarde hydropique, il se rétrécit vers sa base plus qu'à son sommet, et forme réellement un cône renversé.

Enfin le thorax lui-même est sujet à des variations de forme soit naturelles, soit surtout accidentelles, et ici se rapportent tous les vices de conformation des côtes, soit pour la direction, soit pour les courbures: vices que les poumons représentent fidèlement, puisqu'ils sont toujours forcés de se mouler sur les organes solides qui les environnent.

Je ne parle point ici des cas où un fluide accumulé dans la cavité de la plèvre comprime extraordinairement le poumon. Il est rare en effet que la forme de cet organe soit alors changée, parce que ce fluide lentement accumulé le comprime en tous sens à la fois, et ne fait que diminuer plus ou moins son volume.

Le cône que représente chaque poumon est toujours fort irrégulier, ces organes étant nécessairement disposés de manière à s'adapter aux parties voisines. Les poumons ne sont donc point arrondis dans tout leur contour, et on peut leur distinguer, outre la base et le sommet, deux surfaces, l'une externe, l'autre interne.

La surface externe, convexe dans toute son étendue, correspond aux parois thorachiques, dont elle est séparée par la portion de plèvre qui tapisse ces

parois : lisse et polie, elle est lubrifiée par le fluide séreux de cette membrane. On y voit constamment sur chaque poumon une rainure considérable qui commence en arrière un peu au-dessous du sommet, et qui se prolonge très-obliquement en avant et en bas jusqu'à la base : cette rainure s'étend à presque toute l'épaisseur du poumon, qu'elle divise en deux moitiés à-peu-près égales, connues sous le nom de *lobes*. Le lobe supérieur, volumineux en haut, diminue progressivement et se termine presqu'en pointe, tandis que l'inférieur, rétréci en haut, présente en bas sa plus grande largeur. Pour l'ordinaire, sur le poumon droit, le lobe supérieur se trouve divisé en deux portions par une rainure secondaire dirigée obliquement de haut en bas et dedans en dehors, sens inverse de la grande, en sorte qu'on distingue à ce poumon trois lobes, dont le moyen, triangulaire, présente son sommet en dehors, sa base en dedans. Au reste, cette rainure varie beaucoup plus que la première pour l'existence, la longueur et la profondeur : quelquefois on ne la trouve point, ce qui est cependant assez rare ; plus souvent elle est incomplète et ne s'étend pas jusqu'au bord extérieur du poumon ; enfin, tantôt elle est aussi profonde que la grande et divise réellement le poumon en trois lobes également distincts ; tantôt, plus superficielle, elle laisse les deux parties du lobe supérieur presque entièrement continues. Chez quelques sujets on trouve aussi, mais rarement, sur le poumon gauche, la rainure secondaire dont nous parlons.

La surface interne, plane en général, est divisée en deux portions inégales par l'insertion des bronches

et des vaisseaux pulmonaires qui a lieu sur elle vers le milieu du poumon considéré suivant sa longueur. La portion postérieure, étroite, correspond aux parties latérales de la colonne vertébrale; l'antérieure, beaucoup plus large, répond au cœur et au repli antérieur de la plèvre. La première est tout-à-fait plane, la seconde, légèrement concave, s'accommode ainsi à la forme du cœur.

Au-dessus et au-dessous de l'insertion des vaisseaux, les deux portions de la surface interne du poumon ne sont plus distinctes l'une de l'autre.

Deux bords réunissent ces surfaces. L'un antérieur, très-mince et comme tranchant, surtout inférieurement, plus ou moins inégal, se dirige obliquement en bas et en avant; on y voit, sur le poumon gauche seulement, une petite échancrure qui reçoit la pointe du cœur. Le bord postérieur, beaucoup plus épais, obtus, peu marqué, se dirige verticalement et répond à cet enfoncement qu'indique au dehors l'angle des côtes. On voit en haut, sur ce dernier bord, le commencement de la grande rainure qui divise le poumon en deux lobes.

La base du poumon, plane en général, mais reposant sur le diaphragme, se trouve accommodée à la direction que cette grande cloison musculaire lui présente : ainsi des deux côtés elle est un peu oblique en dehors et en bas, le diaphragme se trouvant incliné dans ce sens. Sur le poumon droit cette base offre habituellement une légère concavité, parce que le diaphragme se trouve habituellement soulevé plus ou moins en forme de voûte par le foie.

On trouve sur la base du poumon la fin de la

grande rainure qui sépare les deux lobes, lesquels se trouvent encore ici distincts l'un de l'autre comme à la surface externe. Mais la plus grande partie de la base est formée par le lobe inférieur, le supérieur ne concourant à la constituer que dans une fort petite étendue, surtout à droite. La base du poumon gauche est en effet un peu moins inégalement divisée; mais toujours il y a entre ses deux parties une disproportion manifeste.

Le contour de la base du poumon offre sur l'un et sur l'autre un rebord très-mince, légèrement dentelé et qui se trouve comme enchâssé entre les côtes et le diaphragme près de l'endroit où ce muscle prend ses insertions fixes. Cette espèce d'enchâssement est plus sensible à droite qu'à gauche, à cause de la saillie que forme la surface convexe du foie. Au reste, la disposition de ce rebord varie nécessairement suivant les différens états du poumon : celle que nous venons d'indiquer ne convient qu'à l'état d'expiration, le seul que nous observions sur le cadavre. Dans l'inspiration, où le diaphragme s'abaisse et devient plane, le poumon, forcé de le suivre et dilaté dans tous ses points, change nécessairement un peu de forme à sa base. Cette base devient plus plane, son contour acquiert plus d'épaisseur et de volume, et se trouve d'autant moins enchâssé entre le diaphragme et les côtes, que le diaphragme s'est plus abaissé du côté de l'abdomen.

Le sommet du poumon, étroit et obtus, correspond au-dessous de la première côte où il se trouve logé dans l'espèce de cul-de-sac que la plèvre forme en cet endroit en se réfléchissant en devant. Ce sommet est ainsi entièrement isolé de la partie inférieure du cou :

il offre plusieurs bosselures irrégulières plus ou moins marquées.

Toute la surface des poumons est libre, excepté dans la partie interne, moyenne et postérieure, où ils reçoivent les vaisseaux, soit aériens, soit sanguins, qui forment partie essentielle de leur organisation intime. Par-tout ailleurs la plèvre recouvre le poumon de la manière que nous indiquerons bientôt et fournit le fluide séreux destiné à l'isoler de la cavité qu'elle-même lui forme.

4°. *Couleur.*

Les poumons ont ordinairement par eux-mêmes et indépendamment des fluides qui y abordent, une couleur extrêmement pâle, tantôt légèrement fauve comme ceux du veau, tantôt et plus souvent grise et cendrée, quelquefois tout-à-fait blanche. Tout le poumon offre cette couleur, soit à sa surface, soit dans son intérieur, lorsqu'il est entièrement privé de sang; il ne la présente qu'en partie lorsque le sang l'occupe encore dans quelques portions; il ne la présente plus lorsque le sang l'engorge en entier; mais constamment cette couleur pâle indique sur le poumon sain l'absence du sang dans l'endroit où elle a lieu. On conçoit dès-lors pourquoi il est si rare de la trouver sur les sujets soumis pour l'ordinaire à notre observation, puisque l'engorgement des poumons par le sang est un des phénomènes les plus constans de la mort naturelle. Les seuls cas où l'on puisse compter avec quelque certitude de trouver cette couleur pâle uniformément répandue sur les poumons, ce sont ceux des morts par hémorragies. Les deux seuls exemples

qu'en cite Morgagni sont de ce genre ; dans l'un c'étoit la rupture extérieure d'un anevrisme de l'aorte abdominale qui avoit fait perir le sujet ; dans l'autre la mort avoit été déterminée par l'hémorragie de l'artère crurale traversée par un coup de couteau. L'auteur, dans l'une et l'autre histoire, rapporte à ce genre de mort l'état qu'offroient les poumons (1). Ce même état décoloré s'observe sur les poumons des criminels guillotinés.

Par-tout ailleurs il est très-rare que ces organes offrent dans la plus grande partie de leur étendue, la pâleur dont nous parlons. Souvent elle a lieu dans quelques points isolés, et il est facile de reconnoître par une incision l'absence du sang dans ces endroits ; mais tout le reste du poumon offre les variétés de couleur dont nous allons parler bientôt. J'ai cependant vu une fois les deux poumons entièrement blancs et privés de sang sur le cadavre d'une jeune femme morte dans le dernier degré de marasme, après des souffrances très-longues et très-cruelles causées par un cancer du rectum : tout le système veineux contenoit très-peu de sang. On conçoit assez

(1) *Quod pulmones albissimos haud secùs ac si aquâ usque et usque injectâ sanguis ex eorum vasis fuisset elutus, conspiceremus, nempè id deberi intelligebamus sanguini, quà nulla resistentia fuerat, in ruptum aneurysma vitæ extremo tempore confluenti.* Epist. XL, 26.

Quod sic concidissent (*pulmones*) *et colore tamen essent, si posteriorem faciem, ut par est, excipias, ex cinereo albicante, causa erat exigua omninò copia sanguinis quam in vasis quidem majoribus tum ventris, tum etiam thoracis superfuisse animadvertimus.* Epist. LIV, 46.

bien encore ici le rapport entre l'effet et la cause. Dans ces maladies chroniques où les forces vitales ont été lentement détruites, où, par conséquent, l'énergie de la circulation est excessivement diminuée, l'instant où la vie cesse n'est que la fin d'une mort depuis long-temps commencée; et c'est à la cessation spontanée des mouvemens du cœur, plutôt qu'à l'engorgement des poumons, que les phénomènes de ce dernier moment doivent être rapportés.

La couleur fauve ou grisâtre des poumons est interrompue par de petites taches noires ou brunes, irrégulièrement disséminées sur sa superficie, très-variables pour le nombre et pour la forme. Souvent le poumon en est tout marqueté; d'autres fois il n'en présente que quelques-unes parsemées çà et là à de grandes distances: quelquefois, mais très-rarement, il n'en présente point. Ces taches ne dépendent point du sang: la simple inspection prouve qu'elles tiennent à une disposition organique. On les voit, en effet, très-prononcées sur les poumons les plus pâles, et on les distingue parfaitement au milieu de la couleur livide générale des poumons les plus engorgés; partout elles ont la même intensité de couleur; par-tout elles sont exactement circonscrites, tandis que les taches sanguines, toujours plus ou moins foncées, sont toujours aussi vaguement prolongées, et finissent en perdant leur couleur d'une manière progressive.

Ces taches noires sont arrondies, ovales, allongées tantôt isolées, tantôt réunies entre elles. Si on divise le poumon à l'endroit où elles se trouvent, on voit que les unes paroissent bornées à sa superficie; les autres se prolongent plus ou moins dans sa substance; mais

que toutes dépassent au moins de quelques lignes la surface adhérente de la plèvre à laquelle elles semblent appartenir en partie, puisqu'en enlevant cette membrane de dessus le poumon on enlève aussi plusieurs de ces taches. Mais ce qui prouve qu'elles appartiennent toujours uniquement au tissu pulmonaire, c'est, 1°. qu'on ne les retrouve jamais sur la plèvre costale; 2°. qu'on trouve des taches toutes semblables dans le tissu pulmonaire, loin de la surface extérieure; 3°. que les petits corps dont ces taches dépendent ont la ressemblance la plus parfaite de couleur, de consistance, avec les glandes bronchiques dont nous parlerons plus bas. Il me paroît donc certain que les taches noires sont dues à de petites glandes bronchiques saillantes à la surface du poumon, et apparentes au travers de la plèvre à laquelle elles adhèrent d'une manière plus ou moins intime.

J'ai dit que, pour l'ordinaire, les poumons offrent un aspect fort différent de celui dont nous venons de parler. Pénétrés de sang dans le plus grand nombre des sujets à l'instant de la mort, ils s'éloignent presque toujours de cette pâleur que nous avons dit appartenir à leur tissu propre. Le plus souvent on les trouve livides, brunâtres ou violets, rougeâtres, et ces diverses couleurs mélangées donnent à leur surface l'apparence marbrée qu'on s'accoutume, dans les amphithéâtres, à regarder comme l'état naturel des poumons, quoiqu'elle ne soit presque jamais qu'un phénomène cadavérique (1). Ces couleurs varient indéfiniment,

(1) Il est quelques cas où les poumons offrent une couleur bleuâtre ou ardoisée, qui paroît tenir à leur propre subs-

suivant les maladies dont le sujet a été victime. C'est à l'anatomie pathologique à mentionner tous ces faits particuliers. Bornons-nous ici à parler des couleurs qu'on observe le plus habituellement sur des poumons sains d'ailleurs, et qui dépendent moins de la maladie que du moment de la mort.

La couleur brune, bleuâtre ou violette, est celle que l'on trouve le plus fréquemment sur les poumons et qui en occupe presque toute l'étendue; elle dépend du sang noir qui stagne dans ces organes dès que la respiration a cessé de colorer celui que le ventricule droit du cœur continue encore à y pousser. Accumulé dans le système capillaire, épanché peut-être dans le tissu cellulaire qui réunit toutes les parties propres du poumon, ce sang donne à l'organe des teintes variées, suivant qu'il se trouve accumulé en quantité plus ou moins grande dans le même point. Le *summum* de cette accumulation ou de cet engorgement produit le noir foncé qui distingue les poumons des asphyxiés : le brun ou le violet résulte d'un engorgement moindre. Toujours la couleur devient plus foncée dans l'endroit du poumon qui se trouve actuellement le plus déclive, le sang n'obéissant plus après la mort qu'à la pesanteur naturelle de tous les fluides. Ainsi depuis long-temps est-il reconnu parmi

---

tance. Tel étoit leur état chez un homme mort à la Charité, d'une rupture de l'aorte descendante anévrismatique. On ne pouvoit guère soupçonner ici l'engorgement sanguin du poumon, l'homme étant évidemment mort d'hémorragie.

les anatomistes (1), que la partie postérieure des poumons doit la couleur plus foncée qu'on lui trouve à la supination dans laquelle presque tous les cadavres sont placés, en sorte qu'on peut déterminer à volonté cette teinte noirâtre dans une autre partie du poumon, en donnant pendant quelque temps au cadavre une position différente : elle aura lieu en devant si on couche le sujet sur la poitrine ; si on le place sur le côté, elle s'observera sur la partie latérale du poumon correspondant : ceci, au reste, est sujet à quelques exceptions assez fréquentes pour qu'on doive les remarquer ici. Quelquefois on ne trouve qu'un seul poumon engorgé postérieurement, quoique le sujet ait été dans une supination complète, et que l'autre poumon paroisse contenir à-peu-près la même quantité relative de sang. Quelquefois la partie antérieure est sensiblement engorgée dans la même circonstance, la postérieure ne l'étant point, etc., etc. Ceci tient, sans doute, à la perte plus ou moins absolue de contractilité organique insensible dans les diverses portions de l'organe pulmonaire, d'où résulte une perméabilité cadavérique plus ou moins marquée.

Les couleurs obscures ne sont pas les seules que la stagnation du sang puisse donner au poumon. Très-souvent divers points de ces organes offrent un rouge vif et vermeille; très-souvent cette teinte rouge s'observe sur une grande partie ou même sur la moitié d'un poumon, l'autre moitié présentant le brun ou le violet ordinaire. Enfin, presque toujours la couleur rouge est la seule qu'on trouve sur les poumons des

(1) Voyez plus haut le second passage cité de Morgagni.

enfans. (Je ne parle ici que de ceux qui ont respiré quelque temps, et point du tout du fœtus, qui présente d'autres considérations étrangères à mon objet actuel.)

A quoi tient cette couleur rouge ? est-ce du sang déjà élaboré par la respiration et arrêté dans cette portion du système capillaire pulmonaire qui commence le grand système vasculaire à sang rouge ? Cette supposition me paroît inadmissible ; car, 1°. le sang arrive noir au poumon par l'artère pulmonaire, et parcourt, sans changer de nature, une partie des rameaux capillaires ; 2°. dès l'instant où il a éprouvé l'influence du contact de l'air, il trouve une issue libre dans les rameaux des veines pulmonaires, successivement augmentés de diamètre ; 3°. dès l'instant où la respiration cesse, il ne peut plus y avoir production de sang rouge. Jamais, au moment de la mort, il n'y a d'obstacle au retour du sang rouge déjà produit dans les cavités gauches du cœur, qui se déchargent librement dans l'aorte au moment où l'impulsion du ventricule droit tend encore à introduire de nouveau sang noir dans les poumons. Donc nous n'avons aucune raison pour admettre la stagnation du sang rouge dans l'organe respiratoire ; et ce n'est point de cette manière que nous pouvons expliquer la couleur vermeille que cet organe présente. On ne l'attribuera pas, sans doute, au sang stagnant dans les artères bronchiques, ces artères étant trop peu nombreuses pour pouvoir donner à tout l'organe pulmonaire la rougeur uniforme que nous lui trouvons.

Enfin, on ne dira point que cette rougeur résulte d'un état d'inflammation du poumon, car on l'ob-

serve sur des sujets qui, évidemment, n'ont offert pendant la vie aucun symptôme de cette maladie; on la trouve sur les poumons de presque tous les enfans, de quelque maladie qu'ils soient morts. D'ailleurs, l'effet ordinaire de l'inflammation est de déterminer sur la partie où elle a lieu un afflux plus considérable de sang déjà rouge, mais non de changer par elle-même en rouge le sang encore noir.

Je m'abstiendrai donc ici de toute explication, n'ayant actuellement aucune donnée suffisante pour trouver la véritable. Ce qu'il y a de certain, c'est que, quand on incise le poumon à l'endroit de ces taches rouges, on trouve un sang vermeil dans le tissu de l'organe, et que ce sang ôté, la tache rouge disparoît. Pour bien s'assurer de ceci, il faut choisir un poumon sain, qui contienne peu de sang, et où l'on puisse comparer la couleur propre de l'organe avec la couleur accidentelle que le sang lui donne en quelques endroits. J'observe encore qu'il faut distinguer avec soin la couleur du poumon de celle qui appartient quelquefois à la plèvre seule, lorsque cette membrane a perdu, par un état de maladie, sa diaphanéité naturelle.

5°. *Densité.*

Les poumons sont, de tous les organes formés par des tissus solides, les moins denses et les moins résistans. Comprimés par le doigt ils cèdent avec facilité, conservent long-temps l'impression, et ne reviennent qu'incomplètement ensuite à leur état primitif. Je suppose ici les poumons dans leur état le plus naturel, c'est-à-dire, sans engorgement san-

guin, et remplis seulement de cette portion d'air qui ne les abandonne jamais dès qu'ils ont été distendus une fois par ce fluide. Si le sang les remplit et les engorge, ils acquièrent alors une consistance étrangère à leur tissu propre, résistent beaucoup plus à la pression, et se rétablissent plus promptement lorsqu'ils y ont cédé. Aussi remarque-t-on, pour l'ordinaire, que la mollesse et la flaccidité qui distinguent en général l'organe pulmonaire, sont plus sensibles sur les sujets morts par hémorragie que sur les autres.

Cette mollesse, cette flaccidité, moins marquées, sans doute, dans l'état de vie qu'après la mort, mais toujours essentielles à l'organe pulmonaire, dépendent évidemment de ce qu'il n'est qu'un véritable assemblage de divers systèmes vasculaires, comme nous le verrons bientôt plus en détail. Elles se trouvent en rapport avec la manière dont la respiration s'exécute, puisque jamais les poumons ne doivent se mouvoir par eux-mêmes, et que toujours dilatés ou resserrés passivement, ils suivent avec rigueur les mouvemens de l'appareil locomoteur thorachique, moyen nécessaire de leurs phénomènes.

§ II. *Organisation intime.*

Il faut distinguer, dans l'organisation intime du poumon, la membrane qui le recouvre et les parties qui servent essentiellement à le constituer.

Chaque poumon est revêtu par une membrane séreuse particulière nommée *plèvre*, qui en forme, pour ainsi dire, le tégument propre, et qui s'étend également sur les parois pectorales.

Les poumons sont essentiellement formés, 1°. par un conduit cartilagineux et membraneux destiné à leur transmettre l'air; 2°. par deux systèmes vasculaires, dont l'un appartenant à l'artère pulmonaire termine le système général à sang noir, l'autre appartenant aux veines pulmonaires commence le système général à sang rouge; 3°. par un tissu propre dans lequel les trois ordres de vaisseaux dont je viens de parler se réunissent, et que le tissu cellulaire pénètre de toutes parts.

I°. *Des deux Plèvres.*

Je place ici la description des deux plèvres, quoique l'usage soit, en anatomie, de les considérer isolément et comme des organes particuliers. Les belles considérations de Bichat sur les membranes séreuses tendroient, ce semble, à confirmer cet usage et à lui donner plus de poids, puisqu'elles nous montrent ces membranes en général, et en particulier les plèvres, distinctes des organes qu'elles recouvrent, par leur nature, leurs propriétés, leurs maladies, etc. Mais, 1°. cette manière abstractive de les considérer, nécessaire dans un traité d'anatomie générale, où il s'agit de connoître la nature des tissus, ne peut convenir dans l'anatomie descriptive, où il s'agit seulement d'observer la disposition des organes formés de plusieurs tissus réunis; 2°. on est encore forcé, dans cette dernière étude, d'envisager abstractivement une membrane séreuse qui appartient en même temps à plusieurs organes différens de nature et de fonctions, comme le péritoine; mais il n'en est pas de même lorsqu'une membrane semblable n'existe que pour un organe particulier; 3°. il est évident que

la plèvre existe pour le poumon sous tous les rapports possibles ; car, d'un côté elle l'enveloppe immédiatement et constitue sa membrane propre ; de l'autre elle lui forme, en se réfléchissant sur les parties voisines, une cavité distincte qui n'appartient qu'à lui, et dont la figure, l'étendue sont toujours rigoureusement mesurées sur la figure et le volume que le poumon doit avoir.

Les deux plèvres se comportent de la même manière chacune de son côté : il suffit donc d'en décrire une jusqu'à l'endroit où elles se rapprochent l'une de l'autre pour former un repli commun.

Chaque plèvre, représentant, comme toute membrane séreuse, un sac sans ouverture, il faut nécessairement, pour concevoir sa disposition, la prendre dans un point quelconque de son étendue, la suivre dans son trajet sur les parties qu'elle recouvre, et la ramener au point d'où on l'a supposée partie. Prenons-la sur les parties latérales du sternum.

Partie de cet endroit, elle se porte en dehors sur les parois pectorales, qu'elle tapisse dans toute leur étendue, appliquée immédiatement sur les côtés, séparée des muscles intercostaux par les vaisseaux et nerfs du même nom, et par un tissu cellulaire peu graisseux ; elle parvient ainsi transversalement jusqu'à la colonne vertébrale, et en même temps se réfléchit en bas sur le diaphragme dont elle recouvre la face supérieure, en haut sous la première côte où elle forme un cul-de-sac destiné à loger le sommet du poumon, pour se continuer ensuite soit en haut, soit en bas avec le repli antérieur dont nous parlerons bientôt. Vers les têtes des côtes, la plèvre recouvre les gan-

glions thorachiques et leurs rameaux, puis se porte sur les côtés du corps des vertèbres dorsales dont un tissu cellulaire très-graisseux la sépare.

Parvenue au devant de la colonne vertébrale la plèvre se trouve rapprochée de celle du côté opposé, et l'espace étroit qui reste entre elles est rempli par l'aorte descendante, l'œsophage, le canal thorachique, environnés d'un tissu cellulaire lâche. Cet espace, connu sous le nom de *médiastin postérieur*, n'est point triangulaire comme on le suppose communément, puisque les plèvres ne se touchent point au-devant de lui, mais se portent isolément sur les côtés du péricarde. Il seroit plutôt quadrilatère ; mais, pour mieux dire, il n'a de forme que celle que lui donnent l'aorte et l'œsophage qui le remplissent entièrement. Sa direction est verticale, tout-à-fait parallèle à celle de la colonne vertébrale.

Au-devant de cet espace, chaque plèvre se porte sur la partie latérale correspondante du péricarde dont elle recouvre d'abord une fort petite portion, pour se réfléchir aussitôt sur la partie postérieure des vaisseaux pulmonaires et se porter au poumon ; elle tapisse la face convexe, le sommet et la base de cet organe, en s'enfonçant profondément entre ses lobes qu'elle recouvre chacun en particulier par-tout où ils sont distincts, revient ensuite sur sa face plane, et arrive à la partie antérieure des vaisseaux pulmonaires sur lesquels elle se réfléchit de nouveau, pour continuer son trajet sur les côtés du péricarde qu'elle recouvre jusqu'à sa partie antérieure. Là, elle se trouve rapprochée une seconde fois de la

plèvre opposée, et toutes deux se réfléchissent aussitôt pour se porter ensemble à la partie postérieure du sternum, en formant ainsi la cloison qu'on nomme *médiastin antérieur*, ou simplement *médiastin*, terme que nous conserverons pour la commodité de la description, en observant qu'il ne désigne point un organe particulier, comme on le supposoit autrefois.

Parvenues à la partie postérieure du sternum, les deux plèvres s'y fixent, se réfléchissent aussitôt en dehors chacune de son côté, et se retrouvent au point où nous les avions prises.

Nous voyons donc la plèvre former exactement le sac sans ouverture dont nous avions parlé, de manière que, recouvrant par sa surface externe et le poumon et les organes voisins, elle ne correspond qu'à elle-même dans tous les points de sa surface interne : nous voyons, qu'étendue en dehors sur les parois thorachiques, elle forme seule en dedans la cavité propre au poumon dont elle dépend. Revenons un instant sur cette portion interne des deux plèvres ou médiastin, pour en examiner avec plus de soin la disposition.

1°. Le médiastin n'a point une direction perpendiculaire et droite, de manière à se trouver parallèle au sternum, comme on seroit d'abord tenté de le croire. Dirigé un peu obliquement de haut en bas et de droite à gauche, il correspond en haut à l'endroit où les cartilages costaux droits s'unissent au sternum, vers son milieu au sternum seul, en bas à une partie des cartilages costaux du côté gauche. Cette obliquité est l'effet nécessaire de l'inégalité

de volume des deux poumons, inégalité due, comme nous l'avons remarqué plus haut, à l'inclinaison du cœur à gauche. En effet, le poumon gauche étant moins developpé antérieurement que le droit, il faut bien que les plèvres, toujours rigoureusement adaptées à la forme des poumons, forment une cavité plus large a droite, moins large à gauche.

2°. Les deux plèvres, en se rapprochant pour former le médiastin, ne peuvent s'adosser ensemble et se trouver contiguës l'une à l'autre que dans une fort petite étendue qui répond toujours à l'endroit où les gros vaisseaux sortent du cœur. Car chaque plèvre, considérée dans sa portion thorachique, est nécessairement conformée comme le poumon dont elle constitue la cavité propre et qu'elle doit toujours embrasser exactement. Or, les poumons sont écartés l'un de l'autre à leur sommet, se rapprochent à leur partie moyenne où d'un côté ils augmentent de volume, de l'autre ils ne sont séparés que par les gros vaisseaux du cœur, s'écartent beaucoup en bas malgré leur augmentation de volume, parce que le cœur tout entier se trouve entre eux : donc les plèvres doivent suivre la même disposition et se trouvent écartées en haut, rapprochées et contiguës vers le milieu, fort écartées en bas : c'est aussi ce qu'on observe constamment. Vers la partie supérieure du thorax, les deux lames du médiastin laissent entre elles un espace triangulaire dont la base est en haut, le sommet en bas, espace que le thymus occupe chez l'enfant, que le tissu cellulaire remplit à tout âge. Un peu plus bas et au-devant des gros vaisseaux, les plèvres se rapprochent, sont contiguës et séparées

seulement par un tissu cellulaire peu abondant, qui leur permet de glisser facilement l'une sur l'autre; mais bientôt après elles s'écartent de nouveau inférieurement, et laissent entre elles un nouvel espace triangulaire dont la base est en bas et répond au diaphragme, tandis que le sommet supérieur se perd au point de contiguité des deux membranes. Ce dernier espace, beaucoup plus large que le supérieur, est occupé par un tissu cellulaire abondant et souvent rempli de beaucoup de graisse jaunâtre.

Ainsi, le médiastin ou la réunion antérieure des deux plèvres, représente véritablement une espèce d'X dont les branches inférieures sont plus écartées que les supérieures. On voit très-bien cette disposition, lorsqu'après avoir enlevé le sternum, on observe au-devant du péricarde les lambeaux des deux plèvres coupées suivant leur longueur.

Quand on soulève le sternum, soit en haut, soit en bas, l'espace qui sépare les deux plèvres augmente, parce que l'une et l'autre membrane se détachent en partie du sternum et des cartilages costaux auxquels elles adhéroient; il se produit même un espace artificiel dans l'endroit où les plèvres étoient naturellement contiguës, et le tissu cellulaire peu abondant qui les réunissoit paroît tiraillé et distendu en divers sens. Si on remet alors le sternum dans sa position naturelle, on voit l'espace diminuer, les deux plèvres se rapprochant comme auparavant.

Chez certains sujets, on a vu les deux plèvres se porter chacune isolément au sternum, et s'y fixer

sans s'être trouvées contiguës en aucun point, de manière qu'un espace considérable séparoit dans toute leur longueur les lames du médiastin.

Le tissu cellulaire qui réunit ici les deux plèvres communique librement en haut avec celui du cou, en bas avec celui de l'abdomen. Dans les deux espaces triangulaires dont nous avons parlé, il contient ordinairement plus ou moins de graisse ; dans l'endroit où les plèvres sont contiguës, il paroît absolument dépourvu de ce fluide, et offre un aspect filamenteux, quoiqu'il soit toujours très-lâche.

Ce tissu cellulaire est susceptible d'inflammation comme celui des autres parties, quoique moins fréquemment ; et cette inflammation, lorsqu'on l'a observée, a paru présenter les mêmes caractères que celle du tissu cellulaire sous-cutané dans le phlegmon : la suppuration en est la terminaison ordinaire, et il en résulte des dépôts plus ou moins considérables, dépôts qui tantôt fusent dans les parois abdominales par l'espace triangulaire antérieur du centre diaphragmatique, tantôt et plus souvent s'accroissent dans le médiastin lui-même, et se manifestent par des symptômes qu'il n'est point de mon objet actuel de détailler.

Je ferai seulement une remarque sur les changemens anatomiques que déterminent nécessairement ces dépôts.

Pour concevoir ces changemens, il faut, 1°. se rappeler que les membranes séreuses sont en général peu extensibles, et prêtent plutôt en se développant qu'en se distendant ; 2°. remarquer que les plèvres adhèrent beaucoup plus aux côtés du péricarde qu'au ster-

num et aux côtes d'où on les détache toujours avec beaucoup de facilité.

Ceci étant établi, on comprend sans peine que les dépôts dont il s'agit se développent d'abord d'avant en arrière, c'est-à-dire, que le pus s'accumule dans le sens où il trouve le moins de résistance. Cette accumulation augmente les écartemens naturels des deux plèvres, et produit un écartement extraordinaire dans l'endroit où ces deux membranes étoient contiguës.

Mais lorsque le pus continue à s'amasser, comme il ne peut pas distendre les plèvres au-delà d'un certain degré, il faut nécessairement qu'il les détache dans un des endroits voisins où elles sont adhérentes : ces endroits sont le péricarde en arrière, les parois thorachiques en devant. Or, les plèvres adhèrent beaucoup plus au péricarde qu'aux parois thorachiques ; ce sera donc en devant et non en arrière qu'elles seront détachées dans une étendue plus ou moins grande ; le dépôt s'accroîtra donc désormais dans une direction transversale en dénudant d'abord les côtés du sternum, puis les cartilages costaux, puis les côtes, si l'on pouvoit supposer que la maladie durât assez long-temps sans produire des accidens mortels.

On conçoit dès-lors comment la trépanation du sternum, moyen indiqué pour évacuer le pus dans les abcès du médiastin, n'est absolument nécessaire que pour les abcès peu considérables, et devient inutile plus tard, le pus correspondant alors aux muscles intercostaux et pouvant être évacué par l'opération de l'empyème, comme l'observe le cit. Sabatier. On conçoit, comment dans certains cas dont

parle le même auteur, le pus a traversé les muscles intercostaux, et est venu former à l'extérieur sous la peau un véritable dépôt par congestion.

Enfin on conçoit que l'effet naturel des abcès du médiastin doit être dans le premier temps de gêner les mouvemens du cœur, puisque le pus comprime le péricarde moins résistant que le sternum ; dans le second temps, de gêner les mouvemens des poumons, puisqu'il rétrécit l'une et l'autre cavité thoracique en augmentant, aux dépens des plèvres, l'espace qu'il doit occuper.

Le médiastin remplit, à l'égard des poumons, un usage assez analogue à celui que remplit la faux à l'égard des hémisphères cérébraux : il sépare ces deux organes, et empêche que l'un ne se porte sur l'autre dans la récubation sur le côté, ce qui seroit d'autant plus facile qu'aucun lien naturel ne retient le poumon à sa place, excepté les vaisseaux qui se rendent à lui vers le milieu de sa face interne, et qui n'empêcheroient point son mouvement latéral.

Mais ce qui mérite surtout d'être remarqué, c'est que, par cette disposition extérieure des deux plèvres, les portions essentiellement mobiles du thorax, qui renferment les poumons, se trouvent distinctes de la portion plus fixe qui renferme les premiers organes circulatoires. Observez, en effet, que la région du thorax circonscrite par le médiastin est précisément celle que constituent en arrière la colonne vertébrale, en devant le sternum, en bas le centre phrénique, parties peu mobiles, et qui jouent le rôle le moins actif dans les phenomènes mécaniques de la respiration.

Je reviens aux plèvres. La surface extérieure de ces membranes, rugueuse, inégale, correspond à une foule de parties différentes et leur adhère plus ou moins. Facile à détacher du sternum, des côtes et de leurs intervalles musculeux, aussi bien que des côtés de la colonne vertébrale, elle est unie d'une manière beaucoup plus intime à la substance propre des poumons, et semble faire corps avec ces organes, à-peu-près comme le péritoine paroît faire corps avec plusieurs viscères abdominaux. Cependant on parvient à la détacher du poumon dans une assez grande étendue par la simple dissection; on trouve même alors entre elle et la substance propre, une espèce de membrane secondaire assez dense. Mais cette membrane secondaire paroît n'être autre chose que le tissu cellulaire qui a changé de forme et acquis plus de consistance : ce qui le prouve, c'est ce qui arrive lorsqu'on soumet à l'ébullition une portion de l'organe pulmonaire; la plèvre alors devient très-distincte sur lui, augmente d'épaisseur, s'enlève avec la plus grande facilité; et on ne voit alors, entre elle et la substance propre, qu'un tissu cellulaire extrêmement lâche et peu abondant.

Les divers degrés d'adhérence de la surface extérieure de la plèvre ne s'observent nulle part aussi bien que sur le péricarde. Qu'on prenne une des plèvres à l'endroit où elle se réfléchit pour former le médiastin, et qu'on la soulève de dedans en dehors, on la trouvera unie d'abord au péricarde d'une manière très-lâche vers le point de cette réflexion, plus fixe à mesure qu'on se rapproche du poumon, et enfin impossible ou très-difficile à détacher de la

portion du péricarde qui se prolonge en dehors sur les vaisseaux pulmonaires.

La surface intérieure de la plèvre, par-tout contiguë à elle-même, comme nous l'avons dit, offre un aspect lisse et pâle dû au fluide séreux dont la membrane est la source. Ce fluide continuellement exhalé, continuellement absorbé, favorise sans doute le jeu des organes respiratoires, en isolant le poumon des parois thorachiques qui l'environnent. Mais son existence est-elle nécessaire aux phénomènes de la respiration ? cette fonction est-elle gênée d'une manière sensible lorsque le fluide séreux cesse d'être produit, et qu'il y a continuité entre les portions costale et pulmonaire de la plèvre ? On a long-temps soutenu l'affirmative, on en a même fait autrefois un principe en médecine, et l'usage d'attribuer la difficulté habituelle de la respiration *à l'adhérence des poumons à la plèvre* n'est point encore tout-à-fait aboli. Cependant, les réflexions suivantes, faites depuis long-temps par Haller, répétées ensuite par d'autres physiologistes, ne permettent plus d'admettre cette idée.

1°. Les expériences les plus positives ont prouvé que, dans l'état sain, il y avoit toujours contiguité parfaite entre les poumons et les parois thorachiques, soit dans l'inspiration, soit dans l'expiration : le raisonnement seul l'auroit démontré. Quelle seroit, en effet, la raison des mouvemens du thorax, si les poumons jouissoient d'un mouvement propre et indépendant ? Mais les poumons et le thorax se mouvant toujours nécessairement de concert, comment pourroit-il y avoir entre eux un espace vide ? et s'il ne

peut y avoir entre eux d'espace vide, comment leur continuité accidentelle pourroit-elle gêner beaucoup leur mouvement ?

2°. Les ouvertures de cadavres prouvent que les cas d'adhérence entre les portions costale et pulmonaire de la plèvre sont excessivement multipliés ; que ces adhérences se trouvent sur le plus grand nombre des sujets, et aussi fréquemment chez ceux qu'une mort violente a surpris dans l'état le plus sain, que chez ceux dont une maladie longue a terminé les jours. Ces adhérences sont de quatre espèces, comme l'a observé Bichat (1). Tantôt les portions costale et pulmonaire paroissent identifiées; tantôt elles sont réunies d'une manière très-lâche; d'autres fois des prolongemens membraneux, en forme de brides, s'étendent de l'une à l'autre, et paroissent des replis naturels de la plèvre elle-même; ailleurs, enfin, ce sont des prolongemens floconneux semblables à des lames de tissu cellulaire qui établissent cette continuité. Ajoutez les cas si nombreux où de fausses membranes développées sur la surface interne de la plèvre produisent des adhérences réellement morbifiques. Or, dans la plus grande partie de ces exemples, les sujets n'avoient point cessé de respirer avec la plus grande liberté. Il est donc évident que la continuité de surfaces entre les poumons et le thorax n'est point un obstacle à la liberté des phénomènes respiratoires.

Dès-lors, l'utilité du fluide séreux de la plèvre ne peut point nous être aussi clairement connue que

(1) Anat. génér., tom. IV, p. 505.

celle du fluide séreux des autres cavités semblables; et remarquons en effet que par-tout ailleurs nous avons, pour apprécier cette utilité, des données qui nous manquent absolument ici. L'appareil respiratoire est le seul qui nous offre les parois d'une cavité en rapport rigoureux et nécessaire de mouvemens avec les organes que cette cavité renferme. Le cerveau tend à se mouvoir dans une boîte osseuse immobile; les viscères gastriques peuvent changer de rapport et de disposition sans que les parois abdominales y prennent aucune part; dans les cavités synoviales nous trouvons toujours deux surfaces qui se meuvent en sens inverse l'une de l'autre, etc., etc. Par-tout nous voyons les diverses portions d'une surface séreuse glisser les unes sur les autres d'une manière plus ou moins marquée, et nous concevons sans peine que la présence d'un fluide y étoit indispensable. Le thorax seul nous présente deux portions séreuses toujours contiguës de la même manière, toujours en rapport mutuel sur les mêmes points.

La plèvre jouit de la diaphanéité commune à toutes les membranes de la même classe. Rapprochée par elle-même du blanc, elle permet presque par-tout de distinguer exactement la couleur des parties subjacentes. Ceci est sensible sur le diaphragme dont on reconnoît toutes les fibres au travers de la plèvre; mais plus encore sur le poumon dont la plèvre laisse distinguer sans aucune peine toutes les nuances, moins parce qu'elle y est plus ténue, que parce qu'elle y est plus adhérente. L'ébullition fait perdre absolument à la plèvre cette transparence, et lui donne une couleur blanche terne assez prononcée.

Tout ce qui regarde d'ailleurs l'organisation intime de la plèvre s'applique au tissu séreux considéré en général. Le lecteur trouvera dans l'Anatomie générale ces détails qu'il est inutile de répéter ici.

On remarquera que la plèvre ne présente point comme les autres membranes séreuses ces replis lâches et flottans dont l'usage est de prêter à l'ampliation accidentelle des organes; car le médiastin ne peut point être considéré comme destiné à un pareil usage, vu sa fixité, sa tension habituelle; vu, surtout, l'usage essentiel que nous lui avons reconnu, de compléter en dedans les cavités qui contiennent les poumons. La raison de cette exception est facile à saisir, d'après tout ce que nous avons déjà dit. Le thorax et les poumons se meuvent toujours de concert. La dilatation des poumons, quelque considérable qu'elle puisse être, se trouve toujours répartie sur tous les points avec une parfaite uniformité, ce qui la rend peu étendue sur chaque point en particulier; d'ailleurs cette dilatation n'excède jamais de beaucoup le volume habituel des organes; une très-petite quantité d'air est introduite à chaque inspiration ordinaire, et l'inspiration la plus forte n'en introduit jamais assez pour que les poumons aient besoin de ces ressources préparées d'avance à d'autres organes susceptibles d'acquérir un volume double ou triple de celui qu'ils ont naturellement.

2°. *Des Conduits aériens.*

Les conduits aériens forment la partie essentielle des poumons considérés sous le rapport de leurs

fonctions. C'est par eux que s'introduit le fluide destiné à élaborer le sang; c'est dans leur intérieur et sur leurs parois que l'élaboration s'opère; c'est par eux que la portion d'air devenue inutile est rejetée au dehors. Leur ensemble constitue la cavité intérieure de l'appareil respiratoire, cavité analogue à celles de l'appareil digestif par son organisation, puisqu'une membrane muqueuse la revêt, quoiqu'elle en diffère par sa disposition, puisqu'elle est subdivisée en une multitude presqu'infinie de canaux décroissans à la manière des artères. Cet ordre de conduits commence par un tronc unique qui réunit les deux poumons l'un à l'autre, et en forme réellement un seul organe en rendant leurs phénomènes nécessairement simultanés. Seuls de tous les conduits de l'économie, ceux-ci sont constamment ouverts, l'air devant, à tous les instans, y aborder sans aucun obstacle.

On donne à leur tronc commun le nom de *trachée-artère :* leurs divisions prennent celui de *bronches.*

La trachée-artère, située au-devant de la colonne vertébrale, s'étend depuis la partie moyenne supérieure du cou jusqu'à la partie supérieure et profonde de la poitrine. Elle commence au-dessous du larynx, finit au niveau de la seconde ou troisième vertèbre dorsale. Placée sur la ligne médiane, symétrique et régulière dans toute son étendue, elle paroît encore, sous ce rapport, appartenir aux organes extérieurs, et ce sont seulement ses divisions qui perdent ce caractère. Vue antérieurement, elle paroît cylindrique, mais en arrière on la trouve aplatie : ce qui dépend, comme nous le dirons bientôt, de son organisation.

Le diamètre de la trachée-artère est, en général,

relatif à l'âge du sujet et au volume naturel des poumons : il est parfaitement semblable à celui du larynx mesuré, comme il convient, sur le cartilage cricoïde, abstraction faite du thyroïde. Ce diamètre est le même dans toute l'étendue de la trachée-artère ; on ne voit point qu'il décroisse inférieurement, et on le trouve auprès des bronches tout-à-fait égal à ce qu'il étoit au niveau du larynx.

En devant, la trachée-artère est embrassée supérieurement par la glande thyroïde dont les deux portions se réunissent au-devant d'elle. Plus bas et plus superficiellement, elle est recouverte par les muscles sterno-hyoïdiens et sterno-thyroïdiens dont un tissu cellulaire lâche la sépare : dans la poitrine, elle se trouve renfermée dans l'écartement postérieur des deux plèvres, et correspond aux veines sous-clavières, à l'artère innominée, à la courbure de l'aorte.

En arrière elle recouvre l'œsophage et en partie à droite le corps des vertèbres, l'œsophage se trouvant un peu dévié à gauche, comme nous l'avons dit en décrivant l'appareil digestif. Sur les côtés, elle avoisine les veines jugulaires, les artères carotides, les nerfs vagues, les rameaux inférieurs des deux ganglions cervicaux supérieurs : un tissu cellulaire lâche et abondant la sépare de toutes ces parties.

Les bronches naissent de la trachée-artère vers la seconde ou troisième vertèbre dorsale ; elles s'écartent de ce tronc commun en formant entre elles un angle à-peu-près droit, et se portent obliquement en bas et en dehors, chacune du côté du poumon qui lui correspond. Ici on commence à retrouver les traces de cette irrégularité de formes qui distingue les or-

ganes de la vie intérieure. La bronche gauche, un peu moins volumineuse que la droite, parcourt aussi un trajet plus long avant d'arriver au poumon : ceci tient à la déviation du cœur à gauche, déviation de laquelle il résulte que les gros troncs vasculaires, en sortant du cœur, se trouvent presque entièrement appliqués sur la bronche gauche.

C'est à la partie moyenne et à la face interne des poumons que les bronches s'enfoncent dans l'épaisseur de ces organes. Elles se divisent aussitôt en rameaux successivement moins volumineux qui se comportent comme ceux des artères et prennent toute sorte de directions. Les uns se portent obliquement en haut dans le lobe supérieur, les autres horizontalement dans le milieu de l'organe; d'autres enfin suivent la direction primitive de la bronche elle-même en se portant obliquement en bas vers la base des poumons, etc., etc. Ces subdivisions sont aussi nombreuses que celles de l'artère pulmonaire, et il est impossible de les suivre jusqu'à leur dernier terme : il n'est aucune partie du poumon qui n'en reçoive, mais on n'a point d'idée précise de la maniere dont elles finissent. Malpighi et d'autres ont prétendu qu'elles se terminoient par de petites vésicules sur lesquelles les ramuscules capillaires des deux systèmes sanguins venoient s'anastomoser; Keil a même prétendu compter ces vésicules. On doute aujourd'hui de leur existence, quoique dans le langage anatomique on s'habitue assez ordinairement à les supposer.

Les conduits aériens qui, considérés par rapport à l'organe pulmonaire, ne forment qu'un de ses tissus

ou une de ses parties constituantes, considérés en eux-mêmes, forment réellement, par leur ensemble, un organe particulier composé de tissus fort distincts. On peut réduire ces tissus à trois; l'un extérieur en partie fibreux, et, à ce qu'il paroît, en partie musculaire; l'autre cartilagineux réuni au précédent; le troisième intérieur, muqueux. Il faut y joindre les vaisseaux artériels et veineux propres aux bronches, les nerfs qui s'y distribuent, enfin ces corps de nature particulière connus sous le nom de *glandes bronchiques*.

La membrane extérieure des conduits aériens naît supérieurement de la circonférence du cartilage cricoïde, et occupe toute l'étendue soit de la trachée-artère, soit des bronches dont elle forme essentiellement les parois. Assez épaisse dans la plus grande partie de son trajet, elle s'amincit dans les dernières divisions bronchiques et ne peut plus y être facilement aperçue. Elle est formée par des fibres longitudinales parallèles les unes aux autres et assez serrées. Ces fibres, rougeâtres à la superficie des conduits, paroissent blanchâtres comme les autres parties du système fibreux, lorsqu'on les examine plus profondément.

Cette membrane constitue seule en arrière la portion solide de la trachée-artère, ce qui donne à ce conduit la forme aplatie qu'on lui trouve en cet endroit. On remarque avec raison un rapport de disposition entre cette structure molle de la trachée en arrière et la liberté des mouvemens de l'œsophage qui lui est subjacent; mais on auroit tort d'en conclure que l'une n'existe que pour l'autre, puisque la même structure

s'observe également à la partie postérieure des bronches lorsque celles-ci n'ont plus de rapports qu'avec la substance propre des poumons.

Il n'en est pas de même dans la partie antérieure, ou plutôt dans la plus grande étendue transversale des conduits aériens. Ici la membrane extérieure est continuellement interrompue par des portions cartilagineuses développées dans son tissu et destinées à la tenir continuellement tendue pour que, dans aucune circonstance, les conduits ne soient affaissés sur eux-mêmes et oblitérés. Chacun de ces cartilages représente à-peu-près les deux tiers d'un anneau : recourbés sur eux-mêmes, aplatis suivant leur épaisseur, ils ont une longueur uniforme, une largeur très-inégale : tous répondent à l'extérieur du conduit par leur face convexe sur laquelle plusieurs fibres de la membrane se continuent : par leur face concave ils répondent à la membrane muqueuse dont une couche celluleuse mince les sépare. Leurs bords supérieurs et inférieurs arrondis, continus en dehors avec le tissu fibreux, sont un peu plus saillans à l'intérieur du conduit et se prononcent au travers de la membrane muqueuse. Leurs extrémités plus ou moins saillantes en arrière dans le tissu fibreux sont toutes au même niveau, arrondies et le plus souvent un peu recourbées en haut suivant la largeur du cartilage. Le nombre de ces cartilages varie beaucoup par diverses raisons : 1°. ils sont plus ou moins larges, et la longueur de la trachée devant toujours être à-peu-près la même, on les trouve nécessairement d'autant plus multipliés qu'ils sont plus étroits. On dit qu'en général leur plus grande largeur est antérieurement et qu'ils diminuent progressive-

ment en arrière : rien n'est moins constant. Très-souvent ils sont étroits en devant et s'élargissent sur les côtés, en sorte qu'on ne peut rien statuer sur cet article; 2°. quelquefois deux cartilages s'unissent par leurs bords respectifs et se confondent, ce qui diminue leur nombre.

En général ces cartilages ont une direction horizontale relativement à l'axe du conduit auquel ils appartiennent : mais ceci est sujet à une foule de variations. On en trouve beaucoup qui sont plus ou moins obliques, en sorte que les intervalles qui les séparent sont nécessairement fort inégaux.

La couleur de ces cartilages est assez semblable à celle des cartilages des autres cavités : ils ont une blancheur moins éclatante que ceux des surfaces articulaires. Très-élastiques, ils sont susceptibles de plier à un degré assez considérable sans se rompre.

Telles sont, en général, les considérations que nous offrent les parties les plus solides des conduits aériens. Il nous reste quelques détails à donner sur deux des cartilages de la trachée et sur ceux des ramifications bronchiques.

Le cartilage qui commence en haut la trachée se distingue presque toujours des autres par une largeur beaucoup plus grande. Assez souvent on le trouve continu supérieurement avec le cricoïde ou inférieurement avec celui qui lui succède. Ceux qui suivent diminuent tout-à-coup de largeur sans gradation marquée.

Le cartilage qui termine en bas la trachée se distingue toujours par sa forme appropriée à la disposition des bronches. Son milieu se prolonge inférieurement en angle aigu en se recourbant un peu en

arrière, en sorte que le cartilage représente un triangle recourbé sur son plat en deux sens à la fois, ayant sa base en haut, son sommet en bas et deux bords concaves qui reçoivent le commencement des bronches. Assez fréquemment il se continue immédiatement par un de ces bords, ou même par tous deux, avec les premiers cartilages bronchiques.

Dans les rameaux des bronches, les cartilages deviennent insensiblement plus irréguliers pour la forme, et proportionnellement moins étendus; ils n'offrent plus aussi exactement cette disposition annulaire que nous avons remarquée; bientôt ils se réduisent à de petits grains de figure variable, tantôt séparés, tantôt réunis. A mesure que les subdivisions vasculaires se multiplient, ils deviennent eux-mêmes moins solides, moins résistans, et disparoissent enfin tout-à-fait, en sorte qu'on ne trouve plus que les membranes lorsqu'on est arrivé au dernier terme où l'œil peut suivre les ramuscules aériens.

Je le répète, on ne doit considérer ces cartilages, quel que soit leur nombre, que comme les dépendances et, pour ainsi dire, les accessoires, nécessaires de la membrane extérieure qui seule existe par-tout comme base des conduits dont nous parlons et qui offre partout des fibres longitudinales disposées de la même manière, avec la seule différence qu'en arrière ces fibres sont continues dans tout le système des voies aériennes, tandis qu'en devant elles sont sans cesse interrompues par des parties plus solides développées au milieu d'elles. J'ai donc décrit les cartilages comme concourant à l'organisation de la membrane extérieure à laquelle je reviens maintenant.

La surface extérieure de cette membrane est parsemée en arrière de petits corps rougeâtres, de figure très-variée, tantôt arrondis, tantôt ovales, etc. Ce sont des glandes muqueuses dont les canaux excréteurs traversent toute l'épaisseur du conduit pour s'ouvrir sur sa surface interne. On s'en assure facilement en enlevant ces glandes avec precaution sans entamer le tissu fibreux. On voit alors à l'endroit où chaque glande correspondoit, un petit trou à bords arrondis par où le conduit excréteur s'introduisoit. En devant la membrane extérieure n'offre pour l'ordinaire aucune glande dans les intervalles des cartilages.

La surface intérieure de la même membrane considérée dans ces mêmes intervalles des cartilages, correspond à la muqueuse dont elle est séparée par une multitude de petites granulations de couleur variable, fort rapprochées et fort irrégulières. Il paroît que ce sont aussi des glandes muqueuses. Mais en arrière on trouve au-dessous de la membrane fibreuse une couche de fibres transversales très-rapprochées les unes des autres, très-denses, étendues entre les deux extrémités flottantes des cartilages auxquels elles s'attachent. Ces fibres ne ressemblent point du tout aux fibres longitudinales qui constituent la membrane extérieure. Car elles sont disposées par petits faisceaux, tandis que les longitudinales sont disposées en membrane. Elles n'ont point la couleur blanche aponévrotique des longitudinales et paroissent absolument analogues par l'aspect qu'elles présentent, aux fibres musculeuses des intestins. Enfin elles forment un plan tout-à-fait distinct, et des fibres longitudinales de la membrane extérieure, puisqu'on peut introduire le scalpel entre

les unes et les autres avec facilité, et de la membrane muqueuse à laquelle elles ne tiennent que par un tissu cellulaire extrêmement lâche. Le meilleur moyen de reconnoître ces fibres transversales c'est d'enlever la membrane muqueuse qui les recouvre à l'intérieur.

Quelle est la nature de ces fibres transversales postérieures ? On est fort porté à les croire musculeuses, d'après leur analogie apparente avec les fibres intestinales. Haller les regarde comme telles sans balancer ; mais il les confond avec les longitudinales qui constituent la membrane externe, quoique celles-ci diffèrent absolument des premières et paroissent, comme nous l'avons dit, appartenir au système fibreux.

En supposant vraie cette opinion sur la nature des fibres transversales, il faut reconnoître dans la trachée-artère la faculté de se resserrer et de se dilater dans certaines circonstances : plusieurs anatomistes la lui accordent en effet. Mais on ne voit pas qu'aucun ait cherché à déterminer exactement les cas où ces mouvemens s'opéroient, ni même à s'assurer par des expériences positives s'ils avoient réellement lieu.

La membrane muqueuse, troisième partie propre des conduits aériens, est la seconde division de la grande membrane désignée par Bichat sous le nom de *gastro-pulmonaire*. Née du pharynx, elle s'enfonce dans l'organe vocal et continue son trajet dans la trachée et les bronches jusqu'à leurs dernières ramifications. Existe-t-elle seule dans ces extrémités ténues ? On ne peut s'en assurer, mais on est assez porté à le croire, vu la nécessité du rapport le plus prochain possible entre les vaisseaux sanguins et aériens pour que les phénomènes chimiques de la respiration

s'opèrent, au moins selon notre manière ordinaire de concevoir ceux-ci. Sa surface externe correspond en arrière à la couche des fibres transversales dont elle est séparée, comme nous l'avons vu, par un tissu cellulaire assez lâche. Dans le reste de son étendue, cette surface est appliquée en partie sur les cartilages dont la forme se dessine au travers d'elle, vu la saillie qu'ils font à l'intérieur et en partie sur la membrane fibreuse dans les intervalles de ces corps solides. On la sépare facilement de toutes ces parties par la dissection.

Sa surface interne répond à l'intérieur des conduits. Les canaux excréteurs des glandes muqueuses s'ouvrent sur elle d'une manière souvent assez distincte. Elle n'a point dans l'état naturel la rougeur qu'on observe dans celle du pharynx. En l'observant en arrière, dans l'espace dépourvu de cartilages, on y voit une multitude de plis longitudinaux extrêmement saillans et assez réguliers. Ces plis sont aussi apparens dans les bronches que dans la trachée, et correspondent toujours à la partie où le conduit aérien est purement membraneux. On n'en trouve point ailleurs. Si l'on se rappelle que la couche des fibres transversales n'existe non plus que dans cette portion membraneuse, et se trouve immédiatement subjacente à la membrane interne, on sera tenté de regarder les plis dont nous parlons comme on regarde ceux de l'œsophage, et de les attribuer uniquement à la contraction des fibres transversales dont ce phénomène paroîtra prouver de plus en plus la nature musculeuse. Mais on a beau distendre en largeur la portion membraneuse de la trachée, ces plis ne disparoissent point et ne diminuent même pas sensiblement. Si l'on détache avec

soin par la dissection la membrane muqueuse dans toute cette partie, les plis subsistent encore sur le lambeau isolé et y sont également saillans. On voit par la même préparation qu'ils sont dus à des bandelettes ou colonnes fibreuses intimement adhérentes à la surface externe de la membrane muqueuse, et faisant corps avec elle. On ne peut en effet enlever cette membrane sans les enlever aussi. Ces bandelettes ont une analogie encore plus frappante que les fibres transversales avec les faisceaux musculeux des intestins, si ce n'est qu'elles sont isolées et écartées plus ou moins les unes des autres. On peut penser que Willis avoit fait les mêmes observations, puisqu'il attribue les plis de la membrane muqueuse pulmonaire à des fibres musculeuses existantes dans son tissu. C'est exactement ce que l'autopsie cadavérique m'a démontré, excepté cependant la nature musculeuse de ces fibres sur laquelle je ne crois pas pouvoir absolument prononcer.

Un fluide muqueux lubrifie continuellement cette surface interne dont nous parlons. Peu abondant dans l'état le plus naturel, il est dissous par l'air et rejeté ainsi au dehors dans l'expiration. Accumulé en plus grande quantité dans une foule de circonstances accidentelles il est expulsé en nature par les efforts expiratoires subits qui constituent la toux.

Outre ce fluide, plusieurs en admettent encore ici un autre fourni par exhalation. Haller ne combat point cette opinion, mais n'y insiste pas et ne cherche point à la prouver (1). Elle paroît en effet peu susceptible

(1) On ne trouve à cet égard dans Haller que ces mots : *Sed*

d'être appuyée par des faits bien positifs et bien concluans.

L'organisation de la membrane muqueuse des voies aériennes est celle du système muqueux considéré dans son ensemble. Je renvoie donc le lecteur sur cet article à l'*Anatomie générale*. Bornons-nous ici à indiquer les modifications particulières de cette organisation dans la membrane dont il s'agit.

Dans aucune portion de son étendue on ne peut démontrer complètement l'existence de l'épiderme. Elle est en effet éloignée dans tous ses points des ouvertures extérieures, seuls endroits où cet épiderme ait pu être manifestement reconnu. L'unique preuve que l'on puisse acquérir ici se tire des cas pathologiques où des fragmens membraneux ont été rendus par expectoration. Haller en cite plusieurs et n'admet que d'après eux un épiderme muqueux pulmonaire. Mais cette preuve est insuffisante, comme l'observe judicieusement Bichat, ces lambeaux pouvant être analogues aux escarres plus ou moins profondes produites sur la peau par les brûlures, etc.

Le corion qui constitue la partie principale de la membrane muqueuse pulmonaire n'offre aucune considération particulière, si ce n'est sa diminution progressive d'épaisseur à mesure que les ramifications bronchiques deviennent plus ténues.

Le peu de rougeur que présente habituellement cette membrane, indique que le système capillaire sanguin propre à son organisation y est peu pro-

---

neque exhalationem vasculosam exclusero. Elem physiol. t. 3, p. 150.

noncé. Il y devient plus sensible dans une foule de circonstances et spécialement dans les affections catarrhales auxquelles la muqueuse pulmonaire est plus sujette que toute autre. Le sang s'accumule alors dans ce système capillaire et donne à la membrane la couleur rouge qu'elle n'avoit point dans son état naturel.

La membrane muqueuse envisagée sous le rapport de ses fonctions nous offre les considérations les plus importantes. L'anatomiste voit dans elle le tégument intérieur de l'organe pulmonaire comme il voit dans la plèvre son tégument extérieur. Moins étendue au prémier coup-d'œil que la plèvre, elle l'est beaucoup plus sans doute en réalité, vu les ramifications presqu'infinies des conduits aériens qu'elle tapisse jusqu'à leur dernier terme.

Mais le physiologiste voit dans la membrane muqueuse le théâtre du plus grand phénomène de la respiration, de celui pour lequel tous les autres s'opèrent, je veux dire, du changement d'état du sang au moyen de l'air. Le sang, en effet, ne peut recevoir l'influence de l'air qu'au travers des parois de cette membrane, puisque, selon l'opinion la plus commune, l'air introduit dans le poumon ne sort point des ramifications bronchiques pour aller colorer le sang par un contact immédiat. D'ailleurs, en supposant même que l'air soit porté au sang par voie d'absorption, comme certains physiologistes le prétendent, toujours seroit-il vrai que la membrane muqueuse est l'agent nécessaire de cette absorption, par conséquent l'organe essentiel de la coloration du sang.

On peut faire ici un rapprochement frappant entre

la membrane qui tapisse l'organe pulmonaire dans son intérieur et l'appareil locomoteur qui l'environne au dehors, formés par l'ensemble des muscles intercostaux et diaphragme. L'une est le théâtre des phénomènes chimiques, comme l'autre est l'agent des phénomènes mécaniques de la respiration. C'est par l'appareil locomoteur que le poumon est dilaté pour recevoir l'air : c'est sur la membrane muqueuse que l'air est reçu, élaboré, employé. Aussi y a-t-il une correspondance exacte de phénomènes entre ces deux parties de l'appareil respiratoire. Lorsque l'air contenu dans les voies aériennes a perdu, après un certain séjour, la propriété de colorer le sang, les mouvemens du thorax nécessaires pour l'expulser et pour en recevoir de nouveau sont déterminés d'une manière presque absolument involontaire, et toute irritation portée à l'intérieur des bronches cause à l'instant dans le thorax ces mouvemens vifs et subits qui constituent la toux.

L'air respirable est donc le fluide naturel de la membrane muqueuse du poumon. C'est avec lui seul qu'elle se trouve en rapport par son mode de sensibilité propre; tout autre fluide est repoussé par elle et dès l'instant où elle éprouve ainsi une influence étrangère; incapable de s'en délivrer par elle-même, elle appelle à son secours, par une sympathie constante, l'action des muscles extérieurs dont l'usage est de favoriser la fonction qu'elle exécute.

C'est aux conduits aériens que se distribuent principalement les vaisseaux et les nerfs qui entrent dans l'organisation intime des poumons : ils suivent exactement, par leurs branches, le trajet de ces conduits,

et leurs rameaux les plus ténus sont les seuls qui s'en écartent pour se jeter vaguement dans la substance propre des poumons. Il est même probable que ces derniers suivent encore les ramifications bronchiques, puisque, comme nous l'avons dit, ces ramifications sont presque infinies, et qu'il n'est aucune partie des poumons qui n'en présente.

Les conduits aériens reçoivent leurs artères de plusieurs sources. Celles de la trachée lui viennent des thyroïdiennes et spécialement des thyroïdiennes inférieures les plus rapprochées d'elle. Quant aux bronches, elles ont des artères propres qui naissent immédiatement de l'aorte, et que l'on nomme par cette raison *artères bronchiques*. On en trouve constamment deux, une droite et une gauche : la droite naît ordinairement par un tronc commun avec la première des intercostales aortiques; la gauche naît tantôt isolément, tantôt par un tronc commun avec la droite. Ceci est sujet à beaucoup d'autres variations. On voit quelquefois ces artères naître ou de la sous-clavière, ou de l'intercostale supérieure, ou de la thorachique interne, etc. Souvent on trouve deux artères bronchiques de chaque côté.

Dans tous les cas, ces vaisseaux divisés bientôt en plusieurs branches flexueuses se portent sur la surface extérieure des conduits aériens et les accompagnent en se subdivisant comme eux. Leurs rameaux prennent une direction plus droite à mesure qu'ils sont plus petits et plus multipliés. Les derniers ramuscules forment un réseau entre la membrane fibreuse et la muqueuse à laquelle ils vont se terminer principalement; plusieurs se perdent dans les glandes

bronchiques et sur les parois des branches de l'artère et des veines pulmonaires. Il est difficile de les suivre jusqu'à une certaine distance, vu leur ténuité. S'anastomosent-ils avec les ramuscules de l'artère pulmonaire? On ne peut guère se le persuader, puisque ces deux ordres de vaisseaux ne conduisent point un sang de même nature et n'existent point dans le poumon pour la même fin. Les premiers portent au poumon un sang tout préparé pour servir à sa nutrition, tandis que les seconds y portent un sang à préparer par l'influence de l'air. Mais que répondre à l'assertion de Haller, qui dit avoir vu cette anastomose d'une manière certaine et évidente: *Cominùs et certò* (1)?

Les veines bronchiques se comportent à-peu-près comme les artères. Nées du système capillaire qui termine celles-ci, elles suivent les vaisseaux aériens en se réunissant successivement en rameaux plus volumineux jusqu'à ce qu'enfin, réduites à deux troncs principaux, elles aboutissent à droite dans la veine azygos, à gauche dans la veine intercostale supérieure. Quelquefois on trouve deux veines bronchiques droites, dont l'une s'ouvre dans la veine cave supérieure. Au reste, leur terminaison offre beaucoup de variétés inutiles à énumérer ici, puisque nous devons revenir sur tous ces vaisseaux en traitant de l'appareil circulatoire.

Les nerfs suivent une distribution analogue à celle des artères. Le nerf vague en fournit la plus grande partie. De lui seul partent les rameaux principaux qui

(1) Elem. physiol. t. 3, p. 155, note *r*.

se rendent à la trachée-artère; ceux des bronches viennent des deux plexus pulmonaires formés en partie par le nerf vague, en partie par les rameaux des ganglions cervicaux inférieurs et thorachiques. Je ne reviendrai point sur leur description qui a été faite avec exactitude par Bichat lui-même, et que l'on trouvera dans le volume précédent. Je rappellerai seulement ici que ces rameaux, après avoir suivi quelque temps les bronches à leur surface extérieure, finissent tous par traverser la membrane fibreuse pour se rendre à la muqueuse. Presqu'aucun ne se jette dans la substance même du poumon. Ils doivent donc être considérés comme appartenant aux conduits aériens, et le nom de nerfs bronchiques leur convient mieux sous ce rapport que celui de nerfs pulmonaires.

Remarquons aussi que le poumon reçoit ses nerfs des deux systèmes nerveux généraux réunis, et se trouve, d'après cette considération comme d'après plusieurs autres, placé sur les confins des deux vies, de manière qu'appartenant uniquement à la seconde par le but de ses phénomènes, il paroît appartenir en partie à la première par sa disposition anatomique.

Pour terminer ce qui regarde les conduits aériens, il nous reste à parler des *glandes bronchiques*.

Ces glandes ne se rencontrent point sur la trachée-artère. On trouve les premières auprès de la division des bronches. Disséminées irrégulièrement sur ces conduits elles sont en plus ou moins grand nombre dans l'intérieur des poumons, suivant les individus. Leur volume varie beaucoup et semble proportionné au volume des bronches elles-mêmes. Car les plus

considérables environnent ces conduits à leur origine et on les trouve successivement plus petites à mesure qu'on examine l'organe pulmonaire plus profondément. Leur forme n'a rien de constant; arrondies, ovales, lobuleuses, elles sont tellement irrégulières qu'on ne sauroit les comparer. Leur couleur paroît toujours noire chez l'adulte, quoiqu'elle ne soit pour l'ordinaire que d'un bleu très-foncé ou d'un brun obscur semblable à celui qui se remarque sur la choroïde. C'est à cette couleur des glandes bronchiques qu'il faut rapporter les taches noirâtres observées sur la surface extérieure des poumons. Cette couleur dépend du fluide que contiennent ces glandes, mais ne paroît pas absolument essentielle à leur tissu, car on ne la trouve point dans les glandes bronchiques de l'enfant, lesquelles, rougeâtres ou blanchâtres, ressemblent parfaitement aux autres lymphatiques. Aussi chez l'enfant les poumons n'offrent jamais à l'extérieur les taches dont nous venons de parler; preuve évidente que ces taches sont uniquement dues à des glandes bronchiques superficielles.

Les glandes bronchiques ont en général très-peu de consistance. Elles s'écrasent par la moindre pression et teignent fortement de leur couleur l'endroit où elles se trouvent alors. Cette mollesse s'accorde avec ce que l'on dit de leur tissu qu'on regarde comme purement cellulaire. Il semble que ce tissu soit gorgé et surchargé du fluide brunâtre ou bleuâtre qu'elles renferment, et que ce soit là la seule cause de son peu de résistance. Car chez l'enfant où ces glandes ne contiennent point un fluide semblable, elles sont

beaucoup plus fermes et plus solides. Cependant il n'est point rare de trouver chez l'adulte plusieurs glandes bronchiques très-consistantes quoique également colorées. On les a vues pleines de petites concrétions calculeuses, ossiformes, cartilagineuses, etc.

On ne doute point aujourd'hui que les glandes bronchiques n'appartiennent au système absorbant. Haller les a vues manifestement se continuer avec des vaisseaux lymphatiques aboutissant au canal thoracique commun. Plusieurs cependant ont voulu les ranger parmi les organes sécréteurs et les ont regardées comme les sources du fluide noirâtre qui se trouve quelquefois mêlé par stries dans les fluides rejetés par expectoration le matin. Aucune preuve positive n'appuie cette opinion, puisque personne n'a pu découvrir de conduits excréteurs qui, des glandes bronchiques allassent se rendre dans les voies respiratoires. On s'est donc uniquement fondé, 1°. sur l'analogie apparente des fluides; 2°. sur ce que ces glandes avoisinent toujours les bronches, 3°. sur ce qu'on ne connoît point d'autre source présumable du fluide expectoré. Ces raisons sont insuffisantes sans doute, quoiqu'elles aient paru assez fortes à Haller pour lui faire admettre, contre l'inspection anatomique, des voies de communication entre les glandes et les bronches.

La nouvelle doctrine chimique a donné lieu à une autre opinion sur l'usage des glandes bronchiques. On sait que le cit. Fourcroy les regarde comme les réservoirs du carbone dont le sang se décharge dans la respiration. Mais aucun fait anatomique ne favorise cette explication d'autant moins certaine que

la théorie chimique de la respiration est encore elle-même un sujet de controverse. On suppose d'ailleurs ici ce qu'il faudroit prouver, puisqu'on est forcé d'admettre, comme les anciens, des voies directes de communication entre les glandes bronchiques et les conduits aériens pour que le carbone accumulé puisse s'évacuer. Enfin le carbone continuellement accumulé devroit aussi être habituellement rejeté par l'expectoration à des époques fixes et périodiques, et cependant l'apparition de stries noirâtres dans les crachats n'est assurément point un phénomène ordinaire et constant.

Convenons donc que nous ignorons absolument et la nature, et la source, et le mode de production, et les usages du fluide auquel les glandes bronchiques doivent leur couleur.

3°. *Du Système vasculaire des Poumons.*

Le système vasculaire des poumons se divise en trois parties distinctes par leur nature, par leurs propriétés et par le but immédiat de leurs phénomènes. La première est le système de l'artère pulmonaire ou la fin du système général à sang noir; la seconde, celui des veines pulmonaires ou le commencement du système général à sang rouge; la troisième est le système capillaire intermédiaire aux deux précédens. Dans le premier le sang est porté aux poumons pour y être soumis à l'influence de l'air; dans le second il revient au cœur après avoir subit cette influence; dans le dernier le changement du sang est opéré. Dans l'artère pulmonaire le sang est poussé immédiatement par le cœur; dans le système capil-

laire il n'obéit qu'à la contractilité organique insensible des vaisseaux aussi-bien que dans les veines pulmonaires.

C'est par l'artère pulmonaire que les poumons reçoivent le sang à renouveler, comme c'est par la trachée-artère qu'ils reçoivent l'air, moyen de renouvellement du sang. Le premier conduit ouvert au dehors supérieurement, leur vient de haut en bas; le second, né du cœur, leur vient de bas en haut. L'un et l'autre, simples à leur origine, se divisent en deux troncs avant de pénétrer dans les poumons; l'endroit où cette division a lieu est le même pour l'un et pour l'autre, en sorte que les bronches en haut, et les deux troncs de l'artère pulmonaire en bas, rapprochés et voisins, circonscrivent entre eux un espace qui offriroit un véritable losange si l'angle de division de l'artère pulmonaire étoit le même que celui des bronches. Mais les deux divisions pulmonaires s'écartent tellement l'une de l'autre au moment où elles naissent du tronc commun, qu'elles ne forment point d'angle sensible, et que leur réunion à ce tronc représente une espèce de T.

Cette division se fait au côté gauche de l'aorte. Le tronc pulmonaire droit s'engage aussitôt derrière l'aorte et la veine cave supérieure et se dirige transversalement vers le poumon droit auquel il parvient après un trajet plus long que celui du tronc pulmonaire gauche qui suit la même direction de son côté. L'excédent de longueur du droit sur le gauche est exactement mesuré par le volume de l'aorte qui recouvre immédiatement le premier. Tous deux placés au-devant des bronches croisent d'abord un

peu de bas en haut la direction de celles-ci ; mais aussitôt ils se subdivisent comme les bronches elles-mêmes et les suivent dans tout leur trajet, l'artère étant presque toujours placée au-dessus de la bronche et se subdivisant exactement aux mêmes endroits qu'elle. Il y a donc d'abord trois subdivisions pour le tronc pulmonaire droit, deux seulement pour le gauche, en raison du nombre différent des lobes. Les rameaux et ramuscules de l'artère pulmonaire se multiplient ensuite comme ceux des conduits aériens; il n'est aucun lobule du poumon qui n'en reçoive, et on ne peut les suivre jusqu'à leur dernier terme. Réunis aux rameaux bronchiques par le tissu cellulaire général de l'organe, ils peuvent être isolés d'eux avec facilité dans tous les endroits où on les aperçoit encore, en sorte que l'on voit toujours le sang tout-à-fait séparé de l'air, et que nos yeux ne peuvent découvrir le moyen par lequel le premier de ces fluides reçoit l'influence de l'autre. Il paroît certain que cet important phénomène ne s'opère point dans les vaisseaux sensibles à l'œil et que le système capillaire est le seul endroit où il se passe. Nous reviendrons bientôt là-dessus. Abandonnons pour le moment les rameaux de l'artère pulmonaire dans l'endroit où devenus capillaires ils se dérobent à nos regards, et arrêtons-nous sur l'organisation intime de ce premier ordre de vaisseaux sanguins.

Il est évident que l'artère pulmonaire appartient sous les rapports les plus essentiels au système veineux, ou, selon l'expression plus générale et moins équivoque employée par Bichat, au système vasculaire à sang noir; qu'il y a continuité et similitude

entre la membrane interne de cette artère et la membrane interne des veines. Cette similitude est prouvée par les faits les plus positifs, et spécialement par le défaut constant d'ossifications accidentelles dans l'artère pulmonaire (1) aussi-bien que dans les veines de tous les organes. On objecteroit en vain que la membrane interne de l'artère pulmonaire a plus d'épaisseur que celle des veines, car une différence d'épaisseur n'est pas une différence de nature.

Mais, comme le remarque Bichat lui-même, cette analogie d'organisation ne s'applique point aux tissus surajoutés en dehors à la membrane interne des vaisseaux. Ceux-ci peuvent varier suivant la force de résistance que telles ou telles parties d'un même système vasculaire doivent avoir. Or l'artère pulmonaire qui sort immédiatement du cœur et qui reçoit l'impulsion forte communiquée au sang par cet organe, devoit résister plus que les autres parties du système veineux qui ne reçoivent point une impulsion semblable. Aussi trouve-t-on l'artère pulmonaire organisée à l'extérieur comme l'aorte et pourvue d'une membrane fibreuse semblable, seulement beaucoup moins épaisse. C'est à ce défaut d'épaisseur qu'il faut rapporter le peu de consistance de l'artère pulmonaire toujours affaissée sur elle-même quand elle est vide, tandis que l'aorte demeure encore ouverte et dilatée dans la même circonstance. Remarquez au reste que cette différence d'épaisseur des deux artères dont nous parlons, est en rapport exact avec une différence semblable dans les ventri-

(1) Anat. génér. tom. II, p. 403.

cules d'où l'une et l'autre naissent et par conséquent avec la force diverse de l'impulsion que l'une et l'autre doivent supporter. Car le ventricule pulmonaire a des parois beaucoup plus minces que le ventricule aortique, et jouit d'un mouvement d'autant moins fort qu'il doit pousser le sang à une moindre distance.

Ainsi l'artère pulmonaire tient le milieu, pour l'organisation comme pour les fonctions, entre le système artériel et le système veineux, et c'est là ce que les anciens avoient exprimé en la nommant *vena arteriosa*. Elle se rapproche du premier par la manière dont elle reçoit le sang, par la nature et la densité de son tissu extérieur; elle appartient au second par sa membrane interne et par la nature du sang auquel elle donne passage.

Il est donc inutile de s'étendre davantage sur l'organisation intime de l'artère pulmonaire. On s'en formera une idée très-juste en réunissant les belles notions données par Bichat sur les systèmes artériel et veineux, et en les modifiant comme il l'a fait lui-même à l'égard du système vasculaire des poumons (1).

Les veines pulmonaires nées du système capillaire de ces organes suivent une direction analogue à celle des divisions artérielles. Voisines dès leur origine des ramuscules aériens, elles n'abandonnent jamais ces conduits dans leur trajet. Elles se réunissent successivement en rameaux plus volumineux que l'on trouve toujours appliqués sur des rameaux

(1) Anat. génér. tom. II, page 439.

bronchiques d'un volume proportionné. Ordinairement la veine est inférieure à la bronche, tandis que l'artère lui est supérieure; c'est du moins ce que l'on trouve tant que l'œil peut suivre ces vaisseaux. Enfin les veines se réduisent à quatre troncs considérables, deux pour chaque poumon. C'est dans cet état qu'elles quittent ces organes pour pénétrer le péricarde et s'ouvrir dans l'oreillette gauche. Quelquefois cependant on voit deux branches sortir isolément du poumon pour constituer une seule veine, mais elles se réunissent aussitôt après.

La veine pulmonaire droite supérieure sort du poumon au-dessous de la bronche et se dirige un peu obliquement en bas pour s'ouvrir à la partie supérieure droite de l'oreillette. La veine droite inférieure appartient spécialement au lobe inférieur du poumon. Elle remonte très-obliquement vers l'oreillette et s'ouvre à sa partie droite inférieure.

Il en est à-peu-près de même des veines pulmonaires gauches. La supérieure descend vers l'oreillette; l'inférieure remonte pour s'y ouvrir. Cependant elles sont pour l'ordinaire un peu plus rapprochées l'une de l'autre que les droites.

L'organisation des veines pulmonaires nous offre des considérations analogues à celles que nous avons faites sur les artères. Ces veines appartiennent essentiellement au système vasculaire à sang rouge dont elles sont le commencement. Leur membrane interne est continue et semblable à celle qui revêt et les cavités gauches du cœur et l'intérieur des artères nées de l'aorte. Mais par leur tissu extérieur les veines pulmonaires ressemblent parfaitement aux veines géné-

rales dont la fonction est de rapporter le sang noir aux cavités droites du cœur. C'est la même ténuité, la même mollesse, la même flaccidité; en un mot, on aura une idée très-exacte de cette organisation en réunissant ce que l'Anatomie générale nous apprend sur la membrane commune du système à sang rouge à ce que le même ouvrage nous enseigne sur la structure extérieure des vaisseaux du système à sang noir. Remarquons seulement ici entre l'organisation et les phénomènes un rapport semblable à celui que nous avons observé en parlant de l'artère pulmonaire. La solidité de celle-ci étoit nécessaire à cause de l'impulsion qu'elle reçoit de la part du cœur ; elle étoit inutile dans les veines pulmonaires où le trajet du sang rouge n'est point déterminé par une impulsion semblable ; elle se retrouvera dans les artères aortiques où cette impulsion se manifestera de nouveau.

Système capillaire pulmonaire.

Les capillaires du poumon forment un système particulier interposé entre les ramifications artérielles et les veineuses, terminant les unes et donnant naissance aux autres. Un caractère frappant distingue ce système, c'est que là où il commence, l'impulsion du cœur a cessé et le mouvement tonique des vaisseaux eux-mêmes détermine seul le trajet du sang. Répandus en nombre infini dans toutes les parties de l'organe pulmonaire, ces vaisseaux forment par leur ensemble une portion considérable du tissu propre de cet organe et ne donnent passage qu'au sang ;

différence remarquable d'avec le système capillaire général qui admet tant de fluides divers.

Ce sont les capillaires du poumon qui se trouvent dans le rapport le plus immédiat avec les conduits aériens. Eux seuls peuvent se ramifier librement sur les parois de ces conduits devenus seulement alors tout-à-fait membraneux et dépourvus de cartilages. C'est donc dans le système capillaire que le sang se trouve le plus voisin de l'air ; c'est là aussi qu'il en reçoit l'influence et qu'il passe de l'état noir à l'état rouge. Il ne paroît pas que la coloration commence plutôt, à en juger au moins par l'isolement où se trouvent les artères et veines pulmonaires d'avec les rameaux bronchiques tant que l'œil peut les observer.

On tire une autre preuve en faveur du rapport prochain qui lie le système capillaire aux conduits aériens, de la facilité avec laquelle on fait passer dans ces derniers divers fluides injectés par l'artère pulmonaire. Haller cite un grand nombre d'expériences semblables dont plusieurs lui appartiennent. Ce fait mérite d'être conservé, quiqu'on ne doive pas en conclure une communication libre dans l'état naturel entre les deux ordres de vaisseaux dont il s'agit. On sait effectivement avec quelle facilité les injections pénètrent des conduits que le sang ne pénétroit point pendant la vie et qui ne deviennent perméables que par la perte de leurs propriétés vitales.

Tout nous porte donc à regarder le système capillaire pulmonaire comme l'endroit où s'opère exclusivement ce grand phénomène de la coloration du

sang, phénomène pour lequel s'exerce la respiration dont il est le but et l'unique fin.

Je m'arrête à cette conclusion, et je n'entre ici dans aucune autre considération sur les capillaires du poumon. Leur examen anatomique ne sauroit être poussé plus loin vu leur extrême ténuité ; et quant aux belles vues physiologiques qu'ils présentent, on les trouvera développées de la manière la plus intéressante et la plus curieuse, soit dans l'*Anatomie générale*, soit dans la seconde partie des *Recherches physiologiques sur la vie et la mort.*

4°. *Tissu propre des Poumons.*

Le poumon au premier aspect nous offre une substance molle, spongieuse, peu résistante à la pression, peu susceptible de se rétablir ensuite dans son état primitif. Considérée plus attentivement, cette substance nous paroît divisée en plusieurs lobules distincts même à l'extérieur, et séparés les uns des autres par de petites rainures blanchâtres que quelques-uns ont confondues avec les vaisseaux lymphatiques réellement distribués au poumon, comme nous le verrons en traitant de l'appareil absorbant.

Ces lobules deviennent plus sensibles lorsqu'on déchire le poumon, surtout après l'avoir soumis à l'ébullition. Ils sont fort variables pour le volume et surtout pour la forme, sur laquelle il est impossible de rien déterminer. On voit seulement qu'ils présentent plusieurs facettes séparées par des angles saillans, qu'ils se séparent avec facilité et qu'un tissu cellulaire lâche, filamenteux, fort extensible, jamais

graisseux, les réunit. Ces lobules se séparent encore en lobules plus petits, surtout lorsqu'on les a distendus au moyen de l'air poussé dans les bronches, et on ne voit ni le terme de leur division, ni la nature intime des parties qui les composent. Depuis Malpighi les auteurs se sont assez généralement accordés à regarder ces derniers lobules comme vésiculaires et formés par l'extrémité des bronches. Willis a fait graver dans ses planches anatomiques la disposition de ces vésicules qu'il suppose arrangées en forme de grappes dont les rameaux bronchiques sont les pédicules communs. Keil a prétendu compter ces vésicules; Hales, Lieberkuhn ont voulu déterminer l'étendue de la surface qu'elles représentent, etc. etc. Ces travaux sont plutôt, comme l'observe Haller, le fruit de l'imagination que d'une observation sûre et exacte qui paroît impossible ici.

Si l'on s'en tient à ce que l'anatomie nous montre, on sera porté assez naturellement à voir dans les lobules la réunion des extrémités bronchiques du système capillaire pulmonaire, du système capillaire des vaisseaux bronchiques, des ramuscules nerveux, rapprochés et agglomérés au moyen du tissu cellulaire commun qui occupe une place considérable dans la structure des poumons. Ces organes seront donc presque entièrement vasculaires; ce qui se rapporte assez bien à tout ce que nous savons de leur organisation et de leurs phénomènes.

APPAREIL

DE

LA CIRCULATION.

Considérations générales.

L'APPAREIL circulatoire se compose de deux parties essentiellement distinctes : l'une destinée à porter d'un centre commun aux organes le sang préparé par la respiration ; l'autre destinée à rapporter de tous les organes à un centre commun le sang que la respiration doit préparer. C'est à cette différence de nature du sang que le physiologiste s'arrête principalement, et il l'exprime en donnant aux deux parties de l'appareil dont je parle les noms distinctifs de *système vasculaire à sang rouge* et *système vasculaire à sang noir.*

Ces deux systèmes présentent dans leur organisation des différences également sensibles. C'est sur ces différences que l'anatomiste fixe sa principale attention, et il les exprime en nommant *artériel* le système à sang rouge, *veineux* le système à sang noir.

Chaque système se compose d'une suite de vaisseaux universellement répandus dans l'économie, successivement ramifiés dans chaque organe et augmentant toujours en nombre à mesure qu'ils dimi-

ment de volume. C'est là la grande et essentielle différence qui distingue, au premier aperçu, l'appareil circulatoire des appareils organiques que nous avons examinés jusqu'ici. Le digestif, le respiratoire sont renfermés dans des cavités propres et ne s'étendent point au-delà; celui de la circulation n'a aucune autre limite que celle du corps lui-même : les organes des deux vies reçoivent également ses expansions nombreuses, parce qu'aucun ne peut exercer ses fonctions sans l'influence immédiate du sang.

Mais c'est dans l'intérieur de la cavité thorachique que ce fluide, élaboré par la respiration, reçoit l'impulsion primitive qui doit le porter dans tous les organes; c'est là que, revenu de ces organes, il reçoit l'impulsion qui doit le porter aux poumons pour y subir une élaboration nouvelle. Le cœur, agent nécessaire de ces deux impulsions, se trouve là au centre des deux systèmes ou plutôt à la fin du veineux et au commencement de l'artériel. Ses cavités droites reçoivent le sang que les veines caves lui rapportent et le transmettent par l'artère pulmonaire aux organes respiratoires; ses cavités gauches reçoivent le sang ainsi préparé que leur rapportent les veines pulmonaires et le transmettent par l'aorte et par ses divisions à tous les organes.

Ces deux moitiés du cœur quoique réunies de manière à constituer un seul organe, n'ont cependant aucune communication entre elles, sont parfaitement distinctes, en sorte que, comme l'observe Bichat, elles pourroient se trouver tout-à-fait séparées sans qu'il en résultât aucun trouble pour la circulation.

On est même obligé en physiologie de considérer toujours isolément les mouvemens de ces deux moitiés pour se rendre compte de l'ordre successif des phénomènes circulatoires, et de voir réellement deux cœurs là où l'anatomie semble n'en montrer qu'un.

En isolant ainsi les deux portions du cœur et en considérant dans leur ensemble les deux grandes moitiés de l'appareil circulatoire, on voit le système à sang noir commencer dans tous les organes par des capillaires multipliés, se continuer par les veines progressivement diminuées de nombre et accrues de volume, se terminer dans le poumon par les ramifications capillaires de l'artère pulmonaire. La portion droite du cœur interposée entre les veines et cette artère, ne paroît alors qu'un agent auxiliaire d'impulsion destiné à favoriser le trajet du sang jusqu'aux poumons. De même on voit le système à sang rouge commencer dans le poumon par des rameaux capillaires, se continuer par les veines pulmonaires, par l'aorte et par ses divisions jusqu'aux capillaires de tous les organes, et l'on se représente la partie gauche du cœur comme un organe musculeux interposé entre les veines pulmonaires et l'aorte pour hâter le cours du sang dans cette suite de vaisseaux continus.

Mais ces dernières considérations, utiles dans l'anatomie générale qui ne voit les organes que d'une manière abstractive, ne pourroient servir de base à une description où il s'agit uniquement de se former une image exacte des objets tels qu'ils se présentent à notre vue. Sans doute on n'atteindroit pas ce but si l'on se bornoit à décrire les cavités gauches en com-

mençant le système artériel, pour rejeter à la fin du système veineux l'examen des cavités droites.

La même raison s'oppose à ce que l'on suive toujours ici l'ordre de la circulation. On le peut facilement lorsqu'il s'agit du cœur et du système artériel; mais, pour s'y conformer à l'égard du système veineux, il faudroit commencer par les rameaux capillaires et finir par les veines caves, ce qui jetteroit une extrême confusion dans les détails descriptifs.

Nous décrirons donc d'abord le cœur tout entier, en le considérant comme l'organe central des deux systèmes circulatoires ; mais après avoir examiné sa forme, sa situation, sa disposition extérieure, nous considérerons isolément ses deux moitiés, ce qui est le seul moyen de s'en former une idée exacte sous le rapport de ses fonctions.

Après le cœur nous décrirons le système artériel, puis le système veineux que nous envisagerons comme l'artériel en commençant par les troncs et en finissant par les rameaux.

L'Anatomie générale contenant dans le plus grand détail tout ce qui regarde les généralités de ces deux genres de vaisseaux, nous croyons inutile de les répéter ici. Ce ne sont point ces détails que l'élève cherche à vérifier sur le cadavre ; il ne peut même les comprendre que quand il a bien saisi la description des vaisseaux en particulier. Ce qui est essentiel, c'est de fixer son attention sur l'ensemble du système vasculaire de chaque région à mesure qu'on avance, pour rendre plus facile l'image qu'on doit se former dans la suite du système vasculaire pris en entier.

Ces résumés abrégés que nous présenterons de

temps en temps, ont d'ailleurs l'avantage de mettre dans les détails descriptifs une variété propre à faire supporter ce qu'ils ont naturellement d'aride et de fastidieux.

DU PÉRICARDE ET DU CŒUR.

J'ai déjà remarqué, en traitant de l'appareil respiratoire, que, par la disposition antérieure des deux plèvres, la cavité, thorachique se trouvoit divisée en trois régions, une moyenne et deux latérales. Dans les dernières, destinées à loger les poumons, tout est fait pour la mobilité; dans la moyenne tout est fait pour la solidité. Car elle est formée en arrière par la portion la moins mobile de la colonne vertébrale, en devant par le sternum, susceptible seulement d'un mouvement de totalité peu étendu; en bas le diaphragme ne présente en cet endroit qu'une portion tendineuse incapable de se mouvoir par elle-même, et d'ailleurs toujours fortement tendue entre les vertèbres et le sternum.

C'est dans cette région moyenne que se trouve le cœur et les premiers vaisseaux qui en partent ou qui y aboutissent. On voit donc qu'il est soustrait en grande partie aux mouvemens généraux du thorax et ne peut en éprouver l'influence que d'une manière médiate et indirecte.

La disposition des deux plèvres seroit cependant insuffisante pour fixer le cœur à la place qu'il occupe et prévenir ses déplacemens. Entre elles nous trouvons une cavité membraneuse plus solide, continue en bas avec le diaphragme et prolongée en haut sur les

vaisseaux à une assez grande distance. C'est cette cavité propre au cœur et nommée par cette raison *péricarde* dont nous devons nous occuper d'abord.

ARTICLE PREMIER.

Du Péricarde.

Le péricarde situé à la partie moyenne du thorax, occupe à-peu-près toute la hauteur de cette cavité qu'il concourt à diviser en deux portions inégales. Logé entre les deux plèvres qu'il écarte l'une de l'autre et qui le recouvrent latéralement, il répond en devant et en arrière aux endroits où ces membranes se rapprochent pour constituer les médiastins. Ainsi, il répond médiatement en arrière à la colonne vertébrale, à l'œsophage, à l'aorte ; sur les côtés aux poumons qui se prolongent plus ou moins sur sa partie antérieure ; en devant au sternum et aux côtes gauches ; en bas il repose sans aucun intermède sur le centre aponévrotique du diaphragme.

Lorsqu'on enlève le sternum et les cartilages des côtes et qu'on observe le péricarde tel qu'il se présente, il paroît pyramidal, ayant sa base en bas, son sommet en haut. Sa forme paroît aussi symétrique, si ce n'est qu'inférieurement il se prolonge un peu plus à gauche qu'à droite. Mais cette forme apparente n'est due qu'à la disposition des plèvres à l'égard du péricarde. Si on enlève exactement ces deux membranes de dessus lui par la dissection, ce qui est toujours facile, on voit que la graisse accumulée dans leurs écartemens, surtout entre la plèvre droite et la partie inférieure correspondante du péri-

carde, étoit la seule cause de cette espèce d'illusion. Dépouillé et laissé à lui-même, le péricarde n'a point de forme régulière et comparable; par-tout il est exactement moulé sur le cœur et les gros vaisseaux dont il forme la cavité propre; en bas seulement il paroît s'écarter du cœur pour se continuer dans son contour avec le centre diaphragmatique.

Deux membranes composent le péricarde, et quoiqu'elles se trouvent en grande partie réunies et identifiées, la disposition générale de l'une et de l'autre est tellement différente, leur nature, leurs propriétés, leurs usages les distinguent d'une manière si tranchée, qu'il est absolument impossible de les décrire ensemble et de considérer le péricarde comme un seul organe lorsqu'on entre dans les détails anatomiques.

De ces membranes, l'une extérieure est fibreuse, l'autre intérieure est séreuse.

§ Ier. *Membrane fibreuse.*

Elle naît circulairement en bas de la partie moyenne du centre aponévrotique du diaphragme avec lequel elle est parfaitement identifiée, remonte autour du cœur qu'elle embrasse jusqu'à sa base, se continue quelque temps sur l'origine des gros vaisseaux qu'elle cache, mais bientôt se divise en plusieurs gaînes distinctes pour accompagner ces vaisseaux jusqu'à une certaine distance. Ces gaînes sont plus ou moins prolongées suivant que les vaisseaux parcourent un trajet plus ou moins long avant d'arriver aux organes auxquels ils appartiennent, ou avant de sortir du thorax. Ainsi la gaîne fibreuse de l'aorte se pro-

longe indéfiniment sur cette artère; celle du tronc artériel pulmonaire gauche est moins étendue, aussi bien que celle de la veine cave supérieure; les gaînes des veines pulmonaires sont encore plus courtes, et enfin la veine cave inférieure n'a point de gaîne fibreuse propre, puisqu'elle s'introduit dans le péricarde à l'instant même où elle sort du diaphragme, et correspond à l'endroit où la membrane fibreuse se continue toute entière avec le centre aponévrotique de ce muscle.

C'est en se continuant ainsi par portions distinctes sur les vaisseaux que la membrane fibreuse se termine. Ses terminaisons sont donc aussi variées que le point de son origine étoit uniforme; on ne peut pas même reconnoître l'endroit précis où elle cesse sur chaque vaisseau en particulier. Confondue plus ou moins loin avec la tunique vasculaire extérieure, elle paroît faire corps avec cette tunique et entrer dans son organisation intime sans qu'on puisse jamais l'en détacher entièrement.

La membrane fibreuse correspond immédiatement aux plèvres par la plus grande partie de sa surface extérieure : elle leur adhère plus ou moins par un tissu cellulaire tantôt graisseux à l'excès, tantôt absolument dépourvu de graisse. En général, cette graisse ne se trouve accumulée sur elle que dans les endroits où les plèvres se réfléchissent pour former le médiastin antérieur; près des poumons, l'adhérence est toujours plus intime, et le tissu cellulaire intermédiaire moins abondant. Les rapports médiats de la membrane fibreuse avec les organes voisins ont été indiqués dans la description du péricarde en général.

Par sa surface interne la membrane fibreuse répond presque par-tout à la séreuse et lui est intimement adhérente : elle s'en sépare seulement dans les endroits où elle se continue sur les vaisseaux, la séreuse se réfléchissant au contraire pour revenir sur le cœur, comme nous le dirons bientôt. C'est là qu'on peut voir facilement la distinction de l'une et de l'autre, un espace triangulaire sensible se trouvant entr'elles; au-delà la fibreuse correspond à la tunique extérieure des vaisseaux dont le tissu cellulaire la sépare d'abord, mais avec laquelle elle ne tarde pas à s'identifier.

Considérée dans son organisation intime, la membrane fibreuse offre l'analogie la plus parfaite avec la dure-mère, seulement une épaisseur beaucoup moindre. On la voit formée de fibres blanchâtres, quelquefois isolées, plus souvent rapprochées en faisceaux distincts dont la largeur et l'épaisseur sont très-variables. Ces faisceaux sont assez irrégulièrement disposés; souvent ils s'entrecroisent en divers sens et s'interrompent après un trajet plus ou moins long : cependant en général on les trouve verticaux et parallèles sur le corps du péricarde. En bas ils se continuent avec les fibres aponévrotiques du diaphragme dont ils semblent être la production; en haut ils s'écartent les uns des autres auprès des vaisseaux sur lesquels on les voit manifestement se prolonger. On les suit jusqu'à une distance fort éloignée sur l'aorte et même sur ses premières divisions; on les suit plus sensiblement encore sur les vaisseaux pulmonaires jusqu'à l'entrée immédiate de ceux-ci dans les poumons; en sorte que par-tout les plèvres,

en abandonnant leurs organes, rencontrent la membrane fibreuse, et ne correspondent nulle part immédiatement à la tunique externe des vaisseaux pulmonaires (1).

Il est évident d'après tout ce que nous venons de dire, qu'on s'exprime inexactement quand on dit que le péricarde offre *plusieurs ouvertures* pour le passage des vaisseaux qui viennent du cœur ou qui s'y rendent. Si cette image est fausse par rapport à la membrane séreuse, comme Bichat l'a observé depuis long-temps, et comme nous nous en convaincrons bientôt, elle ne l'est pas moins par rapport à la fibreuse qui, prolongée indéfiniment sur les vaisseaux sous forme de gaînes, ne cesse point à des endroits qu'on puisse fixer et reconnoître.

§ II. *Membrane séreuse.*

La membrane séreuse appartient au cœur d'une manière beaucoup plus immédiate que la fibreuse. Continue avec l'une, elle forme à l'autre une enveloppe particulière destinée moins à compléter son organisation qu'à favoriser ses mouvemens.

---

(1) Lancisi paroît être le premier qui ait reconnu des fibres distinctes et entrecroisées sur le péricarde. Mais il les jugea faussement musculeuses et en forma une tunique particulière interposée entre deux autres qu'il admettoit déjà sur ce sac membraneux. D'autres auteurs enchérirent encore sur lui et prétendirent démontrer cinq tuniques au péricarde, fondés uniquement sur la facilité plus ou moins grande qu'ils éprouvoient à diviser cette membrane en plusieurs feuillets avec le scalpel.

Pour la décrire, il faut suivre la marche que nous avons suivie pour les plèvres, puisqu'elle forme comme ces membranes un sac sans ouverture dont la cavité se correspond à elle-même par tous ses points, et qui ne se trouve appliquée sur les parties voisines que par sa surface extérieure.

Je prends donc cette membrane dans un point quelconque de son étendue, et ce point je le choisis à la partie antérieure interne de la fibreuse.

Partie de là, la séreuse remonte en tapissant la fibreuse jusqu'à l'endroit où les gaînes que celle-ci forme adhèrent aux vaisseaux. Là, elle se réfléchit au milieu sur l'aorte, un peu au-dessus de sa première courbure; à gauche sur l'artère pulmonaire avant sa division; à droite sur la veine cave supérieure, un pouce à-peu-près au-dessus de son entrée dans l'oreillette et sur les veines pulmonaires droites immédiatement après leur sortie du poumon. Elle descend sur la partie antérieure de tous ces vaisseaux en s'enfonçant dans leurs intervalles et recouvrant ainsi l'aorte et l'artère pulmonaire dans tout leur contour, excepté l'endroit où elles se touchent et adhèrent ensemble, embrassant aussi la veine cave supérieure et les veines pulmonaires droites, excepté dans leur partie postérieure. Parvenue à la base du cœur, elle se porte directement de l'artère pulmonaire sur le ventricule, et de la veine cave sur l'oreillette. Mais en quittant l'aorte, elle se prolonge dans l'enfoncement qui se trouve entre cette artère et l'oreillette droite, tapisse cet enfoncement et revient sur la partie antérieure du cœur. Elle tapisse toute cette partie antérieure, se réfléchit sur les bords et

sur le sommet pour remonter sur la face postérieure qu'elle tapisse de même ; et revenue à la base de l'organe en arrière, elle embrasse à droite et en bas la veine cave inférieure, à gauche et en haut les veines pulmonaires gauches, dans le milieu tapisse toute la partie postérieure de l'oreillette gauche. Réfléchie de toutes ces parties sur la membrane fibreuse, elle en tapisse toute la portion postérieure, puis celle qui adhère au diaphragme, puis remonte sur sa portion antérieure libre jusqu'à l'endroit d'où nous l'avions supposée partie.

Ainsi la membrane séreuse du péricarde forme autour du cœur une cavité dans laquelle le cœur n'est point renfermé : disposition commune à toutes les autres membranes de la même classe. Sa surface extérieure répond à diverses parties fort différentes et leur adhère plus ou moins intimement. Unie à la fibreuse, elle fait corps avec elle et ne peut en être détachée, excepté dans de fort petits espaces qui répondent aux endroits où elle se réfléchit. C'est là qu'il est facile de démontrer à l'œil la distinction des deux lames du péricarde. Elle adhère fort peu aux vaisseaux et la dissection l'en détache sans aucune peine. Sur le cœur son adhérence devient plus marquée, et sa ténuité beaucoup plus grande ; il semble même, à en juger par la saillie que forment les paquets graisseux accumulés sur cet organe, principalement vers les rainures qui distinguent les ventricules, il semble, dis-je, qu'aucune membrane n'y existe. Mais une foule d'autres preuves y démontrent la séreuse d'une manière incontestable.

La surface intérieure de cette membrane se cor-

respond par-tout à elle-même, et offre l'aspect lisse et poli que lui donne le fluide exhalé par elle-même. Ce fluide est également fourni et sur la portion libre du péricarde et sur la portion qui recouvre le cœur. Continuellement absorbé, il ne s'accumule jamais dans l'état de vie et de santé. Après la mort on en trouve toujours une certaine quantité qui paroît rougeâtre, mais sa quantité et sa couleur sont uniquement l'effet d'une transsudation cadavérique. Pendant la vie il s'accumule quelquefois en grande abondance par un état de maladie; ce qui constitue les hydro-péricardes. On sait que la distension de ce sac membraneux peut alors devenir considérable et qu'elle se fait principalement du côté du diaphragme, en raison soit de la déclivité, soit de la résistance moindre dans cet endroit que dans tous les autres.

L'anatomie pathologique nous fournit beaucoup de preuves de la disposition de la membrane séreuse du péricarde. Ainsi nous voyons des exsudations albumineuses recouvrir toute sa surface interne, spécialement la portion qui tapisse le cœur. Ainsi les inflammations dont cette membrane est affectée donnent lieu à des exsudations purulentes dont tout le cœur paroît recouvert et tout le péricarde rempli, quoique le cœur lui-même ne présente aucune altération organique correspondante, etc., etc.

On ne voit dans la membrane séreuse du péricarde aucun de ces replis flottans qui peuvent favoriser son ampliation en supposant un accroissement de volume de la part du cœur. Cependant le cœur se dilate à chaque instant, mais cette dilatation ne ressemble point du tout à celles auxquelles les intestins sont

sujets. Elle est peu considérable et ne demande pas un espace fort étendu pour s'opérer. Elle est continuelle et coordonnée d'avance avec l'organisation, puisqu'elle est nécessaire pour la fonction, en sorte que la membrane séreuse se trouve en rapport primitif avec ce changement d'état sans cesse renouvelé. Elle est active et ne va point au-delà d'un certain degré, comme les dilatations passives et irrégulières qu'on observe ailleurs.

Quant aux cas morbifiques dans lesquels le péricarde est distendu par un fluide, ou le cœur dilaté à l'excès par un anévrisme, il faut bien admettre alors une extension réelle et considérable de la membrane séreuse aussi bien que de la fibreuse puisque l'inspection la démontre.

Remarques sur l'organisation du péricarde.

Le péricarde est, d'après ce que nous avons dit, une membrane composée, du nombre de celles que Bichat a nommées *fibro-séreuses*. Les deux membranes simples qui la constituent sont exactement au cœur ce que la dure-mère et l'arachnoïde réunies sont au cerveau. Comme la dure-mère, la portion fibreuse du péricarde forme à l'organe la partie la plus extérieure de son enveloppe propre, et après l'avoir recouvert dans son entier, se divise en plusieurs gaînes distinctes pour se prolonger sur les vaisseaux, comme la dure-mère se divise en une foule de conduits particuliers pour accompagner isolément chaque nerf à sa sortie du crâne. L'une et l'autre membrane se composent de fibres blanchâtres plus

ou moins irrégulièrement entrecroisées. L'une et l'autre se terminent en se perdant insensiblement sur les parties voisines. L'une et l'autre adhèrent intimement à un tissu séreux par leur surface intérieure.

Mais la membrane fibreuse du péricarde se distingue de la dure-mère par plusieurs attributs soit de disposition, soit d'organisation, soit de fonctions. D'abord elle n'est point appliquée en dehors sur des parties osseuses. Des organes mous et peu résistans sont les seuls qui l'environnent, en sorte qu'elle forme seule la portion solide de la cavité où le cœur est immédiatement renfermé. Cependant elle a moins d'épaisseur que la dure-mère, et dans plusieurs endroits sa ténuité est telle qu'à peine son existence peut être reconnue. J'observe au reste que si cette disposition de la membrane fibreuse pouvoit offrir quelque désavantage, celle des plèvres y supplée parfaitement. Ces membranes en effet réfléchies sur les côtés du péricarde et prolongées en devant, se trouvent séparées en plusieurs endroits de l'enveloppe du cœur par une grande quantité de graisse, en sorte qu'elles isolent les cavités destinées aux poumons de celle destinée au cœur, et empêchent que celui-ci ne ressente d'une manière aussi marquée l'influence des mouvemens exécutés par les parties latérales du thorax pour la respiration.

La membrane fibreuse du péricarde diffère encore de la dure-mère en ce qu'elle ne se continue que par sa partie inférieure avec des organes fibreux. Par-tout ailleurs elle se confond avec le tissu extérieur des artères et des veines en se terminant, exception sen-

sible à l'observation faite par Bichat sur la continuité de presque tout le système fibreux.

Enfin le développement de cette membrane est beaucoup plus tardif que celui de la dure-mère. Longtemps elle paroit nulle chez l'enfant ; et de là vient, comme l'on sait, le défaut d'adhérence observé à cet âge entre le péricarde et le centre phrénique.

Je n'insisterai point sur la comparaison à établir entre la membrane séreuse du péricarde et l'arachnoïde. Leur identité de disposition, d'aspect, d'organisation, de fonctions, de maladies, est trop évidente pour qu'on ne la saisisse pas au premier aperçu. Tout le monde sait aujourd'hui que le *carditis* des anciens n'est autre chose que l'inflammation de la membrane séreuse du péricarde, que la membrane fibreuse n'est pas plus affectée alors que la substance propre du cœur ; vérité démontrée par l'inspection anatomique, et qui suffiroit seule pour faire sentir l'avantage inappreciable de l'étude abstractive des tissus organiques dans leur état de simplicité.

Ainsi le cerveau et le cœur ont des enveloppes semblables et se meuvent dans des cavités de même nature.

Le péricarde reçoit un assez grand nombre de rameaux artériels qui lui viennent soit immédiatement de l'aorte, soit des thorachiques internes, diaphragmatiques supérieures, etc. Elles se répandent dans son tissu fibreux où elles se ramifient sans aller jusqu'au tissu séreux. Aucun nerf ne paroît lui appartenir.

Usages du Péricarde.

Par sa portion fibreuse le péricarde forme les limites solides de la cavité dans laquelle le cœur doit se contracter, et empêche cet organe de se porter vaguement dans diverses parties du thorax.

Par sa portion séreuse il forme au cœur une enveloppe immédiate, et répand autour de lui un fluide destiné à favoriser ses mouvemens.

ARTICLE DEUXIÈME.

Du Cœur.

En parlant du péricarde nous avons indiqué la position générale du cœur qu'il embrasse toujours étroitement. Nous ne reviendrons pas là-dessus.

Le cœur a une forme à-peu-près pyramidale, mais très-irrégulière. Ordinairement même on ne la compare point, et au contraire elle sert de type pour comparer divers autres corps. Cette forme permet de lui distinguer deux faces, l'une antérieure, l'autre postérieure; deux bords, l'un droit, l'autre gauche; une base et un sommet ou une pointe.

La direction de cet organe est un peu oblique en avant, en bas et en dehors. Sa face antérieure est donc en même temps un peu supérieure. Elle est convexe et offre dans son milieu une rainure qui la traverse obliquement de haut en bas et de gauche à droite. L'artère cardiaque antérieure et la veine correspondante occupent cette rainure et s'y trouvent

ordinairement environnées d'une grande quantité de graisse.

La face postérieure et inférieure du cœur est plane, et repose sur le centre diaphragmatique dont elle n'est séparée que par la membrane séreuse du péricarde. Une autre rainure la traverse verticalement à l'union de son tiers droit et de ses deux tiers gauches. L'artère et la veine cardiaques postérieures y sont logées et environnées d'une quantité de graisse peu considérable. Ces deux rainures répondent aux extrémités de la cloison du cœur et indiquent la séparation des ventricules.

Le bord droit du cœur est en même temps inférieur. Mince et fort graisseux, il répond au diaphragme.

Le bord gauche est vertical. Plus court, plus arrondi et plus épais, il avoisine le poumon gauche. Il est côtoyé ordinairement par une branche considérable de l'artère cardiaque postérieure.

La base du cœur, située en haut et en arrière, appuie sur la colonne vertébrale dont la séparent l'œsophage et l'aorte renfermés dans le médiastin postérieur. Elle est oblique de haut en bas et de gauche à droite. On voit sur elle l'origine des vaisseaux qui partent du cœur et la terminaison de ceux qui y arrivent. On y voit aussi une rainure oblique qui sépare les oreillettes d'avec les ventricules.

La pointe ou le sommet du cœur situé en avant, en bas et à gauche, correspond à une légère échancrure du poumon et avoisine l'intervalle des sixième et septième côtes où il fait saillie pendant la contraction des ventricules. Garni de beaucoup de graisse il offre un petit enfoncement qui n'est que la

réunion des deux rainures dont nous avons parlé tout-à-l'heure.

Tel est le cœur considéré à sa surface extérieure. Cet organe est par-tout entièrement libre dans le péricarde, à l'exception de la base qui se trouve assujettie par la disposition des vaisseaux.

Mais pour décrire le cœur avec plus d'exactitude, pour se former une image exacte de son organisation extérieure et se mettre ainsi à même de concevoir le mécanisme de ses mouvemens, il faut revenir au point de vue que nous avons présenté dans les considérations générales, envisager l'organe comme formé de deux moitiés tout-à-fait distinctes quoique réunies, en un mot voir deux cœurs dans un seul. C'est ce que nous allons faire dans les détails suivans, sans cependant nous écarter des expressions reçues.

§ Ier. *Partie droite du Cœur.*

Elle comprend réellement la moitié de l'organe. Bornée à gauche par les rainures des deux faces, à droite et en bas par le bord mince du cœur, elle finit en haut d'un côté à la réunion des deux veines caves, de l'autre à l'origine de l'artère pulmonaire, en bas au sommet du cœur dont elle ne comprend qu'une petite partie. Ainsi elle s'étend beaucoup plus en devant qu'en arrière, en sorte que le cœur se trouve divisé obliquement suivant son épaisseur et non suivant sa largeur.

Cette partie droite résulte de deux portions formant deux cavités distinctes, l'une nommée oreillette, l'autre ventricule.

Oreillette droite.

Elle occupe la base du cœur ; sa forme est très-irrégulière et impossible à comparer. Allongée transversalement, elle présente sa plus grande largeur à droite et en arrière, sa partie la plus étroite en devant et à gauche où elle se termine par une petite appendice flottante. Sa surface extérieure, libre en dehors, se continue en dedans avec celle de l'oreillette gauche ; en bas avec celle du ventricule droit ; en arrière avec la réunion des veines caves ; en avant elle est libre de toutes parts et se termine par le rebord mince de l'appendice.

La surface interne de l'oreillette droite présente des objets importans à considérer. Pour s'en former une image exacte, il faut, 1°. laisser le cœur en place afin de ne point déranger la disposition des deux veines caves ; 2°. ouvrir l'oreillette par deux incisions, l'une transversale, étendue depuis l'endroit où les veines caves se réunissent jusqu'à l'appendice inclusivement ; l'autre commencée au milieu de la lèvre supérieure du rebord de la première et prolongée de bas en haut indéfiniment dans la veine cave supérieure qu'on ouvre ainsi antérieurement ; 3°. mettre le cœur dans sa position naturelle et distendre l'oreillette en introduisant les doigts dans son intérieur pour la voir telle qu'elle est dans son état de plénitude.

L'oreillette ainsi préparée doit être considérée en arrière, en devant, en dedans et en dehors.

En arrière, on y voit, 1°. supérieurement l'ou-

verture de la veine cave supérieure, dirigée un peu obliquement en avant et en bas, présentant dans son contour un rebord saillant, arrondi, épais, formé par un faisceau charnu. La partie postérieure de ce contour est la plus saillante, le faisceau charnu y devenant plus épais. On doit remarquer que cette ouverture est dans la direction de celle par laquelle l'oreillette communique dans le ventricule. 2°. Inférieurement, on trouve l'ouverture beaucoup plus large de la veine cave inférieure placée plus en arrière que la précédente, dirigée obliquement en haut et en dedans. Le contour de cette ouverture se continue en haut avec celui de la veine cave supérieure, et c'est dans cette portion commune à toutes deux que Lower a vu ou cru voir un tubercule auquel il a donné son nom; mais en bas l'ouverture de la veine cave inférieure présente un repli saillant dans la cavité de l'oreillette, repli connu sous le nom de *valvule d'Eustache*.

Cette valvule varie singulièrement de largeur chez l'adulte; tantôt elle fait une saillie considérable dans l'oreillette, tantôt elle est à peine sensible. Sa forme est semi-lunaire. Née de la moitié inférieure du contour de l'ouverture veineuse, elle se porte transversalement en dedans, et finit au-dessous de la fosse ovale, en se continuant avec l'extrémité correspondante de la valvule droite qui sert à former cette fosse. Elle est dirigée presque verticalement suivant sa largeur, en sorte que son bord libre concave se rapproche de la partie postérieure du contour de la veine cave supérieure, et que de ses deux faces, l'une postérieure et supérieure répond à la cavité

de la veine cave inférieure; l'autre antérieure et inférieure répond à la cavité de l'oreillette.

Au-dessous de la valvule d'Eustache et immédiatement au-dessus du ventricule on trouve l'ouverture commune des veines cardiaques bornée en dehors par une petite valvule qui naît de la face inférieure de la grande et se dirige verticalement en bas.

Ces deux valvules ne sont autre chose que la membrane interne des veines caves repliée sur elle-même à mesure qu'elle se prolonge dans les cavités gauches du cœur.

On voit, d'après ce que nous avons dit, 1°. que la direction des deux veines caves est tout-à-fait opposée, et que la supérieure se trouve plus en devant que l'inférieure; 2°. que la valvule d'Eustache et la moitié postérieure du contour de l'ouverture de la veine cave supérieure, rapprochées l'une de l'autre, forment comme les débris d'une cloison qui séparoit l'oreillette en deux parties, l'une postérieure appartenant à la veine cave inférieure, l'autre antérieure constituant l'oreillette proprement dite. En supposant la valvule d'Eustache plus large, cette cloison sera complète, et le sang de la veine cave inférieure renfermé dans la moitié postérieure de l'oreillette ira droit contre la fosse ovale, tandis que le sang de la veine cave supérieure porté dans la partie antérieure de l'oreillette ne se mêlera point avec l'autre. Cette disposition qui est précisément celle du fœtus, sera exposée dans la suite avec plus de détail.

Toute cette partie postérieure de l'oreillette est

lisse et polie comme la surface interne des veines dont elle dépend.

En devant l'oreillette présente, 1°. supérieurement la petite cavité de son appendice remarquable seulement par une multitude de colonnes charnues entrecroisées qui font saillie au travers de la membrane interne ; 2°. inférieurement l'ouverture large par laquelle l'oreillette communique dans le ventricule.

En dedans l'oreillette droite est formée par une cloison qui lui est commune avec l'oreillette gauche et qui l'en sépare. On voit sur cette cloison un enfoncement léger que l'on a nommé *fosse ovale*. Cet enfoncement ne paroît avoir aucune borne en arrière ; mais en devant ses limites sont fixées par le bord concave d'une espèce de valvule très-épaisse, semi-lunaire, dont la partie convexe se perd en devant sur les parois de la cloison. L'extrémité supérieure de cette valvule n'a rien de remarquable ; l'inférieure se continue avec la valvule d'Eustache, comme nous l'avons dit plus haut. Cette valvule correspond par sa surface interne à une autre valvule semblable que nous observerons dans l'oreillette gauche et qui forme toute seule le fond de la fosse ovale dont il s'agit maintenant. Si l'on pousse d'arrière en avant le manche d'un scalpel entre ces deux valvules, on rompt facilement pour l'ordinaire leur adhérence, et on parvient dans l'oreillette gauche en rétablissant ainsi le trou Botal dont il sera parlé dans l'histoire du fœtus.

En dehors, l'oreillette ne présente rien de remarquable, si ce n'est les rides irrégulières formées par des colonnes charnues assez nombreuses, moins multipliées cependant que dans l'appendice.

Ventricule.

Le ventricule droit plus étendu, plus solide que l'oreillette, a une forme triangulaire. Sa base répond en haut à l'ouverture inferieure de l'oreillette et à celle de l'artère pulmonaire; son sommet inférieurement situé correspond au sommet du cœur pris en totalité et se trouve un peu plus haut que celui du ventricule gauche.

On peut distinguer au ventricule deux parois, l'une antérieure et externe, l'autre postérieure et interne; deux ouvertures situées à sa base, l'une à droite, l'autre à gauche.

La paroi antérieure et externe est la seule propre au ventricule droit: son épaisseur est médiocre. La postérieure et interne est formée par la cloison commune des deux ventricules et a beaucoup plus d'épaisseur. L'une et l'autre sont remarquables par une multitude de faisceaux musculeux que l'on nomme communément *colonnes charnues*. Ces faisceaux ont une disposition fort irrégulière, les uns se portant verticalement de la base au sommet, tandis que les autres croisent les premiers en toute sorte de sens, de manière à former un réseau très-confus. Tel est même leur entrelacement surtout vers le sommet que pour l'ordinaire il est impossible d'ouvrir le ventricule entièrement en longueur sans en diviser plusieurs qui traversoient transversalement sa cavité. Le volume de ces faisceaux varie singulièrement: en général, on les trouve beaucoup plus ténus vers le sommet et plus gros en se rapprochant de la base. Les uns im-

plantés dans les parois du ventricule le traversent dans diverses directions et sont isolés de tous côtés dans ce trajet, tandis que d'autres font corps avec les parois du ventricule dans toute leur étendue et paroissent seulement saillans à sa surface.

Parmi ces faisceaux on doit en distinguer trois ou quatre très-volumineux, arrondis, qui naissent ou du sommet du ventricule, ou d'un autre point quelconque de ses parois. Situés à des distances plus ou moins considérables les uns des autres, ils remontent verticalement jusqu'à une certaine distance de la base du ventricule. Là ils cessent tout-à-coup en présentant chacun une extrémité arrondie de laquelle partent de petits cordons fibreux qui se portent en divergeant jusqu'au rebord des valvules tricuspides dont nous parlerons tout-à-l'heure, s'y implantent et s'y terminent.

L'ouverture supérieure droite est la plus considérable et occupe toute la base du ventricule en dehors, en dedans finit au voisinage de l'aorte : elle établit une communication libre entre l'oreillette et le ventricule. On y remarque plusieurs replis membraneux continus en haut avec la membrane qui tapisse l'oreillette, fixés en bas par leurs bords aux cordages tendineux que leur envoient les faisceaux charnus du cœur. Ces replis ont été nommés *valvules tricuspides*, parce qu'on en compte ordinairement trois triangulaires dans leur forme et terminés inférieurement en pointe. Cependant il est rare qu'on en trouve trois distincts les uns des autres. Presque toujours une seule valvule occupe à droite la plus grande largeur de l'ouverture, et paroît seulement

comme découpée vers son bord libre d'une manière très-irrégulière. Une seconde valvule plus large, mais moins longue, réellement triangulaire, occupe la partie gauche de la même ouverture et se trouve appliquée, lorsqu'elle s'abaisse, sur l'ouverture de l'artère pulmonaire qu'elle ferme exactement. Minces et transparentes dans la plus grande partie de leur largeur, ces valvules deviennent un peu plus épaisses à leur bord libre dans l'endroit où elles reçoivent l'insertion des cordons fibreux.

L'ouverture supérieure gauche, dirigée obliquement, conduit à l'artère pulmonaire. A mesure qu'on approche de ce vaisseau, on voit les faisceaux charnus devenir plus larges, plus épais et moins nombreux.

L'entrée de l'artère est marquée par trois valvules nommées *sigmoïdes* ou *semi-lunaires*, ce qui représente très-bien leur forme. Adhérentes aux parois de l'artère par tout leur bord convexe, elles présentent en haut un bord libre horizontal et droit sur le milieu duquel on voit un petit tubercule saillant. Parfaitement distinctes les unes des autres, elles se touchent par les extrémités de leurs bords adhérens. Elles sont lâches et faciles à écarter de l'artère dans leur milieu. Leur ténuité les rend transparentes quoiqu'un double feuillet membraneux les compose.

L'ensemble des valvules sigmoïdes offre assez bien l'image d'une draperie soulevée et soutenue de distance en distance par des liens qui la fixent, flottante dans les intervalles de ces liens.

Née dans cet endroit de l'ouverture du ventricule, l'artère pulmonaire se dirige obliquement en haut et

à gauche en contournant l'origine de l'aorte à laquelle elle est unie par un tissu cellulaire graisseux assez abondant. Parvenue à la partie gauche de cette artère, elle se divise en deux troncs pour l'un et l'autre poumon. Ces troncs s'écartent considérablement l'un de l'autre et se portent presque transversalement jusqu'à leurs organes, comme nous l'avons dit en décrivant l'appareil respiratoire. Dans leur intervalle, on voit naître des parois de l'artère pulmonaire une espèce de ligament arrondi, assez épais, disposé dans la direction de l'artère elle-même et allant se terminer à la partie concave de la grande courbure aortique en se continuant avec les parois de ce même vaisseau. C'est le ligament artériel, reste du canal artériel qui, chez le fœtus, forme la continuation de la pulmonaire, comme il sera dit ailleurs.

La distribution de l'artère pulmonaire ayant été examinée à l'occasion du poumon, nous n'y reviendrons pas ici.

Organisation de la partie droite du Cœur.

En considérant cette organisation de l'extérieur à l'intérieur, on trouve à cette partie droite une membrane séreuse, un tissu musculaire, une membrane interne d'une nature particulière.

La membrane séreuse qui constitue la portion interne du péricarde recouvre toute la surface extérieure du cœur. Elle n'appartient donc pas plus à la partie droite qu'à la gauche. On la trouve un peu plus dense sur l'oreillette, plus mince mais non moins réelle sur le ventricule; mais par-tout elle est telle-

ment disproportionnée en épaisseur avec le tissu musculaire qu'on ne peut la regarder que comme servant d'enveloppe aux parois des cavités, et non comme concourant à leur donner leur soli..ité, différence sensible d'avec la membrane séreuse des intestins qui peut entrer en comparaison avec la musculaire pour l'épaisseur, quoiqu'elle ne l'égale point.

La membrane séreuse est unie au tissu musculaire par un tissu cellulaire tantôt dense et serré, tantôt lâche et chargé de beaucoup de graisse. Cette graisse ne se remarque point dans la portion qui constitue proprement l'oreillette. Mais dans la portion commune aux deux veines caves on en trouve une certaine quantité entre la membrane séreuse et le tissu musculaire. C'est à elle qu'est due la couleur blanchâtre qui à l'extérieur distingue cette partie. Sur le ventricule, le tissu cellulaire sous-séreux contient aussi en certains endroits une graisse abondante irrégulièrement distribuée, mais plus accumulée vers la base du cœur et vers les rainures qui séparent les ventricules. Les branches principales et les premiers rameaux des vaisseaux cardiaques se trouvent plongés dans cette graisse, surtout antérieurement.

C'est le *tissu musculaire* qui forme la partie essentielle et solide des cavités droites, comme c'est lui qui leur donne la faculté de se mouvoir par elles-mêmes.

Il offre en général une couleur rougeâtre, mais beaucoup moins brillante et plus obscure que celle des muscles de la vie extérieure. Ses fibres rapprochées les unes des autres, sont entrecroisées par-tout d'une manière très-irrégulière, en sorte que, quelqu'effort

que l'on fasse, il est impossible de leur reconnoître aucune direction déterminée.

L'épaisseur et la disposition du tissu musculaire varient beaucoup. En général il est beaucoup moins épais, moins abondant dans la partie droite du cœur que dans la gauche, différence surtout remarquable lorsqu'on compare les ventricules. Dans l'oreillette droite, le tissu musculaire forme une couche assez épaisse à la réunion des deux veines caves où il paroît formé de fibres longitudinales. Sur le reste de l'oreillette au contraire il devient rare et n'offre plus que des faisceaux entrecroisés en forme de réseau, saillans à l'intérieur, et laissant entre eux des intervalles dans lesquels la membrane séreuse touche immédiatement la membrane interne, ce qui donne dans ces endroits à l'oreillette une transparence très-sensible. Ces faisceaux sont épais et rares dans le corps de l'oreillette, plus petits et plus multipliés à son appendice. Un d'entre eux qui surpasse les autres en volume, circulairement dirigé, occupe le rebord de l'ouverture de la veine cave supérieure.

Le tissu musculaire forme une couche plus épaisse et plus uniforme à la partie interne de l'oreillette, où il appartient en même temps à la droite et à la gauche en formant leur cloison commune.

Dans le ventricule, le tissu musculaire forme à l'extérieur une couche uniforme; mais à mesure qu'on se rapproche de la cavité, il se réduit à des faisceaux disposés comme ceux de l'oreillette, seulement plus multipliés, plus considérables. Plusieurs se détachent des parois et constituent les colonnes destinées à fixer les valvules.

On voit le tissu musculaire cesser tout-à-coup à l'ouverture supérieure gauche du ventricule, terminaison des cavités droites. Le tissu propre de l'artère pulmonaire commence en se continuant avec lui, quoique par sa nature il en soit évidemment distinct.

La membrane interne des cavités droites est la fin de la membrane commune du système veineux. C'est par les veines caves qu'elle s'introduit dans l'oreillette; elle la tapisse dans toute son étendue, appliquée tantôt sur le tissu musculaire, tantôt sur la membrane séreuse dans les intervalles des faisceaux, unie à l'un et à l'autre par un tissu cellulaire très-dense et peu abondant. Repliée sur elle-même au niveau de la veine cave inférieure, elle constitue la valvule d'Eustache au-dessous de laquelle elle forme par un autre repli plus petit et perpendiculaire la valvule des veines cardiaques.

Vers le contour de l'ouverture par laquelle l'oreillette communique avec le ventricule, la membrane interne se trouve séparée du tissu musculaire par une couche graisseuse peu épaisse, demi-fluide, à laquelle seule il faut rapporter cette couleur blanche de ce qu'on nomme improprement la *zône tendineuse*. Immédiatement après, la membrane abandonne les parois du cœur et forme sur elle-même dans tout le contour de l'ouverture les replis qu'on nomme *valvules tricuspides*. On peut facilement séparer l'un de l'autre par la dissection les deux feuillets membraneux de ces valvules. Après les avoir formées, la membrane se retrouve sur le contour de l'ouverture, et se réfléchit pour tapisser le ventricule dans toute son étendue. Sa ténuité devient

alors telle qu'au premier aspect on est tenté de nier son existence et de croire que le tissu musculaire est en contact immédiat avec le sang. Mais quelque part qu'on examine la surface interne du ventricule, il est facile d'enlever de dessus les faisceaux musculaires des portions de membrane au-dessous desquelles les fibres charnues paroissent aussitôt à nu. Souvent même en observant les colonnes charnues libres dans la cavité, on voit sur leurs bords la membrane former des replis transparens fort sensibles. On ne peut donc point révoquer en doute la continuation de la membrane interne dans le ventricule. Enfoncée dans les intervalles des faisceaux, elle forme des prolongemens pour chaque faisceau en particulier, et leur donne à tous l'aspect lisse et poli qu'on leur remarque.

Parvenue à l'ouverture de l'artère pulmonaire, la membrane interne reprend sa densité primitive, forme en se repliant sur elle-même les trois valvules sigmoïdes, puis se continue dans les divisions de l'artère jusqu'au système capillaire.

Les considérations sur l'organisation de la membrane interne ont été exposées dans l'Anatomie générale.

§ II. *Partie gauche du Cœur.*

Elle forme le commencement du système artériel, comme la partie droite forme la fin du système veineux. On ne peut la nommer *gauche* que par opposition à l'autre et non point en raison de son rapport avec le corps entier. Car elle est placée en grande partie au milieu de la poitrine, et le sommet du ven-

tricule est la seule portion qui fasse saillie dans la cavité gauche du thorax.

Considérée par rapport à l'autre moitié du cœur, elle est aussi beaucoup plus postérieure que gauche. Le cœur en effet, comme nous l'avons dit, est divisé obliquement suivant sa largeur plutôt que suivant son épaisseur, en sorte que les cavités droites prolongées antérieurement cachent en grande partie les cavités gauches. Celles-ci sont plus élevées et presque verticales, tandis que les autres très-obliques forment la région la plus basse du cœur.

La partie gauche se compose comme la droite d'une oreillette et d'un ventricule.

Oreillette.

Elle est située sur la colonne vertébrale à laquelle elle répond par sa partie postérieure, tandis qu'antérieurement elle répond soit à l'oreillette droite avec laquelle elle se continue, soit à l'aorte et à l'artère pulmonaire ainsi qu'à sa division droite; un tissu cellulaire lâche la sépare de ces deux vaisseaux. Assujettie à sa place de tous côtés par les veines pulmonaires qu'elle reçoit, elle ne présente point la mobilité de l'oreillette droite. Sa forme est aussi irrégulière, et on ne s'en forme point une image exacte en cherchant à la comparer. Continue de chaque côté avec les veines pulmonaires, en avant et à droite avec l'oreillette opposée, en bas avec le ventricule gauche, elle se termine à gauche et un peu en devant par une appendice flottante et libre. Cette appendice est tout ce que l'on peut voir de l'oreillette gauche sans déranger le cœur.

On la trouve immédiatement au-dessus du bord gauche de cet organe, à côté du tronc primitif de l'artère pulmonaire. Pour voir en dehors le reste de l'oreillette, il faut soulever le cœur et le rejeter en haut et à droite. On aperçoit alors la surface postérieure de l'oreillette recouverte par la membrane séreuse du péricarde, mais on ne peut en mesurer l'étendue qu'en introduisant le doigt dans l'oreillette droite pour reconnoître par les bornes de celle-ci l'endroit où l'autre commence.

Pour bien connoître la cavité de l'oreillette gauche et se former une juste image de sa disposition, il faut l'ouvrir sans couper les veines pulmonaires. On y parvient par deux procédés. L'un consiste à soulever le cœur comme nous venons de le dire, et à fendre transversalement l'oreillette dans sa partie postérieure, puis à introduire le doigt dans son intérieur pour en reconnoître l'étendue et estimer la distance des ouvertures veineuses. L'autre procédé s'exécute en coupant l'aorte au-dessus de sa courbure et les deux divisions de l'artère pulmonaire près de leur entrée dans les poumons. On abaisse ces deux vaisseaux sur la partie antérieure du cœur, on les isole de l'oreillette par la dissection, et on ouvre celle-ci supérieurement dans toute sa longueur par une incision transversale dans l'endroit où ses deux parois se réunissent.

Cette cavité doit être considérée en arrière, en devant, à droite et à gauche.

En arrière elle n'offre qu'une surface lisse qui n'a rien de remarquable. Cette portion postérieure appartient en propre à l'oreillette gauche.

En devant et un peu à droite on trouve une autre surface également lisse sur laquelle on observe une espèce de valvule semi-lunaire continue avec l'oreillette par son bord convexe qui est en arrière, présentant son bord concave en devant et à gauche. Elle est appliquée sur la valvule semblable que nous avons observée dans l'oreillette droite, mais se trouve beaucoup plus à gauche, en sorte qu'en supposant ces deux valvules écartées l'une de l'autre et laissant entre les deux oreillettes une communication libre, le trajet seroit extrêmement oblique. L'espace que circonscrit le bord concave de cette valvule forme donc réellement une espèce de fosse ovale correspondant à celle du côté droit, mais moins déprimée, parce que la valvule elle-même a beaucoup moins d'épaisseur. Cette paroi antérieure droite de l'oreillette gauche lui est commune avec l'oreillette droite et forme la cloison qui les sépare l'une de l'autre.

A droite l'oreillette reçoit les deux veines pulmonaires de ce côté. L'une lui vient de haut en bas et s'ouvre dans sa partie supérieure. L'autre vient très obliquement de bas en haut s'ouvrir dans sa partie inférieure.

A gauche on trouve également l'ouverture des deux veines du poumon voisin. Elles sont fort rapprochées l'une de l'autre, quelquefois même confondues en une seule.

Ces quatre ouvertures sont entièrement libres; aucune valvule ne s'y observe.

Du côté gauche aussi et au-devant des ouvertures veineuses on trouve la cavité de l'appendice. Elle offre quelques saillies formées par des faisceaux char-

nus, mais moins multipliées que dans l'appendice de l'oreillette droite.

En haut l'oreillette ne présente que le point de réunion des parois antérieure et postérieure, sans aucun autre objet remarquable.

En bas l'oreillette se termine par une large ouverture par laquelle elle communique dans le ventricule gauche.

Ventricule.

Il occupe moins encore la partie gauche que la partie postérieure du cœur : sa forme est pyramidale; mais l'épaisseur de ses parois empêche qu'il ne présente lorsqu'on l'observe, même sur le cadavre, cet aplatissement qui, fort remarquable sur le ventricule droit, permet de le diviser en deux parois distinctes. Celui-ci paroît arrondi suivant sa largeur et offre les diamètres transverses à-peu près égaux dans un point donné de son étendue. Il surpasse en longueur le ventricule droit; car d'un côté son sommet dépasse visiblement celui de cette dernière cavité, de l'autre l'oreillette gauche, égale à la droite en étendue, se trouve plus élevée qu'elle.

Quant à la largeur, il paroît que naturellement elle est égale dans les deux ventricules. Presque tous les anatomistes ont remarqué une largeur moindre dans le ventricule gauche; mais le cit. Sabatier et tous ceux qui ont écrit après lui attribuent uniquement cette inégalité à ce qu'au dernier instant de la vie le sang s'accumule dans les cavités droites, ne pouvant plus pénétrer dans les poumons qui déjà en sont engorgés, tandis que les cavités gauches envoient

encore librement dans l'aorte le sang qu'elles reçoivent des veines pulmonaires. Au reste cette différence de capacité ne m'a jamais paru bien marquée sur le grand nombre de cœurs que j'ai eu occasion d'examiner en faisant les démonstrations particulières dans l'amphithéâtre de Bichat.

A l'extérieur le ventricule gauche n'offre rien de remarquable, si ce n'est qu'en général la graisse s'y accumule beaucoup moins que sur le droit.

A l'intérieur ses parois offrent un grand nombre de faisceaux charnus distincts : ils sont moins multipliés cependant et moins irrégulièrement disposés que dans le ventricule droit. On en voit peu qui traversent en différens sens la cavité; presque tous sont appliqués dans toute leur étendue sur les parois et s'étendent longitudinalement de la base au sommet. Souvent dans ce trajet ils s'entrecroisent par de petits faisceaux secondaires qu'ils s'envoient reciproquement. On les trouve à-peu-près aussi nombreux vers la base que vers le sommet, et d'un volume à-peu près égal, excepté, comme nous le dirons, auprès de l'ouverture aortique.

Parmi ces faisceaux on doit en distinguer deux principaux très-volumineux qui naissent l'un en devant, l'autre en arrière du milieu des parois du ventricule fort loin du sommet, et qui se portent un peu obliquement de bas en haut dans la cavité en s'approchant de la base. Leur origine a lieu souvent par plusieurs faisceaux plus petits qui se réunissent bientôt en un seul. Ils finissent tout-à-coup par une extrémité arrondie tantôt simple, tantôt double, à un pouce à-peu-près de distance de la base du ven-

tricule. Il en naît une multitude de petits cordages fibreux qui s'écartent et se portent en divergeant beaucoup jusqu'aux valvules mitrales dont nous parlerons tout-à-l'heure. Ces tendons s'entrecroisent souvent ensemble dans leur trajet de manière à former de petits réseaux.

Le ventricule gauche se termine supérieurement par deux ouvertures, l'une auriculaire, l'autre aortique.

L'ouverture auriculaire est la plus postérieure et la plus considérable. Sa largeur est déterminée par la grandeur de l'oreillette à laquelle elle communique; elle est bordée par un repli membraneux continu dans tout le contour, libre par ses deux surfaces dans l'une et l'autre cavité, assujettie en bas par les cordages fibreux dont nous venons de parler. Ce repli fort étroit dans plusieurs points s'élargit de beaucoup dans deux endroits, l'un qui répond au bord obtus du cœur, l'autre qui répond à l'ouverture aortique. Ce sont ces deux portions larges, triangulaires, placées l'une vis-à-vis de l'autre, qui constituent les *valvules mitrales* dont l'une étant abaissée bouche nécessairement l'ouverture aortique par sa présence. Formées d'un double feuillet membraneux, plus épaisses en général que les tricuspides, les valvules mitrales augmentent encore un peu d'épaisseur à leur bord flottant lorsqu'elles reçoivent l'insertion des cordages fibreux. Nous reviendrons sur elles en parlant de l'organisation des cavités gauches.

L'ouverture aortique située un peu plus en devant que la précédente est aussi moins considérable. A mesure qu'on s'en rapproche, on voit les faisceaux

charnus du ventricule diminuer progressivement et disparoître bientôt tout-à-fait ; en sorte que dans toute la partie recouverte par la valvule mitrale, la paroi du ventricule paroît unie et lisse : enfin l'aorte naît tout-à-coup du tissu musculaire. Sa circonférence offre trois valvules semblables pour la forme et pour la disposition à celles de l'artère pulmonaire et nommées également *semi-lunaires* ou *sigmoïdes*. La partie de l'aorte à laquelle elles correspondent par leur surface extérieure offre trois enfoncemens qu'on nomme *petits sinus de l'aorte*. Les deux sinus antérieurs présentent dans leur fond un peu au-dessus du bord libre des valvules les ouvertures isolées des deux artères cardiaques.

Organisation de la partie gauche du Cœur.

Cette organisation étant au fond la même que celle de la partie droite, nous nous contenterons d'indiquer les différences de disposition.

La membrane séreuse ne recouvre l'oreillette qu'à sa partie postérieure et à son appendice qu'elle enveloppe : elle n'existe non plus que sur la partie postérieure et gauche du ventricule. Par-tout elle est appliquée sur le tissu musculaire dont la séparent seulement dans quelques endroits les vaisseaux cardiaques et quelquefois une certaine quantité de graisse. Nulle part elle ne se trouve en contact avec la membrane interne. Epaisse sur l'oreillette, elle devient beaucoup plus mince sur le ventricule.

Le tissu musculaire est beaucoup plus épais et plus uniformément distribué sur les cavités gauches

que sur les droites. On le trouve sur les veines pulmonaires dès l'instant où elles sortent du poumon. Il y paroît disposé par fibres parallèles dirigées suivant la longueur du vaisseau. On reconnoît facilement l'endroit où ces fibres commencent en suivant un peu chaque veine dans l'organe pulmonaire où on la trouve toujours réduite à ses deux membranes propres. Ces fibres suivent leur direction primitive en se portant sur l'oreillette sur laquelle elles sont transversales à l'extérieur, irrégulièrement entrecroisées plus profondément. Elles forment une couche épaisse, uniforme, et ne paroissent nulle part disposées en faisceaux séparés comme sur l'oreillette droite. L'appendice seule offre dans son intérieur quelques colonnes charnues; mais les intervalles de ces colonnes sont remplis par un tissu musculaire moins dense, et nulle part l'appendice n'offre dans ses parois la transparence que nous avons remarquée sur quelques points de l'oreillette droite.

Sur le ventricule le tissu musculaire présente une épaisseur considérable et presque double de celle qu'offrent les parois du ventricule droit. Considérées à l'extérieur les fibres paroissent disposées longitudinalement de la base au sommet. On en peut dire autant de la surface interne, au moins si l'on a égard à la direction déjà remarquée du plus grand nombre des faisceaux; mais dans l'épaisseur même des parois les fibres deviennent aussi irrégulières et aussi confusément entrecroisées que dans le ventricule droit. Cette même irrégularité s'observe dans l'épaisseur des colonnes charnues auxquelles sont fixées les valvules mitrales.

Continu avec celui de l'oreillette à l'ouverture auriculaire, le tissu musculaire cesse tout-à-coup à l'ouverture aortique. On voit les fibres s'implanter sur le tissu propre de l'aorte à-peu-près comme les muscles larges de la vie extérieure s'implantent sur les os.

La membrane interne des cavités gauches est la continuation de celle qui a commencé dans les veines pulmonaires et qui se continue ensuite dans tout le système artériel. Introduite par les veines pulmonaires dans l'oreillette, elle la tapisse tout entière sans former aucun repli et s'introduit directement dans le ventricule. En cet endroit elle augmente un peu d'épaisseur, se replie sur elle-même pour former les valvules mitrales, et se retrouve au contour de l'ouverture. Là elle diminue beaucoup d'épaisseur, acquiert même une ténuité telle qu'elle paroît d'abord entièrement cesser. Cependant il n'est aucun point du ventricule où l'on ne trouve une pellicule membraneuse immédiatement appliquée sur les fibres charnues et intimement adhérente avec elles. On la retrouve et sur les faisceaux et sur la portion continue des parois. En suivant ces parois jusqu'à l'ouverture de l'aorte, on ne voit aucune interruption entre cette membrane et celle qui, bien manifestement, tapisse l'intérieur de cette artère. On est donc fondé à admettre la continuation de la même membrane dans le ventricule. En passant de cette cavité dans l'aorte elle devient très-visible et facile à isoler dans les espaces triangulaires qui séparent les origines arrondies et festonnées de ce vaisseau. Introduite dans l'aorte elle reprend son épaisseur primitive, se replie aussitôt sur elle-même et forme les trois valvules semi-lunaires, puis

se continue dans le vaisseau et dans toutes ses divisions.

On trouvera dans l'Anatomie générale des détails aussi intéressans qu'étendus sur l'organisation de la membrane interne du système artériel. Je rappellerai seulement ici un fait qui se rapporte spécialement à la structure anatomique du cœur : c'est la fréquence des ossifications partielles plus ou moins étendues de cette membrane : elles se remarquent principalement sur les valvules mitrales et sur les valvuves sigmoïdes de l'aorte. Très-souvent ces dernières sont entièrement ossifiées ou cartilagineuses, et toujours alors se trouvent distendues et écartées des parois aortiques. Les mitrales présentent plus ordinairement des points osseux isolés et conservent dans leur plus grande partie la structure membraneuse.

La fréquence de ces ossifications est telle qu'on peut hardiment assurer que sur un nombre donné de sujets, quelle qu'ait été la cause de la mort, les trois quarts au moins en présenteront. Ces cas sont donc aussi fréquens que ceux des adhérences pulmonaires. N'est-on pas fondé à en déduire des conséquences analogues ? et est-il permis de regarder comme la maladie principale, ou même comme un état essentiellement morbifique, une disposition organique qui s'allie avec tous les états du cœur et qui se rencontre aussi souvent dans le sujet le plus sain que dans le sujet le plus malade ?

Ces ossifications qui ne s'observent jamais dans les endroits correspondans des cavités droites, ni dans les veines, qui se retrouvent dans toutes les parties du système artériel, prouvent bien une différence de nature entre la membrane du sang noir et celle du

sang rouge. Elles prouvent aussi l'identité de nature entre la portion membraneuse qui forme les valvules mitrales et celle qui forme les valvules sigmoïdes de l'aorte. Mais comme elles ne se trouvent point dans l'intérieur du ventricule gauche, on pourroit en conclure que si la même membrane se continue dans cette cavité, du moins elle y change extrêmement de nature aussi-bien que de densité.

Mouvemens du Cœur.

On a défini avec raison le cœur un *muscle creux*; et cette expression seule nous avertit que tous ses mouvemens tendent ou à agrandir ou à resserrer ses cavités. Ce resserrement, dans lequel les cavités s'effacent presqu'entièrement, est nécessaire pour l'expulsion du sang. La dilatation doit lui succéder pour qu'un sang nouveau soit admis. Cette dilatation est active aussi-bien que la contraction et ne dépend point de l'abord du sang quoiqu'elle coïncide toujours avec lui, puisqu'on la voit s'exercer encore quelque temps après la mort sur le cœur vide et même séparé de la poitrine.

Le cœur se dilate pour recevoir le sang auquel un mouvement nouveau doit être communiqué. Il se contracte pour communiquer ce mouvement au sang qu'il a reçu. La contraction est donc la partie la plus active des phénomènes du cœur, et la dilatation n'a pour but que de donner lieu à des contractions nouvelles.

C'est donc principalement des contractions du cœur que nous devons nous occuper, et ces contractions,

nous devons les étudier plutôt pour nous rendre compte des changemens de disposition qu'éprouvent alors les cavités, que pour entrer dans des détails physiologiques sur la circulation.

1°. Quelque part que nous considérions les fibres musculaires du cœur, nous les voyons irrégulièrement entrecroisées dans toutes sortes de directions. Cet entrecroisement sensible au premier coup d'œil sur l'oreillette droite où les faisceaux charnus sont en grande partie isolés les uns des autres, sensible encore à la surface interne des ventricules où les faisceaux sont saillans, devient très-manifeste par les secours de la dissection dans l'épaisseur des parois, soit des deux ventricules, soit de l'oreillette gauche. Ceci prouve manifestement que les cavités se contractent dans tous les sens à la fois et diminuent également d'étendue dans toutes les directions.

Mais une cloison commune sépare les oreillettes; une cloison commune sépare aussi les ventricules. Ces deux cloisons musculeuses se correspondent l'une à l'autre, se continuent ensemble et forment la limite de l'une et de l'autre moitié du cœur à la fois.

D'un autre côté, il est certain qu'un même instant voit arriver le sang des veines caves dans l'oreillette droite et le sang des veines pulmonaires dans l'oreillette gauche; que par conséquent un même instant voit aussi les deux ventricules se remplir.

Les oreillettes se contractent donc nécessairement ensemble, comme les deux ventricules se contractent nécessairement ensemble à la suite des oreillettes.

Dès-lors dans l'un et l'autre ordre de cavités le sang est pressé de toutes parts et avec une force égale contre la cloison commune. Cette cloison ne peut donc se porter ni d'un côté ni de l'autre ; elle reste immobile et sa contraction ne produit d'autre effet que de diminuer sa largeur.

C'est là le premier fait remarquable que nous présentent les mouvemens du cœur considérés dans leur ensemble. Nous voyons les parties propres des cavités se rapprocher de leur partie commune qui est réellement le point central et fixe des contractions.

2°. Si les cavités en se contractant ne font que se rapprocher de leur cloison commune, si cette cloison en se contractant ne se porte ni d'un côté ni de l'autre, mais diminue seulement d'étendue, nécessairement le cœur se raccourcit dans ses contractions, en sorte que le sommet se rapproche de la base; vérité évidente autrefois contestée, universellement reconnue aujourd'hui.

Cependant c'est au moment de la contraction des ventricules que le cœur fait sentir ses pulsations entre la sixième et la septième côte, puisque ces pulsations sont isochrones à celles qui dans les artères résultent de leur dilatation par l'afflux du sang. On répond facilement à ceci en observant que l'instant de la contraction des ventricules est en même temps celui de la dilatation des oreillettes, lesquelles, voisines de la colonne vertébrale en arrière, ne peuvent se dilater qu'en devant et repoussent ainsi contre les côtes les ventricules dont le mouvement antérieur est alors purement passif.

3°. La contraction des oreillettes et celle des

ventricules se font dans une direction inverse l'une à l'autre. Car les oreillettes se contractent de haut en bas pour pousser le sang dans les ventricules, et les ventricules se contractent de bas en haut pour pousser le sang, soit dans l'artère pulmonaire, soit dans l'aorte.

4°. L'épaisseur du tissu musculaire des cavités du cœur est toujours en rapport exact et rigoureux avec l'étendue de l'espace que le sang doit parcourir en vertu de l'impulsion qu'il reçoit.

Car d'abord on voit que les oreillettes destinées seulement à pousser le sang dans les ventricules ont des parois fort minces, peu résistantes, incapables de se soutenir par elles-mêmes, en sorte que dans leur état de vacuité elles sont toujours flasques et affaissées. Dans plusieurs points, l'oreillette droite est réduite à ses deux membranes entre lesquelles quelques faisceaux musculeux s'entrecroisent en forme de réseau. L'oreillette gauche présente, à la vérité, une épaisseur plus uniforme, mais la différence n'est pas très-grande.

Au contraire, les ventricules destinés à pousser le sang dans des vaisseaux ramifiés à de très-grandes distances, ont un tissu musculaire abondant, épais, solide.

Si l'on compare l'un à l'autre les deux ventricules, le rapport dont nous parlons paroîtra encore plus frappant. Le ventricule droit, qui ne doit pousser le sang que dans le poumon est moins musculeux et moins épais, et présente encore en partie, lorsqu'il est vide, la flaccidité des oreillettes. Le ventricule gauche, agent de l'impulsion du sang dans tout le

système artériel, a des parois musculeuses extrêmement fortes et épaisses.

On doit remarquer que la cloison des ventricules offre aussi une épaisseur considérable, et sous ce rapport semble appartenir plus au ventricule gauche qu'au droit, quoiqu'elle soit commune à l'un et à l'autre.

Ceci nous mène à examiner plus en détail les mouvemens de chaque cavité en particulier et les changemens de disposition qu'ils déterminent.

1°. *Mouvemens des cavités droites.*

Le sang arrive à l'oreillette par les deux veines caves sans qu'aucun mouvement contractile sensible accélère son cours jusqu'à l'embouchure immédiate de ces veines. Dans cet endroit l'un et l'autre vaisseau paroissent garnis de fibres musculaires, soit dans leur contour, soit dans la portion commune à tous deux. Ces fibres sont continues avec celles de l'oreillette que les deux veines réunies servent à compléter en dehors et en arrière.

Il y a donc ici contraction de la part des veines, et cette contraction favorise l'entrée du sang dans l'oreillette qui reçoit en même temps le sang des veines cardiaques. Cette cavité se remplit, se distend et offre alors une couleur violette due à la ténuité transparente de ses parois dans un grand nombre de points. Elle se contracte aussitôt en se rapprochant, soit de la cloison moyenne, soit de l'ouverture du ventricule autour duquel ses fibres sont fixées.

La valvule d'Eustache ne joue aucun rôle dans

cette circonstance. Son usage entièrement relatif à l'état du fœtus exige plus de largeur qu'elle n'en offre chez l'adulte où on ne doit la considérer que comme les débris d'une portion organique jadis essentielle. Le sang est donc pressé de toutes parts dans l'oreillette et tend à s'échapper par l'ouverture la moins résistante. Mais lui-même presse la valvule cardiaque contre la petite ouverture veineuse qui est dès-lors exactement fermée. Le trou Botal n'est point ouvert, et quand il le seroit, son extrême obliquité le rendroit inutile, le sang pressant alors l'une contre l'autre les deux valvules dont l'intervalle constitue ce trou. Il ne reste donc que l'entrée des deux veines caves et celle du ventricule. Nous avons vu que ces embouchures veineuses n'étoient garnies d'aucune valvule propre à empêcher le reflux du sang. Aussi ce reflux a-t-il été observé, et on ne peut le révoquer en doute. Mais le sang qui remplit constamment le système veineux et qui dans ce moment-là même fait effort pour entrer dans l'oreillette, empêche que ce reflux ne soit considérable.

Au contraire, ce moment est celui où le ventricule se dilate; son ouverture est parfaitement libre, et les valvules qui la bordent, abaissées d'avance en vertu de cette dilatation même, n'offre aucun obstacle à l'entrée du sang qui tend à les déprimer encore plus en pénétrant dans la cavité. La plus large de ces valvules se trouve alors appliquée contre l'ouverture de l'artère pulmonaire où le sang ne doit point encore pénétrer.

Le sang remplit donc le ventricule qui aussitôt se contracte sur lui. Pressé de toutes parts, ce fluide

soulève les valvules tricuspides avec d'autant plus de facilité que les faisceaux musculeux auxquels elles sont assujetties se trouvent rapprochés de l'ouverture par le raccourcissement du cœur. Les valvules s'appliquent donc contre cette ouverture auriculaire : la bouchent-elles exactement? On est tenté de le nier lorsqu'on observe le cadavre; car leur largeur paroît disproportionnée avec celle de l'ouverture; mais si l'on se rappelle que la contraction du ventricule se fait dans tous les sens à la fois; que par conséquent cette cavité diminue de capacité comme de longueur, on verra que l'ouverture est alors fort rétrécie et se trouve en rapport exact avec la largeur des valvules.

Les valvules seroient inutilement soulevées contre l'ouverture auriculaire si dans ce moment elles étoient abandonnées à elles-mêmes : le sang les pousseroit dans l'oreillette et s'ouvriroit un passage libre pour retourner dans cette cavité. Il étoit donc nécessaire qu'assujetties inférieurement de quelque manière, elles ne pussent être soulevées que jusqu'à un certain point : c'est l'effet qui résulte de leur fixation à des faisceaux musculeux par le moyen de cordages fibreux. Bichat a refusé à ces cordages la nature tendineuse, mais n'a point développé les raisons sur lesquelles il se fondoit. Je respecte cette opinion indifférente à notre objet actuel, et je me contente d'observer que ces filamens ténus sont doués d'une force de résistance excessive, peut-être même supérieure à celle des tendons d'égale grosseur.

En se soulevant pour fermer l'ouverture auriculaire, les valvules tricuspides laissent libre l'ouverture

de l'artère pulmonaire dans laquelle le sang pénètre pour en parcourir les ramifications.

A son embouchure, cette artère est garnie des trois valvules sigmoïdes auxquelles on attribue communément l'usage de fermer par leur abaissement le retour au sang dans le ventricule pendant *la contraction de l'artère.*

Mais d'abord Bichat a démontré jusqu'à l'évidence que les artères étoient entièrement dépourvues de contractilité organique sensible, et ne faisoient que revenir sur elles-mêmes en vertu de leur contractilité de tissu après la légère dilatation que l'impulsion du sang leur faisoit éprouver, vérité incontestable que la simple comparaison du tissu artériel avec le tissu musculaire auroit dû faire entrevoir depuis long-temps aux anatomistes.

En second lieu les valvules sigmoïdes fixées dans toute l'étendue de leurs bords convexes aux parois de l'artère, ne peuvent dans aucun cas s'abaisser assez pour fermer entièrement l'ouverture du ventricule, surtout si l'on suppose l'artère remplie par le sang comme elle l'est dans le moment auquel on rapporte sa contraction.

En troisième lieu si l'on observe le rapport mutuel de ces valvules et la direction de leurs bords libres, on verra qu'en les supposant même abaissées jusqu'à la position horizontale, il resteroit nécessairement entre ces bords libres un espace triangulaire assez large pour permettre le retour partiel du sang.

Je crois donc que si les valvules sigmoïdes favorisent la circulation pulmonaire en soutenant en partie la colonne sanguine dans le moment du retour de

l'artère sur elle-même, elles sont incapables de remplir l'usage précis qu'on s'est accoutumé à leur attribuer et ne peuvent être comparées exactement sous ce rapport aux valvules tricuspides.

Remarquons d'ailleurs que cette occlusion complète de l'artère devient inutile s'il est démontré, comme on ne peut plus en douter, que l'artère ne se contracte point. Le sang qui afflue continuellement dans le ventricule oppose une résistance suffisante à celui qui de l'artère tendroit à retomber simplement par son propre poids dans cette cavité. Au contraire, l'oreillette et le ventricule sont tous deux contractiles; l'une reçoit le sang de haut en bas, pendant que l'autre pousse celui qu'il contient de bas en haut : il étoit donc nécessaire qu'un obstacle invincible empêchât le choc mutuel de ces deux courans opposés.

2°. *Mouvemens des cavités gauches.*

Ils ressemblent tellement à ceux des cavités droites, que nous n'aurions presque qu'à répéter ce que nous venons de dire, sauf quelques légères différences. L'oreillette reçoit le sang de quatre sources différentes par les veines pulmonaires devenues musculeuses et contractiles près de leurs embouchures. Contractée sur ce sang elle le presse de toutes parts, soit contre la paroi interne où aucune issue ne se présente, vu la disposition des valvules du trou Botal, soit contre l'ouverture du ventricule alors libre et dilatée. En y entrant le sang ne peut passer dans l'aorte que ferme en ce moment une des valvules mitrales.

Aussitôt que le ventricule a reçu le sang, il se

contracte en tous sens; les valvules mitrales soulevées ferment l'ouverture auriculaire et laissent libre celle de l'aorte dans laquelle le sang est poussé.

Ici on a admis une contraction consécutive de l'aorte, comme on avoit admis celle de l'artère pulmonaire, et on a supposé également que les valvules semi-lunaires fermoient absolument le retour au sang dans le ventricule.

Je ne répéterai point les raisons victorieuses par lesquelles Bichat prouve la nullité de contraction de l'aorte; il faut les voir telles qu'il les a exposées lui-même, et je ne saurois trop engager le lecteur à méditer ce beau morceau de l'Anatomie générale, qui par la force invincible du raisonnement, par la clarté qui y règne, par les grandes conséquences qui en sont la suite, suffiroit seul pour immortaliser son auteur (1).

Ce que j'ai dit sur la disposition des valvules sigmoïdes de l'artère pulmonaire et sur les conséquences qui en résultent, s'applique exactement aux valvules semi-lunaires de l'aorte qui sont disposées de même. Elles ne peuvent ni s'abaisser jusqu'à devenir horizontales, ni, en supposant même ce degré d'abaissement, fermer tout-à-fait l'ouverture de l'aorte. Je suppose ici leur état parfaitement sain; mais j'ajoute que les valvules aortiques très-souvent ossifiées dans toute leur étendue, comme je l'ai remarqué plus haut, sont alors constamment dans l'état de distension le plus grand dont elles soient susceptibles et écartées des parois de l'aorte autant qu'elles peu-

(1) Tome II, de la page 319 à la page 340.

vent l'être ; qu'il reste cependant encore entre elles un espace considérable et une communication libre de l'aorte au ventricule. Or ces cas ne peuvent point être regardés comme des causes nécessaires de trouble pour la circulation, puisque l'ossification des valvules aortiques se trouve chez toute sorte de sujets, quelle qu'ait été la cause subite ou lente de leur mort.

Ainsi les valvules semi-lunaires n'interceptent point la communication de l'aorte avec le ventricule et ont seulement l'usage bien évident de soutenir en partie la colonne sanguine au moment où l'aorte distendue légèrement par l'impulsion du sang revient sur elle-même en vertu de sa contractilité de tissu.

On demande si les valvules semi-lunaires bouchent les ouvertures des artères cardiaques au moment où le sang entre dans l'aorte. L'inspection suffit pour prouver que non. Ces ouvertures sont en effet au-dessus des valvules qui ne pourroient s'étendre jusqu'à elles que par une excessive distension impossible à supposer. Je reviendrai d'ailleurs ici au cas d'ossification dans lequel bien évidemment les valvules ne vont point jusqu'aux ouvertures cardiaques, et sont absolument incapables de s'élargir. Les lois de la circulation seroient donc changées alors, supposition tout-à-fait gratuite ; ou bien l'ordre de la circulation seroit troublé dans les artères cardiaques, puisqu'elles recevroient le sang plus tôt qu'elles ne doivent le recevoir, ce qui entraîneroit nécessairement les plus graves conséquences. Or, comme les valvules semi-lunaires se trouvent ossifiées dans un très-grand nombre de sujets chez qui les phénomènes circulatoires s'exécutoient sans aucune apparence de trouble, nous sommes

fondés à conclure que le passage immédiat du sang du ventricule dans les artères cardiaques est conforme à l'ordre naturel.

Ces considérations sur le mécanisme des mouvemens du cœur ont toujours excité le plus vif intérêt de la part des anatomistes. On ne peut entrer sans admiration dans l'étude de ce magnifique organe où toutes les parties sont disposées avec tant d'exactitude pour certaines fins dont il est facile de se rendre compte, où toutes les précautions sont si bien prises pour que des phénomènes très-importans et très-compliqués s'exécutent dans un fort petit espace sans trouble et sans confusion. Lorsqu'on voit une coordination si belle, toute idée de hasard, de cause aveugle, de molécules fortuitement rencontrées, etc. s'éloigne d'un esprit juste et sincère; on s'élève comme involontairement à des idées plus grandes, plus raisonnables, et dans la disposition des *moyens*, on reconnoît l'*action* d'une intelligence souveraine qui *a voulu la fin*.

SYSTÈME ARTÉRIEL.

Considérations générales.

L'AORTE, tronc vasculaire considérable, est l'origine commune de tout le système artériel. Née du cœur, elle se recourbe presqu'aussitôt sur elle-même pour se porter verticalement sur le corps des vertèbres qu'elle occupe depuis la partie supérieure du thorax jusqu'à la partie inférieure de l'abdomen.

Sa courbure fournit quatre troncs considérables destinés à la tête et aux membres supérieurs. En bas l'aorte se termine toute entière par deux troncs destinés soit au bassin, soit aux membres inférieurs. Dans son trajet elle fournit des branches moins volumineuses destinées aux organes des deux cavités qu'elle occupe et aux parois de ces cavités.

Si l'on s'arrête à ce coup-d'œil général et superficiel, on ne verra dans le système artériel qu'un ensemble de vaisseaux successivement décroissans, et dont le volume diminué d'une manière progressive est toujours et sous tous les rapports moindre dans les branches que dans les troncs, dans les rameaux que dans les branches, etc.

Mais si l'on examine en détail la disposition des vaisseaux artériels relativement les uns aux autres, on reconnoîtra que ce décroissement progressif n'est point une loi constante et sûre, que tantôt deux ou trois branches nées d'un même tronc sont, chacune individuellement, égales au tronc lui-même, qu'ailleurs des rameaux d'un fort petit volume naissent immédiatement d'un tronc considérable; que partout enfin la somme des rameaux donne un calibre supérieur à celui du tronc qui les a fournis, vérité si unanimement reconnue qu'elle est devenue un axiôme anatomique.

Ainsi l'artère hépatique et l'artère splénique sont pour l'ordinaire, chacune en particulier, égales à l'artère cœliaque leur tige commune; ainsi il y a une disproportion énorme entre le calibre des artères intercostales et celui de l'aorte d'où elles naissent.

Un autre fait également prouvé par l'inspection se lie au précédent et peut en être regardé comme la conséquence. C'est que le calibre d'une artère ne diminue point en raison du nombre et de la grosseur des branches qu'elle fournit. Le plus souvent l'artère est aussi volumineuse à l'endroit où elle finit en se divisant, qu'elle l'étoit à son origine : l'aorte nous en offre l'exemple le plus frappant et le plus sensible. Egale en grosseur dans ses portions abdominale et thorachique, elle diffère peu vers les iliaques de ce qu'elle étoit à sa courbure, quoique dans ce dernier endroit elle ait fourni quatre troncs dont la réunion la surpasse beaucoup en volume. Souvent même une artère semble avoir acquis près de sa division un diamètre supérieur à celui qu'elle avoit à sa naissance; telle est la carotide primitive qui près du larynx est ordinairement un peu plus grosse que dans l'endroit où l'aorte la produit.

Si le volume des artères ne décroît point d'une manière progressive, s'il n'y a point de rapport exact entre la diminution de volume d'une artère et le nombre des branches qu'elle a fournies, ces deux faits nous mènent à conclure que les diverses parties du système artériel doivent être considérées en quelque sorte comme indépendantes les unes des autres, que deux branches naissant d'un tronc commun ne sont point précisément le *tronc divisé*, mais *deux vaisseaux succédant à un vaisseau plus ou moins considérable avec lequel ils se continuent;* en un mot que l'ensemble des artères nous offre, non pas des vaisseaux conoïdes successivement diminués par leurs subdivisions, mais, comme le dit Haller, une

suite de cylindres continus, successivement plus petits.

Sous ce point de vue le système artériel diffère absolument du système nerveux cérébral. Car les nerfs principaux sont composés de plusieurs filets réunis qui ne font que s'écarter les uns des autres lorque le nerf se ramifie, en sorte que le nombre de rameaux distribués dans un organe se trouvoit tout entier dans le tronc nerveux d'où cet organe les a reçus. Dans le système nerveux cérébral on observe constamment un décroissement progressif, une diminution graduelle de volume depuis les troncs jusqu'aux rameaux. Jamais deux branches ne sont égales chacune en particulier au tronc d'où elles partent, toujours le tronc est d'autant moins volumineux qu'il a fourni plus de branches, de rameaux et de filets. Aussi le nombre des subdivisions d'un nerf est beaucoup moindre que celui des subdivisions d'une artère; et tandis qu'un seul tronc, l'aorte, donne tous les vaisseaux artériels qui se distribuent aux organes des deux vies, plus de quatre-vingts nerfs primitifs donnent à la seule vie extérieure les rameaux qui lui sont nécessaires.

D'après cette comparaison entre les systèmes artériel et nerveux développée par Bichat dans ses cours d'anatomie, on conçoit qu'il est impossible de suivre dans la description des artères l'ordre méthodique de nomenclature que lui-même a suivi en décrivant les nerfs dans l'ouvrage que nous continuons. Les dénominations de *nerf*, *tronc*, *branche*, *rameau*, *ramuscule*, *filets*, *filamens* lui suffisoient et s'appliquoient facilement à un seul nerf, les divi-

sions n'étant jamais très-multipliées et offrant toujours à-peu-près les mêmes images. Au contraire, les mots *artère*, *tronc*, *branche*, *rameau*, *ramuscule*, *etc.* ne nous suffiroient pas, et donneroient souvent des images fausses si nous voulions les appliquer avec un ordre rigoureux. Ainsi, le mot d'*artère* étant employé pour l'aorte, celui de *tronc* pour la carotide primitive, il faudroit nommer *branches* les carotides interne et externe, et il ne resteroit plus que ceux de *rameaux* et *ramuscules* pour les vaisseaux considérables qui se distribuent, soit à la face, soit au cerveau, ce qui formeroit un véritable contre-sens avec l'inspection anatomique, et ne nous laisseroit aucune expression pour désigner les vaisseaux ténus qui s'introduisent immédiatement dans les organes.

Nous avons donc suivi une autre marche, et renonçant à observer ici un ordre précis de nomenclature, nous nous sommes rapprochés de l'usage ordinaire en donnant indifféremment le nom d'*artère* à tous les vaisseaux qui, partis de l'aorte ou de ses principales divisions, ne se distribuent pas immédiatement sur les organes. Le mot *branche* a servi à désigner les divisions principales d'une *artère ;* le mot *rameau* les divisions d'une branche, etc. Ainsi nous avons dit : *artère* innominée, *artère* carotide primitive, *artère* carotide externe, *artère* temporale, *branche* faciale transverse, *rameaux* de cette branche, etc.

Presque toujours nous avons désigné les artères en particulier par les dénominations anciennes que l'usage a consacrées, et auxquelles on est tellement accoutumé, qu'elles ne peuvent donner lieu à aucune

équivoque, lors même que leur signification naturelle ne se trouveroit pas d'accord avec l'application qu'on en a faite. Quelquefois cependant nous nous sommes permis de changer certains mots lorsque la clarté de la description nous a paru le demander. Ainsi nous avons dit : artère *gastrique supérieure* au lieu de *coronaire stomachique*, artère *scapulaire postérieure* au lieu de *cervicale transverse superficielle*, etc.

Nous avons considéré chaque artère depuis son origine jusqu'à sa terminaison dans son volume, sa direction, ses rapports, pour revenir ensuite sur les branches qu'elle donne. Cette méthode qui étoit celle de Bichat nous paroît la plus favorable à l'étude, en ce qu'elle fixe d'abord l'attention toute entière sur le vaisseau principal avant de la porter sur les vaisseaux secondaires qui en partent.

DE L'AORTE.

L'aorte n'est point une production et un prolongement de la substance propre du ventricule gauche : la différence de son tissu d'avec le tissu musculaire de ce ventricule l'indique assez au premier coup-d'œil. Si l'on examine de plus près par le secours de la dissection l'endroit où ces deux organes se réunissent et la disposition de l'aorte à son origine, on voit que la membrane interne du ventricule est la seule partie commune à l'une et à l'autre ; elle seule se continue immédiatement et sans interruption du ventricule dans l'aorte, en formant à l'entrée de celle-

ci les trois replis que l'on nomme *valvules semi-lunaires*.

Mais le tissu propre de l'aorte commence tout-à-coup au niveau de l'ouverture du ventricule et au défaut des fibres charnues. Le contour de l'aorte offre ici trois portions arrondies réunies ensemble à angles aigus, et représentant assez bien l'aspect d'un feston. Le bord de ces portions correspond en dedans aux valvules semi-lunaires, en dehors les fibres charnues du ventricule s'implantent sur lui. L'intervalle anguleux qui sépare deux de ces portions est occupé par la seule membrane interne appliquée sur les fibres charnues du cœur et facile à en détacher.

Née de cette manière, l'aorte se dégage du ventricule. Cachée près de son origine par l'artère pulmonaire placée au-devant d'elle, elle se dirige aussitôt obliquement à droite et après un trajet de quelques lignes se dégage de dessous cette artère; elle remonte ensuite au-devant de la colonne vertébrale en formant une courbure assez prononcée dont la convexité est à droite et en devant, la concavité à gauche et en arrière. Cette courbure s'étend jusqu'au niveau de la troisième ou quatrième vertèbre dorsale.

Dans ce premier trajet l'aorte est renfermée en grande partie dans le péricarde, et ne paroît s'en dégager tout-à-fait qu'à l'endroit où la courbure finit. Embrassée immédiatement à gauche et en arrière par l'artère pulmonaire et par sa division droite, elle répond à droite à la veine cave supérieure et plus médiatement au poumon droit; en devant elle est séparée du sternum par la largeur du médiastin.

A la fin de sa première courbure, l'aorte se trouve

placée sur le milieu de la colonne vertébrale et immédiatement appliquée sur la trachée-artère un peu au-dessus des bronches; elle continue à se recourber en se dirigeant à gauche jusque au-dessus du tronc gauche de l'artère pulmonaire. Cette seconde courbure dans laquelle l'aorte paroît transversale a été nommée *crosse de l'aorte :* c'est elle seule que nous désignerons dans la suite sous le nom de *courbure aortique,* la première n'offrant désormais aucune considération particulière.

Parvenue au-dessus du tronc gauche de l'artère pulmonaire, l'aorte s'enfonce entre la plèvre et la partie latérale de la colonne vertébrale, change tout-à-fait de direction et devient verticale. C'est dans ce sens qu'elle parcourt de haut en bas toute la longueur du thorax renfermée dans l'écartement postérieur des deux plèvres jusqu'au diaphragme. Placée sur le corps des vertèbres, elle n'occupe cependant point la ligne médiane et se trouve déviée sensiblement à gauche, l'œsophage qui la côtoie se trouvant un peu dévié à droite, en sorte que la ligne médiane répond à la rainure qui sépare ces deux conduits.

L'aorte appliquée en arrière sur la colonne vertébrale, côtoyée à droite par l'œsophage, par le canal thorachique et par la veine azygos, répond en devant d'abord à la division des bronches, puis à la réunion postérieure des plèvres et médiatement à la partie postérieure du péricarde; à gauche elle est immédiatement enveloppée par la plèvre de ce côté.

Parvenue au diaphragme, l'aorte séparée de l'œsophage qui la quitte pour passer au-devant d'elle par l'ouverture qui lui est propre, s'engage avec le canal

thorachique entre les deux appendices diaphragmatiques qui la recouvrent quelque temps, et s'introduit dans l'abdomen par l'écartement qu'elles laissent ensuite entre elles. Dans ce petit trajet, l'aorte se rapproche un peu de la ligne médiane, sans cependant s'y placer tout-à-fait. Engagée dans l'abdomen, elle descend verticalement sur le corps des vertèbres lombaires jusqu'à la quatrième ou cinquième où elle finit en se divisant. Dans cette dernière partie de son trajet, elle est appliquée en arrière sur les vertèbres, répond à droite à la veine cave inférieure, à gauche et en devant le péritoine la recouvre, l'estomac et l'intestin grêle reposent sur elle.

Pour examiner avec ordre les nombreuses artères que fournit l'aorte, il faut les distinguer en cinq classes :

1°. Celles que donne l'aorte à son origine.
2°. Celles qui naissent de sa courbure.
3°. Celles qui naissent de sa portion thorachique.
4°. Celles que donne sa portion abdominale.
5°. Celles qui la terminent inférieurement.

1. DES ARTÈRES QUE DONNE L'AORTE A SON ORIGINE.

Ces artères peu considérables, destinées uniquement au cœur et nommées par cette raison *cardiaques*, sont au nombre de deux : on peut les distinguer en antérieure et postérieure, moins d'après leurs point d'origine que d'après leur distribution.

Toutes deux naissent de l'aorte immédiatement au-dessus du bord libre des valvules semi-lunaires,

et leur ouverture, comme nous l'avons vu, correspond au fond de deux des petits sinus de cette artère.

Elles diffèrent beaucoup en volume et en longueur: l'antérieure est la plus petite.

Artère cardiaque antérieure.

Elle naît de l'aorte au côté gauche de l'artère pulmonaire, un demi-pouce à-peu-près au-dessus du ventricule gauche, se dirige aussitôt obliquement en bas en formant une légère courbe jusqu'au commencement du sillon de la face convexe du cœur. Dans ce petit trajet, elle est recouverte et cachée en entier par l'appendice de l'oreillette gauche; puis elle s'engage dans le sillon dont nous venons de parler, le parcourt dans toute son étendue en se subdivisant, et se termine vers le sommet du cœur en s'anastomosant avec la cardiaque postérieure.

Près de son origine, la cardiaque antérieure ne donne aucune branche : parvenue au niveau de la base du ventricule, elle en fournit deux, une droite et l'autre gauche : la droite assez petite remonte sur l'aorte et sur la pulmonaire auxquelles elle se distribue près de leur origine. La gauche plus considérable se porte entre l'oreillette gauche et la base du ventricule correspondant qu'elle contourne pour se répandre enfin par plusieurs rameaux sur le bord vertical et obtus du cœur et s'anastomoser avec une des branches de la cardiaque postérieure. Les rameaux de cette branche se distribuent en haut à l'oreillette, en bas au ventricule gauche. Souvent la

cardiaque donne une troisième branche qui se plonge verticalement dans la cloison des ventricules et s'y distribue en entier.

Dès que la cardiaque antérieure est parvenue dans le sillon antérieur des ventricules elle fournit un grand nombre de branches que l'on peut distinguer en latérales et postérieures.

Les latérales se jettent plus ou moins obliquement sur la surface extérieure de l'un et de l'autre ventricule en se subdivisant pour se plonger entre les fibres musculeux par une multitude de rameaux : les plus volumineuses sont celles qui vont au ventricule gauche. Souvent parmi celles-ci on en trouve une qui par sa grosseur et sa longueur égale presque l'artère elle-même : ramifiée sur le ventricule, elle s'anastomose près du bord obtus et du sommet du cœur avec une branche considérable de la cardiaque postérieure.

Les postérieures en nombre incertain et peu volumineuses pénètrent horizontalement en arrière la cloison des ventricules, s'y ramifient et si perdent.

Artère cardiaque postérieure.

Celle-ci beaucoup plus considérable que la précédente naît de l'aorte immédiatement après sa sortie du cœur au côté droit de l'artère pulmonaire et au niveau de la base du ventricule droit. Cachée à son origine dans l'enfoncement graisseux qui se trouve entre le ventricule, l'oreillette droite, l'aorte et l'artère pulmonaire, elle se porte aussitôt transversalement à droite en formant plusieurs flexuosités et contourne la base du ventricule droit, placée entre lui

et l'oreillette. Parvenue sur le bord mince du cœur, elle se recourbe pour gagner la partie postérieure en suivant la même direction et les mêmes rapports jusqu'au sillon vertical de la face plane. Là elle se divise en deux branches très-considérables dont la plus grosse descend dans ce sillon jusqu'à la pointe du cœur où elle finit, tandis que l'autre continue à se porter transversalement entre l'oreillette et le ventricule gauches jusqu'auprès du bord obtus du cœur sur lequel elle descend enfin pour se terminer aussi près du sommet en se rapprochant de la face convexe. L'une et l'autre s'anastomosent en finissant, avec la cardiaque antérieure.

Depuis son origine jusqu'au sillon postérieur du cœur, la cardiaque donne des branches supérieures et inférieures. Les premières fort petites remontent sur l'aorte et sur l'oreillette droite auxquelles elles se distribuent. Les inférieures plus volumineuses descendent et se ramifient sur la partie antérieure du ventricule droit. La plus considérable se trouve auprès du bord mince du cœur et se divise en deux rameaux qui s'étendent presque jusqu'au sommet de cet organe.

La branche logée dans le sillon postérieur donne des rameaux latéraux et antérieurs. Les latéraux en nombre incertain se répandent sur toute la face plane et s'étendent jusqu'aux deux bords. Les antérieurs au nombre de deux ou trois assez gros se plongent horizontalement dans la cloison des ventricules où ils se réunissent avec ceux de la cardiaque antérieure.

La branche transversale de la cardiaque postérieure donne de petits rameaux supérieurs qui se

répandent sur l'oreillette gauche, des rameaux inférieurs beaucoup plus volumineux qui descendent plus ou moins obliquement sur la partie postérieure du ventricule gauche et ne tardent pas à s'enfoncer dans l'épaisseur de ses parois.

Enfin en descendant sur le bord obtus du cœur la même branche donne des rameaux latéraux qui se jettent sur les deux faces du cœur et se réunissent soit à ceux de la cardiaque antérieure, soit à ceux fournis par la branche descendante de la cardiaque postérieure.

Disposition générale des Artères cardiaques.

On voit, 1°. que les vaisseaux artériels les plus volumineux et les plus multipliés appartiennent à la face plane du cœur et spécialement au ventricule gauche; 2°. que les troncs artériels principaux répondent soit à la cloison commune des ventricules, soit à la base du cœur, et que les branches ou rameaux secondaires sont les seuls qui se répandent immédiatement sur la partie propre de chaque cavité; 3°. que les branches les plus considérables vont au ventricule, tandis que les oreillettes ne reçoivent que des branches fort petites et des rameaux ténus; 4°. enfin que le cœur enveloppé à l'extérieur par les divisions artérielles les plus apparentes, ne reçoit presque partout dans l'épaisseur de ses fibres que des ramifications très-fines.

11. DES ARTÈRES QUE FOURNIT L'AORTE PAR SA COURBURE.

La courbure de l'aorte donne naissance par sa convexité à trois artères considérables. L'une droite est l'innominée divisée bientôt en carotide et sous-clavière droite; les deux autres sont les carotide et sous-clavière gauches.

L'innominée est la plus antérieure et se présente la première. Née de l'aorte au-devant de la trachée-artère elle se dirige obliquement en haut et à droite, remonte quelque temps sur le côté de la trachée et se divise après un trajet d'environ un pouce. Recouverte par la veine sous-clavière gauche, par le sternum et les muscles sterno-hyoïdiens, elle répond en arrière soit à la trachée, soit au muscle long du cou qui la sépare de la colonne vertébrale.

La carotide gauche est à peu-près au même niveau que l'innominée, un peu plus reculée cependant. Née à angles droits de l'aorte, elle se trouve dès son origine sur le côté de la trachée le long de laquelle elle remonte verticalement.

Enfin la sous-clavière gauche est la plus reculée des trois et naît de l'aorte immédiatement avant que celle-ci s'engage entre les deux plèvres.

Ainsi, 1°. l'origine de ces trois artères se fait sur un plan un peu oblique de devant en arrière et de droite à gauche; 2°. l'innominée et la carotide gauche sont les plus antérieures et comprennent entre elles la trachée sur laquelle l'innominée appuie en partie; 3°. les carotide et sous-clavière droite sont plus courtes

que les carotide et sous-clavière gauche, et cette différence se mesure par la longueur de l'innominee.

La disposition de ces artères est très-peu sujette à varier. Quelquefois on a vu la vertébrale gauche naître immédiatement de l'aorte et former un quatrième tronc primitif. Plus souvent on trouve une petite artère née de l'aorte entre l'innominée et la carotide gauche, et remontant verticalement sur la trachée pour aller se rendre à la glande thyroïde. Enfin dans quelques cas rares on a vu la sous-clavière droite naître isolément de l'aorte vers la fin de sa courbure et se porter transversalement entre l'œsophage et la colonne vertébrale pour gagner la première côte.

ARTICLE PREMIER.

Artères carotides primitives.

Nous avons indiqué leurs différences d'origine et de longueur : ce sont les seules qui méritent d'être remarquées. Leur volume est absolument le même. Toutes deux après leur origine remontent un peu obliquement en dehors sur les parties latérales du cou en côtoyant la trachée et en s'écartant toujours plus l'une de l'autre pour se terminer au niveau de la partie supérieure du larynx en se divisant en carotides externe et interne.

En devant la carotide gauche plus longue que la droite est recouverte à son origine par la veine sous-clavière gauche, le thymus et la clavicule.

L'une et l'autre correspondent ensuite dans toute leur étendue à l'intervalle des muscles sterno-mastoï-

dien, sterno et thyro-hyoïdien, et à l'omoplat-hyoïdien qui les séparent du peaucier auquel elles sont presque immédiatement subjacentes en haut.

En arrière chaque carotide répond à la colonne vertébrale dont elle est séparée par les muscles grand droit antérieur de la tête et long du cou, en bas par l'artère thyroïdienne inférieure.

En dedans les carotides répondent à la trachée-artère, au larynx et à la glande thyroïde qui souvent, surtout chez la femme, se prolonge un peu au-devant d'elles. La carotide gauche correspond plus en partie à l'œsophage légèrement dévié de ce côté.

En dehors chaque carotide est côtoyée par la veine jugulaire interne qui souvent la recouvre presqu'en entier, par le nerf vague, et par le rameau inférieur du ganglion cervical supérieur placés derrière cette veine. Beaucoup de glandes lymphatiques répandues sur le trajet du sterno-mastoïdien, de la veine jugulaire et des nerfs, environnent aussi cette artère.

Les carotides externe et interne, divisions de la carotine primitive, naissent d'elle près du bord supérieur du cartilage thyroïde. L'externe appartient presque entièrement à la face et à l'extérieur du crâne; l'interne appartient au cerveau et à l'œil. Leur volume est ordinairement en rapport avec celui de ces parties. Dans l'enfance où le crâne prédomine sur la face, la carotide interne est la plus considérable. Chez l'adulte où le crâne et la face ont une étendue proportionnellement égale, les deux carotides ont aussi à-peu-près le même calibre.

Rapprochées à leur origine elles remontent parallèlement l'une à l'autre jusque sous le muscle di-

gastrique, recouvertes dans ce court trajet soit par le sterno-mastoïdien, soit par la partie inférieure de la glande parotide et par plusieurs glandes lymphatiques. La carotide interne est ici plus saillante et plus superficielle que l'externe.

Au-dessous du digastrique ces deux artères changent de direction. L'interne s'enfonce un peu en arrière et en dedans pour se comporter comme nous le dirons dans la suite.

Quant à l'externe elle se recourbe au-dessous du digastrique en se rapprochant de l'angle de la mâchoire et devenant plus superficielle, puis elle remonte verticalement entre la branche de la mâchoire et le pavillon de l'oreille, cachée entièrement par la glande parotide. Parvenue auprès du col du condyle elle se divise en deux artères nommées *temporale* et *maxillaire interne*.

§ Ier. *Artère carotide externe.*

Cette artère disposée comme nous venons de le dire, fournit un grand nombre de branches. Les plus petites dont le nombre est indéterminé se répandent à toutes les parties voisines, spécialement aux muscles sterno-mastoïdien, digastrique, peaucier, à la glande parotide et à la peau.

Les principales et les seules qui soient constantes dans leur disposition générale peuvent se distinguer en antérieures, postérieures et internes.

Les antérieures sont les artères *thyroïdienne supérieure*, *faciale* et *linguale*.

Les postérieures sont les artères *occipitale* et *auriculaire*; l'interne est la *pharyngienne inférieure*.

Branches antérieures.

1°. *Artère thyroïdienne supérieure.*

Elle naît de la carotide externe un peu au-dessus de son origine, quelquefois au niveau même de cette origine, se porte en dedans et en avant sur le côté du larynx et se recourbe presque aussitôt pour se diriger perpendiculairement en bas vers le sommet de la portion latérale de la glande thyroïde. Recouverte dans ce trajet par les muscles peaucier, omo-plat-hyoïdien et sterno-thyroïdien, elle donne de sa convexité un rameau laryngé et un rameau crico-thyroïdien.

Le rameau laryngé naît au niveau de l'espace hyo-thyroïdien et se porte sur la membrane qui remplit cet espace. Il donne quelques ramuscules qui suivent transversalement cette membrane, s'anastomosent avec ceux du laryngé opposé et se distribuent aux muscles implantés à l'os hyoïde. Puis il traverse la membrane pour se porter au larynx, descend dans l'espace qui sépare le cartilage thyroïde du larynx proprement dit, et se divise en deux rameaux secondaires. L'un se jette perpendiculairement dans le muscle crico-aryténoïdien latéral auquel il se distribue ainsi qu'au crico-thyroïdien; l'autre contourne la base du cartilage aryténoïde pour aller gagner le muscle crico-aryténoïdien postérieur dans lequel il se perd. L'un et l'autre se réunissent à ceux du laryngé opposé. Les ramuscules qu'ils fournissent se répandent en tout sens sur la membrane muqueuse qu'ils suivent soit dans le larynx, soit sur l'épiglotte.

Le rameau crico-thyroïdien moins gros que le précédent naît tantôt de la thyroïdienne, tantôt d'une de ses divisions. Il descend obliquement en dedans sur le cartilage thyroïde en donnant des ramuscules au muscle thyro-hyoïdien, et parvenu sur la membrane crico-thyroïdienne s'anastomose transversalement avec le rameau semblable du côté opposé.

Parvenue au sommet de la glande, l'artère se divise ordinairement en trois branches principales. L'une s'enfonce entre la glande et les parois du larynx, descend en serpentant et finit par un grand nombre de rameaux répandus dans la substance glanduleuse. L'autre plus volumineuse côtoie le bord externe de la glande jusqu'à sa partie inférieure. Ce sont surtout ces deux dernières qui s'anastomosent avec la thyroïdienne inférieure fournie par la sous-clavière. La troisième suit le bord interne de la glande, et parvenue au-devant du cartilage cricoïde s'anastomose par arcade renversée avec la branche semblable de la thyroïdienne supérieure opposée.

Les rameaux de ces trois branches se plongent dans la substance glanduleuse, s'y subdivisent et s'y perdent en se réunissant à ceux des thyroïdiennes inférieures fournies par la sous-clavière.

2°. *Artère faciale.*

Je place sa description, contre l'usage ordinaire, avant celle de la linguale, parce qu'elle est plus superficielle et que toujours on l'étudie la première, vu la nécessité de scier la mâchoire inférieure pour voir exactement la linguale.

L'artère faciale naît de la carotide externe au-dessous du muscle digastrique, isolée pour l'ordinaire, réunie quelquefois dans son origine avec la linguale. Dirigée presque transversalement en avant et en dehors, elle gagne la base de la mâchoire près de son angle, recouverte dans ce trajet par le nerf hypoglosse, par les muscles digastrique et stylo-hyoïdien, et par la glande sous-maxillaire. Puis elle se recourbe sur le bord de l'os maxillaire entre les muscles masseter et triangulaire, change de direction, remonte très-obliquement vers la commissure des lèvres en formant un grand nombre de flexuosités, et après s'être rapprochée plus ou moins du bord libre de la lèvre supérieure en s'engageant sous la réunion des muscles canin et triangulaire, quelquefois en passant sur eux, continue à remonter jusque sur les côtés du nez où elle se termine, soit en s'anastomosant avec le rameau nasal de l'artère ophtalmique, soit en se réunissant plus profondément avec la sous-orbitaire, soit en répandant ses rameaux sur le nez. Dans cette seconde partie de son trajet, l'artère faciale presque par-tout sous-cutanée, mais éloignée de la peau par plus ou moins de graisse, correspond d'abord à l'os maxillaire inférieur sur lequel elle peut être facilement sentie et comprimée par le doigt, puis au muscle buccinateur dont un amas graisseux considérable l'éloigne, puis au labial, puis enfin aux deux élévateurs de la lèvre supérieure.

Les branches de l'artère faciale peuvent se distinguer en celles qui naissent de sa portion sous-maxillaire et celles qui viennent de sa portion faciale proprement dite.

Branches de la portion sous-maxillaire. Ce sont la palatine inférieure et la sous-mentale.

La palatine inférieure est la plus petite. Née de la faciale peu après son origine, quelquefois de la carotide elle-même, elle remonte aussitôt entre le stylo-pharyngien et le stylo-glosse sur la partie latérale du pharynx correspondant à l'intervalle des piliers du voile du palais. Elle se divise aussitôt en un grand nombre de rameaux dont le plus grand nombre se distribue soit au pharynx, soit surtout à la glande amygdale. Les autres remontent dans l'épaisseur du voile du palais, se répandent dans ses muscles et à sa membrane en s'anastomosant avec ceux de la palatine supérieure fournie par la maxillaire interne.

La sous-mentale naît de la faciale près du bord maxillaire. Son volume varie. Elle côtoie l'os maxillaire au niveau de l'attache du milo-hyoïdien, recouverte en bas par le peaucier et par la portion antérieure du digastrique. Ses rameaux nombreux se distribuent à ces muscles et principalement au milo-hyoïdien qu'ils traversent pour aller s'anastomoser avec ceux de la sublinguale qui n'est quelquefois elle-même qu'une division de la sous-mentale. Celle-ci se divise enfin en deux rameaux dont l'un passe au-dessus de l'attache antérieure du digastrique et s'unit à la sous-mentale opposée, tandis que l'autre remonte sur le menton à côté du même muscle pour s'anastomoser avec des rameaux de la branche dentaire inférieure sortis par le trou mentonnier.

Outre ces deux branches, la labiale en fournit un grand nombre à la glande sous-maxillaire. Toutes

sont petites et fort irrégulières dans leur distribution.

Branches de la portion faciale. Elles se distinguent naturellement en externes et internes.

Les externes sont très-nombreuses, mais très-petites et peu constantes. Les unes naissent au niveau de l'os maxillaire et se jettent dans le muscle masseter, ou remontent le long de son bord antérieur pour aller se plonger dans le buccinateur. Les autres nées vers le milieu de la joue se plongent immédiatement dans le buccinateur, ou s'anastomosent avec la branche faciale transverse de l'artère temporale en donnant aux grand et petit zygomatiques. Le plus grand nombre de ces branches est destiné à la peau et va s'y perdre.

Les branches internes sont plus volumineuses et plus constantes. Ce sont les deux labiales et les dorsales du nez,

La labiale inférieure naît de la faciale à une distance assez grande de la commissure, passe sous le muscle triangulaire, et s'avance en serpentant vers le bord libre de la lèvre inférieure sur lequel elle s'anastomose bientôt avec la labiale opposée. Ses rameaux nombreux se répandent, les uns sur la membrane de la bouche, les autres sur les muscles triangulaire, quarré et releveur du menton, en formant un réseau qui reçoit les rameaux anastomotiques des sous-mentales et dentaires inférieures.

La labiale supérieure naît au-dessus de la commissure au niveau du bord libre de la lèvre supérieure. Elle se porte transversalement sur ce bord libre jusque vers son milieu. Là elle communique

par un rameau avec la labiale opposée, et se recourbe aussitôt pour remonter verticalement vers la cloison du nez sur laquelle elle se termine.

Les rameaux des deux labiales supérieures forment un réseau très-compliqué distribué aux muscles labial et abaisseur du nez, ainsi qu'à la membrane interne de la bouche. On en voit plusieurs remonter au-dessous de cette membrane pour se porter aux gencives sur lesquelles ils s'anastomosent avec les rameaux de la branche alvéolaire fournie par la maxillaire interne.

Les dorsales du nez varient beaucoup pour le nombre et pour la disposition. Lorsque le tronc même de l'artère faciale s'anastomose avec la branche nasale de l'ophtalmique, les dorsales naissent assez également dans toute la longueur de cette réunion vasculaire et se portent transversalement sur l'aile du nez pour se réunir à celle du côté opposé. Lorsque au contraire la faciale communique seulement par un rameau avec l'ophtalmique et se termine par les dorsales, celles-ci sont ramassées et agglomérées sur le fibro-cartilage des ouvertures nasales auquel elles donnent un grand nombre de rameaux, tandis que le reste du nez en reçoit beaucoup moins.

Dans tous les cas, ces branches se distribuent non-seulement aux muscles propres du nez, à ses cartilages et à ses tégumens, mais encore à sa membrane interne à laquelle elles se rendent, soit en traversant les parties extérieures, soit en se réfléchissant sur le rebord de l'ouverture.

3°. *Artère linguale.*

Elle naît de la carotide entre les deux précédentes et un peu plus profondément, cachée dans cette origine par le digastrique. Dirigée presque horizontalement en avant et en dedans, elle s'engage bientôt entre l'hyoglosse près de son insertion à l'os hyoïde et le constricteur moyen du pharynx. Près du bord antérieur de l'hyoglosse elle se recourbe en haut, remonte entre le génioglosse et la glande sublinguale jusqu'à la partie inférieure de la glande près de sa base. Là elle change encore de direction, devient horizontale, prend le nom de *ranine* et s'avance entre le génioglosse et le lingual jusqu'à la pointe de la langue où elle finit en s'anastomosant par arcade sur le bord des génioglosses avec la ranine opposée. Le nerf lingual l'accompagne dans cette dernière partie de son trajet.

Ainsi l'artère linguale offre trois directions différentes : horizontale en dedans sous l'hyoglosse, verticale sur le génioglosse, horizontale en avant sous la langue. C'est dans ces trois portions qu'il faut la considerer pour se former une idée exacte des branches qu'elle donne.

Sous l'hyoglosse la linguale donne plusieurs rameaux soit à ce muscle, soit au constricteur moyen du pharynx. Quelques-uns traversent l'hyoglosse pour aller se répandre au digastrique, au thyro-hyoïdien, etc. Mais les principales branches sont les dorsales de la langue. On n'en compte ordinairement qu'une, quoique presque toujours il s'en trouve plu-

sieurs. Elles remontent sur le génioglosse, gagnent la base de la langue dans laquelle elles pénètrent et se distribuent en répandant leurs rameaux sur le styloglosse et jusque sur l'épiglotte.

Sur le génioglosse la linguale, outre les rameaux nombreux qu'elle fournit à ce muscle, donne une branche considérable nommée *sublinguale*. Dirigée horizontalement en avant au-dessus du milo-hyoïdien et de la glande sublinguale, cette artère fournit un grand nombre de rameaux, soit à ces parties, soit à la membrane interne de la bouche. Elle communique avec la sous-mentale par des rameaux qui traversent le milo-hyoïdien, et finit en s'anastomosant au-devant des deux génioglosses avec la sublinguale opposée.

Quelquefois la sublinguale vient de la portion sous-maxillaire de l'artère faciale. Elle passe alors entre l'hyoglosse et le bord postérieur libre du milo-hyoïdien, pour se comporter ensuite comme nous venons de le dire. Souvent dans ce dernier cas c'est elle qui avant de s'engager ainsi fournit la sous-mentale.

Sous la langue l'artère devenue *ranine* donne latéralement dans toute son étendue un grand nombre de rameaux volumineux dont les uns se perdent en dehors dans le muscle lingual, les autres en dedans se plongent dans les génioglosses et s'anastomosent avec les semblables de la ranine opposée.

L'anastomose des deux ranines répond au repli formé par la membrane muqueuse de la bouche, et connu sous le nom de *frein de la langue* ou *filet*. Elle pourroit donc être intéressée dans la section

de ce repli, pratiquée quelquefois chez les enfans nouveau-nés, et il en résulteroit une hémorrhagie peu importante par elle-même si on a égard au calibre du vaisseau, mais fort dangereuse à cause des mouvemens de succion que la présence du sang détermine alors et qui perpetuent l'écoulement. Mais comme cette artère artérielle est fort rapprochée des muscles, on évite facilement sa lésion en éloignant un peu l'instrument de la surface inférieure de la langue, comme tous les auteurs le recommandent aujourd'hui.

Branches postérieures.

1°. *Artère occipitale.*

Elle naît de la carotide externe au niveau et au côté opposé de la linguale, remonte aussitôt obliquement en arrière en côtoyant le digastrique, au-dessous du sterno-mastoïdien, passe ensuite transversalement entre l'apophyse transverse de l'atlas et l'apophyse mastoïde, puis se porte dans la même direction sur l'occipital, recouverte en dehors par le muscle splénius. Sortie de dessous ce muscle elle devient sous-cutanée dans tout le reste de son trajet sur l'occipital et jusqu'à sa terminaison.

Cette artère égale à-peu-près la linguale en volume; souvent cependant elle lui est un peu inférieure.

Considérée depuis son origine jusqu'à sa sortie de dessous le splénius, l'occipitale fournit des branches supérieures et inférieures.

Les supérieures se distribuent au muscle digastrique

et au sterno-mastoïdien près de son attache à l'apophyse. Quelquefois parmi ces branches on trouve l'artère auriculaire postérieure ordinairement fournie par la carotide elle-même. Mais la plus remarquable et la plus constante est la *mastoïdienne postérieure* née de l'occipitale au-dessous du splénius. Elle remonte flexueuse sur l'occipital, s'introduit dans le crâne par le trou mastoïdien postérieur et va se distribuer à la dure-mère.

Les branches inférieures descendent sur les sterno-mastoïdien et splénius, s'y distribuent et s'y perdent ainsi qu'aux intertransversaires : aucune ne mérite une description particulière.

Devenue sous-cutanée, l'occipitale donne plusieurs branches inférieures qui descendent dans l'épaisseur des muscles postérieurs du cou et s'y perdent. Quelquefois on en trouve une volumineuse qui descend dans l'épaisseur des muscles du dos jusqu'à la partie inférieure de l'épine. L'occipitale se recourbe ensuite, remonte sur l'os en suivant à-peu-près la direction de la suture lambdoïde, et se divise en un grand nombre de branches et de rameaux qui répandus entre la peau et l'aponévrose vont s'anastomoser soit avec l'occipitale opposée, soit avec les rameaux postérieurs de la temporale. Tous finissent par se perdre à la peau et au muscle occipital.

2°. *Artère auriculaire.*

C'est la plus petite des branches fournies par la carotide externe. Elle en naît dans l'épaisseur de la glande parotide au-dessus du muscle digastrique, re-

monte aussitôt, couverte par la même glande, jusqu'à la partie inférieure du pavillon de l'oreille et là se divise en deux branches dont l'une remonte entre la peau et le cartilage pour se distribuer à toute la surface convexe de la conque, tandis que l'autre se porte au-dessus de l'apophyse mastoïde sur les parties latérales de la tête et se distribue soit aux muscles auriculaire postérieur et occipital, soit à la peau.

Dans son trajet l'artère auriculaire fournit plusieurs rameaux à la glande parotide, au stylo-hyoïdien et au digastrique.

Mais la branche la plus remarquable qu'elle donne, c'est la stylo-mastoïdienne. Celle-ci peu après son origine donne au conduit auditif quelques rameaux dont un pénètre jusqu'à la membrane du tympan à laquelle il se distribue, puis elle s'engage par le trou dont elle porte le nom dans l'aqueduc de Fallope, le parcourt et donne des rameaux qui pénètrent dans la caisse du tympan pour se distribuer à ses diverses parties. Cette branche s'anastomose enfin avec un rameau de la méningée introduit dans le même aqueduc par l'hiatus de la face supérieure du rocher.

Branche interne. Artère pharyngienne supérieure.

Cette artère, la plus petite de toutes celles que fournit la carotide externe, est aussi la plus profondément cachée, et on ne la découvre qu'en faisant la coupe usitée pour étudier le pharynx (1).

---

(1) Voyez le tome III, pag. 380.

Elle naît entre l'origine des artères faciale et linguale, remonte verticalement sur la partie latérale du pharynx et se trouve dans la direction primitive de la carotide externe qui la produit. En dehors et en arrière elle avoisine la carotide interne; en devant elle correspond d'abord au muscle stylo-pharyngien, puis au constricteur supérieur.

Dès son origine, la pharyngienne donne des rameaux internes qui descendent obliquement sur la partie postérieure du pharynx et se distribuent aux constricteurs.

Après un court trajet elle se divise en deux branches à-peu-près égales, l'une pharyngienne, l'autre méningée.

Branche pharyngienne. Elle se porte transversalement sur le constricteur supérieur, se divise aussitôt en deux ou trois branches secondaires dont l'une remonte dans l'épaisseur du muscle auquel elle donne en tout sens de nombreux rameaux; les autres se portent obliquement en bas, et se distribuent principalement aux constricteurs moyen et inférieur. Les rameaux de celles-ci s'anastomosent dans ces muscles avec les rameaux pharyngiens de la thyroïdienne supérieure et de la linguale

Branche méningée. Elle est un peu plus volumineuse, [illegible] te dans le sens de l'artère entre la carotide interne, la veine jugulaire interne et le nerf vague, s'introduit dans le crâne par le trou déchiré postérieur, et se distribue à la portion de dure-mère qui tapisse les fosses occipitales inférieures.

Dans son trajet avant d'entrer dans le crâne, cette branche fournit d'assez nombreux rameaux au nerf

vague, au ganglion cervical supérieur, au conduit d'Eustache, en arrière aux muscles grand et petit droits antérieurs de la tête et long du cou. Elle donne aussi quelques rameaux supérieurs qui pénètrent isolément dans le crâne pour se rendre à la dure-mère; un d'eux plus remarquable s'introduit en traversant la substance cartilagineuse du trou déchiré antérieur. Quelquefois le trou condyloïdien antérieur de l'occipital en transmet un second.

Branches qui terminent la carotide externe.

1°. *Artère temporale.*

Elle commence auprès du col du condyle, endroit où se fait la division de la carotide. Inférieure en volume à la maxillaire interne, elle remonte presque verticalement entre la branche de la mâchoire, le conduit auditif, et la glande parotide qui la recouvre en dehors, jusqu'à l'arcade zygomatique, continue le même trajet au-dessus de cette arcade sur l'aponévrose temporale, et parvenue vers le milieu de la région temporale se divise en deux branches, l'une antérieure, l'autre postérieure. Depuis l'arcade jusqu'à sa terminaison elle est sous-cutanée.

Les branches que fournit la temporale sont antérieures, postérieures, et internes.

Parmi les antérieures qui vont toutes, soit au masseter, soit à l'articulation de la mâchoire, on doit distinguer *la faciale transverse*. Née à l'origine même de la temporale, elle passe sur le col du condyle, puis sur le masseter dont elle croise la direction

près de son attache supérieure en accompagnant le conduit parotidien, et se termine enfin vers le bord antérieur du muscle par plusieurs rameaux qui s'anastomosent soit avec l'artère faciale, soit avec la branche sous-orbitaire. Avant d'arriver sur le masseter la faciale transverse donne un rameau considérable qui s'engage dans l'épaisseur de ce muscle, s'y distribue et y communique avec la branche masseterine de la maxillaire interne. Ses autres rameaux nombreux n'ont rien de constant ; ils se répandent soit sur la région temporale, soit sur le masseter et sur la peau.

Les branches postérieures en nombre indéterminé se portent sur le conduit auditif et sur le pavillon de l'oreille auxquels elles se distribuent sous le nom d'*auriculaires antérieures*.

Enfin la seule branche interne remarquable est celle qu'on nomme *temporale moyenne*. Née de l'artère tantôt au-dessous, tantôt et plus souvent au-dessus de l'arcade zygomatique, elle traverse presque aussitôt l'aponévrose temporale et s'enfonce dans le muscle du même nom auquel elle se ramifie en communiquant avec les temporales profondes de la maxillaire interne.

Des deux divisions principales par lesquelles se termine la temporale, l'antérieure se dirige obliquement jusqu'auprès de la région frontale, et là se subdivise en une multitude de rameaux dont les uns continuant le même trajet vont s'anastomoser avec les rameaux de la frontale et de la sourcilière fournies par l'ophtalmique, les autres se recourbent pour se porter sur le sommet de la tête et se réunir à ceux de la temporale opposée. Tous se distribuent soit aux

muscles frontal, sourcilier, palpébral, soit à la peau.

La branche postérieure dirigée obliquement sur le pariétal et sur l'occipital se subdivise en un grand nombre des rameaux répandus uniformément en tout sens et anastomosés soit avec la temporale opposée, soit avec l'occipitale.

2°. *Artère maxillaire interne.*

Elle est plus volumineuse que la précédente, parcourt un trajet plus compliqué et donne un grand nombre de branches importantes.

Née de la carotide au niveau du col du condyle, elle s'enfonce transversalement derrière ce col, placée dans l'intervalle graisseux qui sépare les muscles ptérygoïdiens, et dirigée en avant. Au-delà du col elle se recourbe pour se porter directement en dedans et s'enfoncer entre les deux ptérygoïdiens en passant entre le nerf dentaire inférieur et le lingual. Renfermée entre les ptérygoïdiens elle change un peu de direction, se porte obliquement en avant et en dedans, et se rapproche ainsi de la tubérosité maxillaire. Près de l'attache fixe des deux muscles elle se recourbe, devient verticale et traverse l'épaisseur du ptérygoïdien externe au-dessus duquel elle continue à remonter en se rapprochant insensiblement de l'arrière-fond de la fosse zygomatique. Près de la paroi inférieure de l'orbite elle se recourbe, redevient transversale, s'enfonce directement dans cet arrière-fond où, environnée d'une graisse abondante, elle se termine en se divisant.

Ainsi la maxillaire interne horizontale depuis son

origine jusqu'auprès de la tubérosité maxillaire et recourbée deux fois dans ce trajet, devient ensuite verticale pendant quelque temps pour reprendre enfin sa direction horizontale à l'endroit où elle finit.

Les branches de la maxillaire interne peuvent se distinguer en quatre classes; 1°. celles qu'elle donne près de son origine et avant de s'engager entre les ptérygoïdiens; 2°. celles qui en naissent pendant qu'elle traverse ces deux muscles; 3°. celles qui en partent depuis qu'elle est sortie du ptérygoïdien externe jusqu'à son entrée dans l'arrière-fond zygomatique; 4°. celles qui la terminent lorsqu'elle est parvenue dans cet arrière-fond.

Branches que donne la maxillaire interne derrière le col du condyle.

Il y en a deux : la méningée et la dentaire inférieure.

Branche méningée. C'est la première des deux, et la plus volumineuse de toutes. Cachée par le muscle ptérygoïdien externe et environnée par deux rameaux nerveux du maxillaire inférieur qui vont communiquer avec le nerf facial, elle remonte presque verticalement jusqu'au trou sphéno-épineux par lequel elle s'introduit dans le crâne. Dans ce petit trajet elle donne plusieurs rameaux dont les uns vont aux ptérygoïdiens et au constricteur supérieur du pharynx, les autres se répandent sur le temporal et sur le sphénoïde. Ces derniers donnent souvent un grand nombre de ramuscules qui traversent le sphénoïde

par de petits trous particuliers et vont se rendre à la dure-mère. Un autre rameau plus considérable remonte en avant et en dedans sous la paroi supérieure de la fosse zygomatique, entre elle et les nerfs temporaux profonds, se recourbe bientôt en bas, descend verticalement entre le péristaphylin externe et le ptérygoïdien interne, et se perd dans ces deux muscles par un grand nombre de ramuscules. Ce rameau naît quelquefois de la maxillaire interne elle-même.

Chez certains sujets on a vu la méningée ne donner aucun rameau avant son entrée dans le crâne.

Parvenue dans le crâne et placée au-dessous de la dure-mère, la méningée donne quelques rameaux à la portion de cette membrane qui tapisse la fosse temporale interne, et aux nerfs trijumeaux. On a vu un ou deux d'entre eux se porter antérieurement jusqu'auprès de la petite aile du sphénoïde, traverser par un ou deux conduits l'os malaire auquel ils laissent quelques ramuscules, et se jeter dans la glande lacrymale. En arrière elle en donne deux plus constans dont l'un supérieur pénètre par l'hiatus de la face supérieure du rocher dans l'aqueduc de Fallope et s'anastomose avec la stylo-mastoïdienne; l'autre inférieur s'introduit dans le conduit du muscle interne du marteau et se distribue à ce muscle. Quelques autres s'introduisent dans le tympan par de petites ouvertures particulières et s'y distribuent à la membrane muqueuse.

Ensuite la méningée se divise en deux branches inégales. L'antérieure plus volumineuse se dirige obliquement en avant et en haut, gagne l'angle infé-

rieur du pariétal, et se place dans la gouttière ou dans le canal qui s'y observe. Quelques rameaux partis d'elle vont à l'orbite par la fente sphenoïdale et s'anastomosent avec la branche lacrymale de l'ophtalmique. Mais bientôt elle se subdivise en une foule de rameaux plus ou moins volumineux qui se répandent de toutes parts sur la dure-mère dans la partie antérieure du crâne jusqu'au sinus longitudinal supérieur. La branche postérieure plus petite remonte sur la portion écailleuse du temporal et sur le pariétal, et se subdivise en rameaux répandus de même dans la partie moyenne et postérieure du crâne.

Tous ces rameaux saillans à l'extérieur de la dure-mère sont logés dans les sillons qu'on remarque sur les os, en sorte que l'inspection seule de ces sillons indique exactement la distribution artérielle.

Branche dentaire inférieure. Elle naît en bas de la maxillaire interne, tantôt vis-à-vis la méningée, tantôt entre les ptérygoïdiens et vis-à-vis la temporale profonde postérieure. Elle descend obliquement sur la surface interne de la branche de la mâchoire, recouverte en dedans par le ptérygoïdien interne, en arrière par le ligament latéral interne de l'articulation, en avant par le nerf dentaire inférieur qui l'accompagne jusqu'à l'ouverture du conduit dentaire où elle s'engage avec lui, quelquefois cependant par une ouverture particulière. Dans ce trajet la dentaire donne d'abord de nombreux ramuscules au ptérygoïdien interne, aux nerfs dentaire et lingual. Immédiatement avant d'entrer dans le conduit elle donne un rameau plus volumineux qui descend dans un petit sillon de l'os maxillaire le long de l'attache

du milo-hyoïdien, entre ce muscle et la membrane buccale en se distribuant à l'un et à l'autre.

Parvenue dans le conduit dentaire la branche le parcourt dans toute son étendue en formant plusieurs flexuosités. Transversale dans ce trajet elle donne supérieurement des rameaux qui pénètrent dans les alvéoles et s'introduisent dans la cavité intérieure de chaque dent par le trou de la racine. Au-dessous de la première petite molaire elle se divise en deux branches inégales. L'une très petite sort par le trou mentonnier et se distribue aux muscles triangulaire et quarré en s'anastomosant avec l'artère faciale. L'autre plus volumineuse continue son trajet dans l'os maxillaire jusqu'à la symphyse au-dessous des dents canines et incisives auxquelles elle donne des ramuscules ainsi qu'au tissu spongieux de l'os.

Outre ces deux premières branches la maxillaire interne fournit souvent au même endroit, 1°. une auriculaire profonde qui remonte sur l'os temporal derrière le conduit auditif, en se distribuant aux deux membranes de ce conduit et aux glandes cérumineuses ; 2°. une tympanique qui se porte vers la fente glénoïdale et se distribue au muscle antérieur du marteau en s'introduisant avec lui jusque dans le tympan.

Branches que donne la maxillaire interne engagée entre les ptérygoïdiens.

Ces branches sont : la temporale profonde postérieure, la masseterine et les ptérygoïdiennes.

Branche temporale profonde postérieure. Elle naît peu après la dentaire, souvent même un tronc

commun les fournit toutes deux. Cachée à son origine par le ptérygoïdien externe elle remonte bientôt entre lui et la portion du masseter qui couvre l'échancrure sigmoïde de la mâchoire, gagne obliquement la surface interne du muscle temporal, et, devenue verticale, remonte entre la fosse temporale et le muscle auquel elle se distribue par de nombreux rameaux anastomosés soit en avant avec ceux de la temporale profonde antérieure, soit entre les fibres musculaires avec la temporale superficielle.

Branche masseterine. Très-souvent elle naît de la précédente et toujours lui est inférieure en volume. Dirigée en dehors elle traverse l'échancrure sigmoïde en donnant plusieurs rameaux à la portion supérieure du masseter, descend ensuite obliquement en avant entre la branche maxillaire et le muscle dans lequel elle se prolonge enfin et se perd entièrement par un grand nombre de rameaux anastomosés avec ceux de la branche faciale transverse.

Branches ptérygoïdiennes. Leur nombre est incertain, leur volume très-petit. Presque toutes naissent de la maxillaire elle-même; quelques-unes sont fournies par les branches méningées et temporale profonde postérieure. Elles se distribuent principalement au ptérygoïdien externe dans lequel elles se perdent d'une manière fort irrégulière. On en voit quelques-unes remonter entre la paroi supérieure de la fosse zygomatique et fournir des rameaux ténus qui accompagnent les nerfs temporaux profonds.

Branches que donne la maxillaire interne depuis sa sortie des ptérygoïdiens jusqu'à son entrée dans l'arrière-fond de la fosse zygomatique.

Ces branches sont : la buccale, la temporale profonde antérieure, l'alvéolaire et la sous-orbitaire.

Branche buccale. Elle naît quelquefois de la maxillaire elle-même encore placée entre les ptérygoïdiens, mais plus souvent de la temporale antérieure, de l'alvéolaire ou de la sous-orbitaire. Son volume est peu considérable. Dirigée obliquement en bas et en avant et accompagnée par le nerf buccal, elle gagne la partie externe du buccinateur, devient transversale et suit le muscle jusqu'auprès de la commissure en se distribuant soit à lui, soit à la membrane interne de la bouche et aux glandes muqueuses. Cette branche manque quelquefois absolument et se trouve remplacée par plusieurs rameaux de l'alvéolaire.

Branche temporale profonde antérieure. Elle naît de la maxillaire immédiatement après qu'elle est sortie du ptérygoïdien externe. Son volume est assez considérable. Dirigée verticalement en haut sur la partie interne et antérieure du muscle temporal, elle remonte entre lui et la réunion des os malaire et sphénoïde en se distribuant aux fibres musculaires. Un de ses rameaux s'anastomose avec celui que la lacrymale envoie au travers de l'os malaire dans la fosse temporale. Presque toujours cette temporale fournit plusieurs autres rameaux qui traversent l'os malaire, et vont se distribuer au tissu cellulaire de

l'orbite, au périoste, souvent même à la glande lacrymale.

Quelquefois une troisième temporale profonde naît entre les deux précédentes pendant que la maxillaire interne traverse les ptérygoïdiens.

Branche alvéolaire. Elle naît de la maxillaire interne vers le milieu de son trajet vertical sur la tubérosité maxillaire; quelquefois c'est la temporale antérieure ou la sous-orbitaire qui la fournissent. Elle est plus volumineuse que la précédente. Dirigée horizontalement en avant, elle contourne l'os maxillaire en formant plusieurs flexuosités, et parvient ainsi jusqu'à la fosse canine où elle se perd dans les muscles labiaux.

Près de son origine elle donne un grand nombre de rameaux d'une excessive ténuité, qui par de petits conduits particuliers de l'os maxillaire vont se distribuer les uns aux dents incisives, les autres à la membrane du sinus maxillaire.

Parvenue à la ligne obtuse et concave qui sépare la fosse zygomatique de la canine, l'alvéolaire fournit un rameau plus considérable nommé *dentaire supérieur*, lequel introduit dans un canal particulier de l'os se distribue aux dents molaires et incisives.

Les autres rameaux se distribuent aux gencives, au périoste, au tissu cellulaire graisseux des joues et au muscle buccinateur.

Quelquefois l'alvéolaire au lieu de finir dans la fosse canine remonte sous l'éminence malaire, et va s'anastomoser avec la sous-orbitaire au moment où elle sort de son canal.

Branche sous-orbitaire. Elle naît de la maxillaire

au niveau de la paroi inférieure de l'orbite, immédiatement avant que l'artère se jette dans l'arrière-fond zygomatique. Son volume égale à-peu-près celui de la temporale antérieure. Dès son origine elle fournit quelques rameaux au périoste et à la graisse orbitaire, puis elle s'engage dans la gouttière sous-orbitaire, et ensuite dans le canal entier qu'elle parcourt sans former de flexuosité sensible, placée au-dessous du nerf de même nom qu'elle. Dans son trajet elle donne d'abord quelques rameaux qui pénètrent dans l'orbite et vont aux muscles abaisseur, petit rotateur, palpébral, et au sac lacrymal. Plus antérieurement elle fournit des rameaux qui par de petits conduits particuliers de l'os maxillaire vont se distribuer à la membrane du sinus dans sa partie supérieure et y forment un réseau plus ou moins sensible; enfin elle sort du canal par le trou orbitaire inférieur, cachée par le muscle élévateur propre de la lèvre. Là elle se divise en un grand nombre de rameaux dont les uns vont aux muscles labiaux, les autres communiquent avec la branche nasale de l'ophtalmique, avec la faciale et l'alvéolaire.

Branches que donne la maxillaire interne dans l'arrière-fond de la fosse zygomatique.

Ces branches sont la ptérygoïdienne, la ptérygo-palatine, et la palatine supérieure.

Branche ptérygoïdienne. Elle est fort petite; quelquefois c'est la palatine supérieure qui la fournit. Engagée aussitôt après son origine dans le conduit ptérygoïdien avec le rameau nerveux du même nom,

elle le parcourt en entier en donnant des rameaux au tissu spongieux du sphénoïde, et en sort en arrière pour se distribuer à la membrane muqueuse du pharynx et du conduit d'Eustache.

Branche ptérygo-palatine. On la nomme aussi *pharyngienne supérieure.* Elle est encore plus petite que la précédente au-dessous de laquelle elle naît. Dirigée un peu obliquement en haut et en arrière elle traverse le conduit ptérygo-palatin en donnant quelques ramuscules à l'os sphénoïde, sort en arrière et se termine au pharynx comme la ptérygoïdienne.

Branche palatine supérieure. Elle est très-volumineuse. Née de la maxillaire interne elle descend verticalement entre l'os maxillaire et l'apophyse ptérygoïde et s'engage dans le conduit palatin postérieur. Avant d'y entrer elle fournit trois ou quatre rameaux assez considérables qui s'introduisent dans les conduits accessoires, les traversent et en sortent inférieurement pour se distribuer au voile du palais. La branche elle-même après avoir parcouru le conduit palatin en sort à la partie postérieure et externe de la voûte palatine, profondément cachée par le tissu dense qui se trouve entre l'os et la membrane muqueuse. Là elle se recourbe et se porte horizontalement en devant dans le sillon que l'os présente. Dans ce trajet elle est très-flexueuse, donne un grand nombre de rameaux à la membrane, au tissu qui lui adhère et aux glandes muqueuses. C'est par ces rameaux qu'elle se termine; quelquefois un d'eux s'engage dans le conduit palatin antérieur qui le transmet dans les fosses nasales.

Après avoir fourni ces dernières branches, la maxil-

laire interne remonte un peu dans l'arrière-fond, se recourbe sur elle-même, prend le nom de *sphéno-palatine*, et pénètre transversalement par le trou sphéno-palatin dans la partie postérieure, supérieure et externe des fosses nasales. Placée alors au niveau du cornet ethmoïdal et couverte par la membrane muqueuse, elle se divise en deux ou trois branches principales. L'une se porte sur la cloison et s'y ramifie ; l'autre ou les autres se subdivisent autour du cornet ethmoïdal auquel elles se distribuent principalement, ainsi qu'au méats supérieur et moyen, aux cellules ethmoïdales postérieures et au sinus maxillaire. Les ramifications extrêmement multipliées et ténues de toutes ces branches donnent à la membrane pituitaire la rougeur très-marquée qu'on lui trouve surtout dans cette région.

Souvent la sphéno-palatine se divise avant d'entrer par le trou qui lui est propre, en deux ou trois branches qui pénètrent ensemble dans les fosses nasales et se distribuent ensuite comme nous venons de le dire.

Remarques sur la distribution de la carotide externe.

Des deux divisions de l'artère carotide primitive, la carotide externe est celle qui fournit le plus de branches et qui se distribue à un plus grand nombre d'organes divers. Un coup d'œil général jeté sur la disposition des branches permet de les diviser en quatre classes d'après les régions auxquelles elles sont destinées.

Les premières appartiennent aux organes respiratoires et vocaux. Un seul tronc les fournit; c'est la thyroïdienne supérieure. Les plus volumineuses se répandent dans la glande thyroïde et dans les muscles extérieurs qui meuvent soit l'os hyoïde, soit le larynx en totalité. Les plus petites, introduites dans le larynx lui-même se distribuent principalement aux muscles de la glotte et finissent à la membrane muqueuse des voies aériennes.

Une seconde classe de branches appartient essentiellement aux premiers organes de la digestion, et ces branches sont proportionnées pour le nombre comme pour le volume au nombre et à l'épaisseur de ces organes. En devant l'artère linguale fournit des rameaux considérables à l'angle et à tous ses muscles, tandis qu'en arrière la pharyngienne et la palatine inférieure répandent de petits rameaux dans la couche musculeuse mince du pharynx.

La troisième classe de branches est beaucoup plus étendue et plus nombreuse. Elle appartient à la face et se divise assez naturellement en deux ordres, dont l'un comprend les branches distribuées à l'extérieur de la face et fournies principalement par l'artère faciale; l'autre renferme les branches répandues profondément aux cavités intérieures de la face et fournies par la maxillaire interne.

L'artère faciale, source principale des branches superficielles, parcourt un trajet oblique depuis l'intervalle des muscles masseter et triangulaire, endroit de sa réflexion sur la mâchoire, jusque sur les côtés du nez où elle finit. Ses rameaux les plus considérables se dirigent en dedans et se distribuent

avec une sorte de profusion aux muscles des lèvres et du nez. Il semble même qu'il y ait ici une disproportion évidente entre la ténuité des muscles et la grosseur des vaisseaux artériels. Mais lorsqu'on songe que ces muscles sont destinés spécialement à servir à l'expression faciale, que pour remplir ce but ils doivent jouir d'un mouvement très-prompt et très-varié; lorsqu'on sait que le mouvement des organes est pour l'ordinaire en raison directe du degré d'excitation que l'impulsion sanguine leur communique, et que cette impulsion est d'autant plus forte que les vaisseaux sont plus considérables et plus multipliés, on n'est plus étonné de cette disproportion apparente, et on trouve au contraire ici comme par-tout ailleurs un rapport frappant entre l'organisation et la fonction.

Quant aux branches profondes de la face fournies par l'artère maxillaire interne, on voit qu'elles se distribuent surtout, 1°. à l'appareil de la mastication. Ainsi, c'est de la maxillaire interne que naissent constamment et les temporales profondes, et les ptérygoïdiennes, et la masseterine, distribuées aux agens musculaires des grands mouvemens de la mâchoire inférieure. C'est d'elle que viennent l'alvéolaire, la sous-orbitaire, la dentaire inférieure, la palatine supérieure, sources constantes des vaisseaux que reçoivent les dents, les gencives et les os maxillaires eux-mêmes. 2°. A l'organe de l'odorat. La sphéno-palatine, terminaison de la maxillaire interne, est la source des branches les plus nombreuses que reçoit chaque fosse nasale. J'observe cependant que ces derniers vaisseaux distribués surtout

au milieu de la paroi externe des narines n'occupent point la partie la plus importante de l'organe de l'odorat qui est, comme l'on sait, la paroi supérieure.

Ces vaisseaux artériels fournis par la carotide externe, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de la face, se terminent au-dessous de l'orbite, et il n'en part que quelques rameaux anastomotiques pour l'intérieur de cette cavité. Ainsi, la sous-orbitaire, l'alvéolaire et la faciale se réunissent au-dessous de l'ouverture orbitaire antérieure. Un autre tronc artériel fournit les vaisseaux principaux de l'œil et du front.

Enfin, la quatrième classe des branches de la carotide externe appartient aux parois du crâne et à l'organe de l'ouie. Trois vaisseaux considérables en sont la source. Deux se répandent à l'extérieur du crâne : ce sont les artères temporale superficielle et occipitale. Le dernier occupe l'intérieur de cette cavité : c'est la méningée. La temporale distribue ses rameaux les plus volumineux à la partie antérieure et supérieure du crâne; les rameaux de l'occipitale en occupent la partie postérieure et inférieure. Celle-ci donne en outre des vaisseaux assez nombreux aux muscles postérieurs du cou.

La méningée ne naît point immédiatement de la carotide, mais elle est la plus grosse de toutes les branches que fournit la maxillaire interne et peut être comparée par son volume comme par son mode de distribution, à la temporale superficielle. Ses rameaux se terminent à la dure-mère comme ceux de la temporale se terminent à la peau.

Quant aux vaisseaux de l'organe auditif, ils sont

très-petits et peu multipliés. Un seul vient immédiatement de la carotide externe ; c'est l'artère auriculaire postérieure distribuée surtout au pavillon et au conduit auditif. Les autres sont fournis par la temporale comme les rameaux auriculaires antérieurs, ou par la méningée comme la branche tympanique introduite par la fente glénoïdale, et la petite branche qui, dans l'intérieur du crâne, part de la même méningée pour aller au muscle interne du marteau, etc.

Telle est la disposition générale des branches de la carotide externe. Elles communiquent souvent avec la carotide interne en s'unissant aux rameaux de l'ophtalmique. Mais on peut remarquer qu'elles sont entièrement isolées des artères que la carotide interne fournit au cerveau, la dure-mère formant entre les unes et les autres une barrière qui n'est jamais franchie.

§ II. *Artère carotide interne.*

Ecartée de l'externe au niveau du muscle digastrique, elle s'enfonce dans l'espace qui sépare la branche de l'os maxillaire d'avec le pharynx, se dirige en haut et un peu en dedans au-devant de la colonne vertébrale jusqu'à l'orifice inférieur du canal carotidien par lequel elle s'introduit dans le crâne. Accompagnée en dehors par la veine jugulaire interne, voisine en dedans du nerf vague, du ganglion cervical supérieur et de son rameau inférieur, elle est unie à toutes ces parties par un tissu cellulaire lâche et filamenteux. Sa direction est rarement droite ; recourbée d'abord en arrière de manière à présenter sa

convexité à la colonne vertébrale, sa concavité à l'échancrure parotidienne, elle forme près du crâne une seconde courbe dont la convexité est en bas, la concavité en haut, et se rapproche ainsi du canal dans lequel elle doit s'engager. Ces flexuosités, quelquefois assez légères, sont ailleurs tellement prononcées que l'artère devient deux fois transversale avant de reprendre sa direction primitive. Au reste, il n'est peut-être pas deux sujets sur lesquels ces courbures présentent exactement la même disposition.

Engagée ensuite dans le conduit carotidien, l'artère le parcourt en entier en s'accommodant aux différentes directions qu'il présente. Ainsi d'abord verticale, puis un peu oblique en avant et en haut, elle redevient à-peu-près verticale au moment où elle sort du conduit. Dans son intérieur l'artère carotide n'a de rapport qu'avec la portion de dure-mère qui le tapisse, et avec les deux rameaux supérieurs du premier ganglion cervical.

Sortie du canal carotidien, l'artère carotide interne s'engage aussitôt dans l'écartement de la dure-mère qui renferme le sinus caverneux, suit ce sinus horizontalement en avant sur la gouttière de l'os sphénoïde jusqu'au-dessous de l'apophyse clinoïde antérieure. Dans ce trajet elle est séparée du sang du sinus par la membrane veineuse, et ne baigne point dans ce sang comme on le dit ordinairement. Le nerf moteur externe la côtoie et lui est immédiatement appliqué en dehors.

Parvenue sous l'apophyse clinoïde antérieure, l'artère se recourbe fortement en haut, remonte verticalement ou plutôt en formant sur elle-même une légère

courbe dont la convexité est antérieure, dans un petit canal membraneux particulier que lui forme la dure-mère en dedans de l'apophyse, sort enfin de ce canal et pénètre dans le crâne placée en dehors et un peu en arrière du nerf optique.

En entrant dans le crâne elle s'enveloppe d'une gaîne que lui présente l'arachnoïde réfléchie autour d'elle sur la dure-mère, remonte ensuite un peu obliquement en arrière et en dehors jusqu'au niveau de la saillie postérieure du lobe cérébral antérieur et au commencement de la scissure de Sylvius; là elle finit en se divisant.

On voit que l'artère carotide ne parvient au crâne que par un trajet long et compliqué, et après avoir changé très-souvent de direction. Ces courbures multipliées ont donné lieu à quelques assertions physiologiques dont nous parlerons en jetant un coup d'œil général sur les artères du cerveau.

Pour examiner avec ordre les branches que fournit la carotide interne, il faut considérer cette artère dans les diverses parties de son trajet.

I. Depuis son origine jusqu'à son entrée dans le conduit du rocher, la carotide ne donne absolument aucune branche. Dans quelques cas rares elle a fourni la pharyngienne inférieure ou l'occipitale: Haller cite deux exemples semblables.

II. Renfermée dans le conduit carotidien, la carotide donne souvent une petite branche qui pénètre par une ouverture particulière dans la caisse du tympan, se distribue soit à la membrane du tympan, soit au promontoire dans lequel elle s'anastomose avec un rameau de la méningée moyenne.

Quelquefois elle en donne une autre qui, introduite dans le conduit ptérygoïdien par son orifice postérieur, va se réunir à la branche ptérygoïdienne de la maxillaire interne.

III. Dans l'écartement membraneux du sinus caverneux la carotide donne de petites branches ou plutôt des rameaux fort ténus à la dure-mère, à la glande pituitaire. Il en part quelques-uns qui accompagnent dans leur trajet les nerfs moteur externe, moteur commun, trijumeaux.

IV. En remontant en dedans de l'apophyse clinoïde antérieure, la carotide fournit par sa convexité une branche beaucoup plus considérable : c'est l'artère ophtalmique.

Artère ophtalmique.

Elle est moins remarquable par son volume que par la multitude de branches qu'elle fournit soit à l'œil, soit aux organes accessoires de la vision auxquels elle appartient presque entièrement.

Née en devant de la courbure que forme la carotide derrière l'apophyse clinoïde antérieure, l'ophtalmique s'engage aussitôt dans un petit canal membraneux particulier que lui offre la dure-mère, se place en dehors et un peu au - dessous du nerf optique, passe avec lui par le trou optique, et s'introduit dans l'orbite entre le nerf et le muscle abducteur. Presque aussitôt elle remonte sur le nerf optique, le croise obliquement en avant et en dedans, placée entre lui et le muscle élévateur de l'œil, puis devenue interne et un peu supérieure au nerf, elle reprend un direc-

tion horizontale jusqu'à l'angle interne de l'orbite où elle finit par une division en deux branches. Dans cette dernière partie de son trajet l'ophtalmique correspond en haut et en dedans au muscle grand rotateur de l'œil, en dehors et en bas au nerf optique, en bas au muscle adducteur.

Ainsi cette artère côtoie d'abord en dehors le nerf optique, remonte ensuite au-dessus de lui pour le côtoyer enfin en dedans jusqu'à l'endroit où elle se termine. Je répète en abrégé ce rapport essentiel, pace qu'il est le seul qui puisse nous aider à décrire avec quelque méthode les branches nombreuses de l'ophtalmique plongée par-tout au milieu de parties molles.

On peut en effet comprendre toutes ces branches sous trois classes, 1°. celles que donne l'ophtalmique placée en dehors du nerf optique; 2°. celles qu'elle donne au-dessus de ce nerf; 3°. celles qu'elle donne en dedans du même nerf. Cette classification au reste n'ayant pour but que de favoriser l'étude, on ne doit point s'y attacher rigoureusement, car on la trouveroit souvent en défaut, tant les branches offrent de variétés dans leurs origines.

Branches que donne l'Ophtalmique placée en dehors du nerf optique.

On en trouve constamment deux : la lacrymale, et la centrale de la rétine.

Branche lacrymale. C'est une des plus considérables. Née de l'ophtalmique peu après son entrée dans l'orbite, elle suit la paroi externe de cette

cavité jusqu'à la glande lacrymale où elle s'enfonce. Placée dans ce trajet sur le muscle abducteur de l'œil, elle lui envoie dès son origine un grand nombre de rameaux qui le pénètrent du côté correspondant au nerf optique. Quelques-uns de ces rameaux dirigés en bas vont se porter au muscle abaisseur où ils s'anastomosent avec la branche musculaire inférieure. D'autres rameaux ténus remontent en dedans et se jettent dans les deux élévateurs. Quelquefois la lacrymale fournit ici l'ethmoïdale postérieure. Avant d'arriver à la glande elle donne encore quelques rameaux qui descendent perpendiculairement dans le muscle adducteur. Un autre rameau plus considérable se porte en rétrogradant en bas et en dehors sur la paroi orbitaire, et se divise en deux rameaux secondaires dont l'un se perd sur le périoste, l'autre traverse l'os malaire et va dans la fosse temporale s'anastomoser avec un rameau de la temporale profonde antérieure. Parvenue à la glande, la branche lacrymale tantôt la côtoie supérieurement, tantôt en embrasse toute la circonférence par plusieurs rameaux. Elle envoie à cette glande de nombreux ramuscules qui s'y perdent. En même temps elle fournit deux rameaux palpébraux externes distingués en inférieur et supérieur. L'inférieur passe sous la glande, se jette dans le muscle palpébral où il s'anastomose soit avec des rameaux de la temporale superficielle, soit avec la branche palpébrale inférieure de l'ophtalmique avec laquelle il forme une arcade sur le bord inférieur du cartilage tarse correspondant. Le rameau supérieur, moins constant, passe sur la glande et descend obliquement dans le muscle palpé-

bral où il forme sur le cartilage tarse supérieur près de son bord libre une arcade avec la palpébrale supérieure de l'ophtalmique.

Au-delà de la glande les rameaux de la lacrymale deviennent plus flexueux, se divisent et se perdent dans l'épaisseur des paupières en ramuscules multipliés et plus ou moins ténus.

Quelquefois la lacrymale naît de la branche méningée. Elle donne alors un rameau assez considérable à la dure-mère, puis pénètre dans l'orbite par la fente sphénoïdale et se comporte ensuite comme nous venons de le dire. Au reste cette branche a offert beaucoup d'autres variétés dont le détail seroit aussi long qu'inutile.

Branche centrale de la rétine. Celle-ci, une des plus petites, naît de l'ophtalmique peu après son entrée dans l'orbite; quelquefois c'est une des ciliaires ou des musculaires qui la produit. Elle pénètre le nerf optique, et placée dans son centre l'accompagne jusque dans l'œil où elle pénètre tantôt simple, tantôt divisée en deux ou trois rameaux. Parvenue à la rétine, elle se divise en une foule de rameaux qui se répandent en tout sens sur cette membrane et y forment un réseau dont Ruysch avoit fait une membrane particulière. Ces rameaux occupent la surface interne de la rétine qui les sépare de la choroïde, tandis qu'ils touchent immédiatement le corps vitré. On les suit assez facilement jusqu'au corps ciliaire, mais il est difficile de s'assurer s'ils se prolongent jusqu'à cette portion de la rétine qui, réfléchie derrière les procès ciliaires, va recouvrir la surface antérieure du cristallin. Eustache, Zinn, Hebenstreit

prétendent les avoir suivis jusque là. Haller n'a pu y parvenir.

Albinus, dit-on, a fait voir un rameau qui, parti de la centrale, traversoit le corps vitré à son centre, fournissoit des ramuscules à la membrane hyaloïde et venoit se terminer à la partie postérieure de la capsule cristalline. D'autres auteurs, Ruysch en particulier, disent avoir vu des ramuscules artériels distribués au cristallin, mais disposés différemment. Il est extrêmement difficile de reconnoître la vérité de ces assertions, vu l'excessive ténuité de ces vaisseaux qui exigeroit des injections très-délicates et une dissection fort laborieuse.

On trouve quelquefois, outre la branche centrale que nous venons de décrire, plusieurs rameaux pénétrant également le nerf et se distribuant à ses gaînes névrilématiques.

Branches que donne l'Ophtalmique en passant au-dessus du nerf optique.

Ces branches sont : la sus-orbitaire, les ciliaires et les deux musculaires supérieure et inférieure.

Branche sus-orbitaire. Son volume est médiocre. Souvent elle est plus considérable à l'endroit où elle sort de l'orbite qu'elle ne l'étoit à son origine. Née de l'ophtalmique, rarement de la lacrymale, elle remonte en dedans des deux élévateurs, se place entre celui de la paupière et le périoste de l'orbite, à côté et en dedans de la branche frontale du nerf ophtalmique, et se porte parallèlement à cette branche jusqu'à l'ouverture orbitaire antérieure. Les rameaux

tenus qu'elle donne dans ce trajet se distribuent au périoste et aux élévateurs. Près de l'ouverture orbitaire elle se divise en deux rameaux inégaux. Le plus considérable tantôt sort par le trou orbitaire supérieur, tantôt se reflechit sur un autre point de l'arcade. Il donne des ramuscules qui se plongent par plusieurs petits trous dans la substance diploïque du coronal, remonte ensuite sur le front et se divise aussitôt en un nombre indéterminé de rameaux assez considérables qui se répandent en divergeant dans les muscles palpébral, frontal et sourcilier, en s'anastomosant avec les rameaux de la branche frontale et de l'artère temporale superficielle. L'autre rameau sort de l'orbite un peu plus en dehors, remonte au-dessous des muscles palpébral et sourcilier dans lesquels il se perd en s'anastomosant, soit avec la temporale, soit avec les rameaux par lesquels la lacrymale se termine.

Branches ciliaires. Leur nombre varie depuis celui de deux qui est le plus petit jusqu'à celui de six qui est le plus grand. Presque toutes viennent de l'ophtalmique; quelques-unes sont fournies par les branches musculaire inférieure, sus-orbitaire, ethmoïdale postérieure, lacrymale. Rapprochées du nerf optique, les unes l'environnent immédiatement, les autres en sont éloignees de quelques lignes. Toutes sont extrêmement flexueuses et surpassent par conséquent de beaucoup le nerf optique en longueur.

Parvenues à la sclérotique, quelques-unes des ciliaires fournissent des rameaux qui, anastomosés entre eux, forment autour du nerf, à l'endroit de son

insertion un petit cercle artériel augmenté quelquefois par des ramuscules que les autres branches de l'ophtalmique envoient au même nerf.

Ensuite chaque ciliaire se divise en plusieurs branches secondaires, de manière que le nombre total de ces divisions est de quinze, vingt ou trente. Ces branches pénètrent isolément la sclérotique, et c'est dans cet endroit qu'on les distingue en ciliaires postérieures et ciliaires longues. Souvent cependant les ciliaires longues sont des branches primitives, distinctes des autres dès leur origine, soit par leur volume plus considérable, soit par leur éloignement du nerf optique qu'elles côtoient latéralement.

Les ciliaires longues au nombre de deux pour l'ordinaire, un peu plus volumineuses que les autres, traversent la sclérotique à une ligne au plus de distance du nerf optique, en laissant à cette membrane quelques ramuscules. Ensuite elles se portent horizontalement en avant entre la sclérotique et la choroïde à laquelle elles ne donnent que de forts petits rameaux. Parvenues au corps ciliaire, elles se divisent chacune en deux rameaux qui s'écartent à angle très-obtus, se réunissent à quelques-uns des rameaux ciliaires antérieurs et concourent avec eux à former au-delà du corps ciliaire, sur la grande circonférence de l'iris, un cercle artériel remarquable. De ce cercle naissent des rameaux plus petits qui entrecroisés et réunis forment un peu plus en dedans un second cercle artériel. Celui-ci donne naissance par sa concavité à des ramuscules très-ténus qui se portent sous forme de rayons, quoique légèrement flexueux, sur la partie antérieure de l'iris et con-

vergent jusqu'à la pupille. Là, pour l'ordinaire, ils s'anastomosent entre eux, et forment ainsi un dernier cercle dont l'ouverture pupillaire représente le diamètre. Chez le fœtus, on a vu quelques-uns de ces ramuscules se porter jusque sur la membrane qui ferme alors la pupille.

Il y a donc trois cercles artériels formés par les ciliaires longues. Deux, rapprochés l'un de l'autre, occupent la grande circonférence de l'iris près du corps ciliaire; le dernier beaucoup plus petit occupe la petite circonférence, et communique avec les précédens par des ramuscules radies placés au-devant de l'iris. Ce dernier cercle a été pris par quelques anatomistes pour un muscle orbiculaire destiné à resserrer la pupille.

Les ciliaires postérieures plus nombreuses, traversent la sclérotique tout près de l'entrée du nerf optique, laissent à cette membrane quelques ramuscules, et se portent entre elle et la choroïde, en se divisant en un grand nombre de rameaux qui s'écartent à angles fort aigus et se portent ensuite presque parallèlement en devant. Placées d'abord sur la face convexe de la choroïde, elles se rapprochent insensiblement de sa face concave à mesure qu'elles avancent et y forment un réseau très fin composé d'aréoles quadrangulaires, dense en arrière, plus rare en devant. Quelques-uns de ces rameaux s'anastomosent avec les ciliaires antérieurs, d'autres traversent le corps ciliaire et se jettent dans le grand cercle artériel de l'iris; mais presque tous gagnent les procès ciliaires, et s'y distribuent en si grand nombre que, selon Zinn, chacun de ces replis reçoit trente ramus-

cules artériels. Ces ramuscules se réunissent progressivement en rameaux plus volumineux, qui vers l'extrémité des procès ciliaires se recourbent tout-à-coup et s'anastomosent ensemble.

A ces deux ordres il faut ajouter les rameaux *ciliaires antérieurs* dont je place ici la description pour réunir sous un même point de vue tout le système artériel de l'intérieur de l'œil. Ceux ci naissent des branches musculaires que fournissent soit l'ophtalmique elle-même, soit ses principales divisions, comme la sus-orbitaire, la lacrymale, etc. Chacune de ces branches musculaires parvenue près de la sclérotique donne trois ou quatre rameaux ténus qui traversent cette membrane à une ligne environ de son union à la cornée. Leur nombre total incertain a paru varier ordinairement de six à douze. Ils traversent le corps ciliaire, et la plupart se jettent dans le grand cercle artériel de l'iris. D'autres s'écartent légèrement entre eux et s'anastomosent avec les rameaux des branches ciliaires longues; d'autres enfin traversent les deux grands cercles artériels et vont directement à l'iris.

Branche musculaire supérieure. Elle n'existe pas toujours. Née de l'ophtalmique au-dessus du nerf optique, elle se porte aussitôt à la partie inférieure de l'élévateur de l'œil, se divise en plusieurs rameaux qui pénètrent ce muscle ainsi que l'élévateur de la paupière, et s'étendent jusqu'au grand rotateur de l'œil.

Lorsque cette branche manque, ce qui arrive très-souvent, elle est suppléée par des rameaux de la lacrymale, de la sus-orbitaire et des ciliaires.

Branche musculaire inférieure. Elle est plus constante et plus volumineuse. Née de l'ophtalmique, tantôt près de son entrée dans l'orbite, tantôt entre les ciliaires, elle se comporte ensuite de diverses manières. Chez les uns, elle gagne le muscle adducteur qu'elle accompagne jusqu'à l'ouverture orbitaire antérieure pour se terminer en s'anastomosant par arcade avec la branche sous-orbitaire de la maxillaire interne. Elle donne alors de nombreux rameaux à l'abaisseur et quelquefois un rameau considérable à l'abducteur. Ailleurs elle accompagne le muscle abaisseur et finit par deux ou trois rameaux dont l'un se distribue au petit rotateur, l'autre au sac lacrymal, et le dernier s'unit à la sous-orbitaire. Ailleurs elle se divise dès son origine en deux rameaux dont l'un se jette dans le muscle abducteur, l'autre suit l'adducteur en donnant des ramuscules à l'abaisseur, et finit sur le sac lacrymal qu'elle suit jusque dans les fosses nasales. Toujours elle fournit des rameaux à l'abaisseur, au petit rotateur, au sac lacrymal, et communique avec la sous-orbitaire ; quelquefois elle produit une ciliaire.

Branches que donne l'ophtalmique placée en dedans du nerf optique.

Ce sont les deux ethmoïdales et les deux palpébrales.

Branche ethmoïdale postérieure. C'est la moins considérable et la moins constante, le trou orbitaire interne postérieur lui-même n'existant pas toujours. Presque par-tout c'est l'ophtalmique qui la fournit

soit après les ciliaires, soit à peu de distance de l'ethmoïdale antérieure. Dirigée vers la paroi interne de l'orbite entre le grand rotateur et l'adducteur de l'œil, elle s'engage bientôt par le trou orbitaire interne postérieur dans un petit conduit osseux de l'ethmoïde qui la transmet dans le crâne. En parcourant ce conduit elle donne aux cellules ethmoïdales postérieures des rameaux nombreux et ténus distribués à la membrane muqueuse qui les revêt. Parvenue dans le crâne l'ethmoïdale postérieure se distribue par plusieurs rameaux à la dure-mère qui tapisse la fosse moyenne antérieure de la base du crâne en s'anastomosant avec des rameaux de l'ethmoïdale antérieure avec lesquels elle s'introduit dans les fosses nasales par les trous de la lame criblée.

Branche ethmoïdale antérieure. Elle naît constamment de l'ophtalmique vis-à-vis le trou orbitaire interne antérieur dans lequel elle s'introduit avec le filet ethmoïdal de la branche nasale du nerf ophtalmique. Elle parcourt le conduit osseux que ce trou commence, en donnant des rameaux aux cellules ethmoïdales antérieures et au sinus frontal, et parvient enfin dans le crâne où elle se trouve sur les gouttières ethmoïdales. Là elle se divise en un grand nombre de rameaux dont quelques-uns se répandent sur la dure-mère et principalement sur la faux ; la plupart rentrent dans les fosses nasales par les trous de la lame criblée et se distribuent à la membrane pituitaire.

Branche palpébrale inférieure. Elle naît de l'ophtalmique au-dessous ou même au-delà de l'anneau cartilagineux du grand rotateur de l'œil ; quelquefois

elle vient de la branche nasale. Dirigée perpendiculairement en bas derrière le tendon direct du palpébral, elle côtoie le sac lacrymal auquel elle donne des rameaux ainsi qu'à la caroncule. Au-dessous du tendon elle se divise en deux rameaux. L'un descend dans la portion du muscle palpebral qui recouvre la base orbitaire, suit en dehors la direction de ses fibres dans lesquelles il se perd en s'anastomosant avec des rameaux de la branche sous-orbitaire. L'autre suit horizontalement le bord adhérent du fibro cartilage tarse inférieur en se distribuant soit à ce fibro-cartilage, soit aux fibres moyennes du muscle palpébral.

Branche palpébrale supérieure. Elle naît de l'ophtalmique à côté et un peu en avant de la précedente, au niveau du tendon direct du palpébral, donne d'abord un rameau à la portion de ce muscle qui recouvre l'arcade orbitaire et un autre à la caroncule lacrymale, puis s'enfonce horizontalement entre les fibres du palpébral et se divise bientôt en deux rameaux. L'un côtoie en devant le fibro-cartilage tarse supérieur près de son bord libre, immédiatement au-dessus des cils; l'autre plus ténu contourne le bord adhérent et convexe du même fibro-cartilage. L'un et l'autre se distribuent au muscle, au fibro-cartilage et à la peau.

Les deux palpébrales s'anastomosent vers la commissure externe des paupières avec les rameaux palpébraux fournis par la lacrymale.

Branches de terminaison de l'ophtalmique.

Parvenue à l'angle interne de l'orbite, l'artère ophtalmique après avoir fourni les palpébrales se divise en branches nasale et frontale.

Branche nasale. Elle est ordinairement la plus volumineuse. Sortie de l'orbite au-dessus du tendon direct du palpébral, elle donne au sac lacrymal des rameaux qui s'unissent à ceux de la sous-orbitaire, en fournit ensuite un autre qui descend sur l'élévateur commun de l'aile du nez et de la lèvre pour s'anastomoser avec la faciale. Ensuite elle se porte obliquement sur le côté du nez, s'y divise en un grand nombre de rameaux distribués aux muscles de cette région, à la peau, etc. et anastomosés avec les rameaux dorsaux de l'artère faciale à laquelle la nasale se réunit souvent elle-même toute entière.

Branche frontale. Elle s'écarte un peu en dehors, se réfléchit sur l'arcade orbitaire et remonte sur le front entre l'os et le muscle palpébral. Aussitôt elle se divise en un grand nombre de rameaux qui pénètrent le muscle frontal, deviennent sous-cutanés, se répandent sur le front dans toute sorte de directions en se distribuant au palpébral, au frontal, au sourcilier, et s'anastomosent soit avec la frontale opposée, soit avec la temporale superficielle.

V. Dans le crâne la carotide interne ne fournit avant de se terminer que deux branches postérieures nommées *communiquante* et *choroïdienne*.

Branche communiquante. Née de la carotide elle se dirige obliquement en arrière et un peu en dedans

au-dessus de l'arachnoïde, entre la saillie interne du lobe cérébral moyen et la tige pituitaire, pour se jeter enfin près des éminences mamillaires dans l'artère cérébrale postérieure fournie par le tronc basilaire.

En général le volume de cette branche est médiocre. Il varie cependant, et il n'est point rare de la trouver sur le même sujet plus grosse d'un côté que de l'autre.

Dans son trajet elle donne plusieurs rameaux très-petits qui se distribuent soit aux couches optiques et au nerf du même nom, soit aux éminences mamillaires et à cette portion de substance grisâtre qui termine en haut la tige pituitaire et ferme antérieurement le troisième ventricule. Souvent un rameau plus considérable fourni par la même branche s'enfonce verticalement dans la couche optique et s'y divise en ramuscules ténus qui se perdent dans la substance médullaire.

Branche choroïdienne. Elle naît au-dessus de la précédente à laquelle elle est toujours fort inférieure en volume. Dirigée obliquement en arrière et en dehors, elle passe au côté externe du prolongement antérieur de la protubérance cérébrale, pénètre dans le ventricule latéral par la scissure qui le termine en bas et rencontre aussitôt le repli de la toile choroïdienne dans lequel elle se perd en se subdivisant.

Dans son trajet elle donne un grand nombre de rameaux ténus qui pénètrent tous la couche optique et s'y distribuent.

Après avoir fourni ces deux branches, la caro-

tide interne se termine par les artères cérébrales antérieure et moyenne.

Artère cérébrale antérieure.

Née de la carotide, elle se dirige obliquement en dedans et en avant entre le nerf optique et la saillie postérieure du lobe cérébral antérieur jusqu'à la scissure qui sépare ce lobe de son semblable. Rapprochée en cet endroit de l'artère cérébrale opposée, elle communique avec elle par une branche transversale extrêmement courte, ordinairement assez grosse, nommée *communiquante antérieure*, remplacée quelquefois, mais fort rarement par plusieurs rameaux isolés. Cette branche fournit pour l'ordinaire un ou plusieurs rameaux qui remontent verticalement pour se distribuer à la voûte à trois piliers, à la commissure antérieure et à la cloison des ventricules; quelquefois ces rameaux viennent des cérébrales antérieures elle-mêmes. Ensuite la cérébrale change de direction, se recourbe en devant et s'enfonce parallèlement à sa semblable entre les deux lobes antérieurs, appliquée immédiatement sur la surface inférieure du corps calleux. Recourbée de nouveau sur le bord antérieur de ce corps, elle en suit horizontalement la face supérieure jusqu'au bord postérieur près duquel elle finit par une foule de subdivisions.

Ainsi la cérébrale présente d'abord une direction horizontale oblique dans une petite partie de son trajet, puis forme une grande arcade autour du corps calleux qu'elle embrasse en entier, arcade

dont ce corps calleux représente exactement la forme.

Depuis son origine jusqu'à sa première courbure la cérébrale antérieure ne fournit que de petits rameaux qui se répandent soit en arrière aux nerfs optiques, soit en devant au lobe antérieur du cerveau et spécialement au nerf olfactif.

Mais depuis sa première courbure jusqu'à sa terminaison, c'est-à-dire dans toute l'étendue de l'arcade dont nous venons de parler, la cérébrale donne un grand nombre de branches qui naissent soit de sa concavité, soit de sa convexité.

Les branches qui naissent de la concavité sont très-petites, pénètrent en tout sens le corps calleux et s'y distribuent.

Celles de la convexité sont beaucoup plus nombreuses et plus grosses. Toutes se portent sur la face plane de l'hémisphère cérébral, logées dans les anfractuosités où elles se ramifient pour se réfléchir ensuite soit en haut, soit en bas, sur la surface extérieure du même hémisphère et s'anastomoser avec les branches des artères cérébrales moyenne et postérieure. C'est à la partie supérieure du corps calleux que ces branches naissent en plus grande quantité.

Artère cérébrale moyenne.

Elle est plus volumineuse que la précédente, et paroît assez naturellement former la continuation de la carotide légèrement inclinée en dehors. Née au commencement de la scissure de Sylvius, elle s'y engage aussitôt en fournissant un grand nombre de petites

branches qui se répandent sur la partie inférieure des lobes antérieur et moyen. Assez souvent elle donne une seconde choroïdienne distribuée comme celle que nous avons décrite. Peu après elle se divise en deux grosses branches qui appartiennent, l'une au lobe antérieur, l'autre au moyen. Toutes deux se recourbent en arrière en suivant profondément la scissure où elles se trouvent et finissent vers la partie postérieure du cerveau en se subdivisant en un grand nombre de branches secondaires. Ces branches se ramifient en formant beaucoup de flexuosités sur les lobes correspondans, et arrivent enfin sur la surface convexe de l'organe où elles s'anastomosent avec les cérébrales antérieure et postérieure.

Quoique ces branches paroissent cachées profondément dans le cerveau, il est facile de reconnoître qu'elles ne sont point plongées dans sa substance, et que, toujours placées à sa surface extérieure, elles occupent seulement des anfractuosités plus ou moins profondes. Leurs rameaux les plus ténus subdivisés dans la pie-mère donnent enfin des ramuscules capillaires à la substance propre du cerveau. Presque par-tout ce sont les seuls que cette substance reçoive; il y a cependant quelques exceptions à ce principe qu'on a un peu trop généralisé. Ainsi on trouve dans l'intérieur même des couches optiques et au milieu de la substance médullaire des rameaux assez volumineux fournis soit par la branche communiquante postérieure, soit par la choroïdienne, etc.

Remarques sur la distribution de la Carotide interne.

La carotide interne appartient essentiellement, 1°. à l'organe cérébral; 2°. aux organes de la vision et à la région frontale de la face; 3°. à l'organe de l'odorat. Son calibre est en rapport direct avec le volume du cerveau, c'est pour lui qu'elle réserve ses principales branches. Hors du crâne elle n'en fournit aucune, excepté certains cas fort rares où on l'a vue donner naissance à la pharyngienne et d'autres fois à l'occipitale. En traversant la base du crâne elle laisse echapper quelques rameaux, mais tous sont extrêmement ténus, et l'artère ophtalmique elle-même est dans une disproportion extrême de calibre avec le vaisseau considérable d'où elle tire son origine.

Ce seroit ici le lieu de développer davantage ce rapport intéressant de l'artère carotide interne avec le cerveau, en examinant l'ensemble des branches qui la terminent. Mais cette artere n'est point la seule source d'où la masse encéphalique reçoive ses vaisseaux; les artères vertébrales concourent aussi à les lui fournir. Nous ne parlerons donc du système artériel cérébral qu'après avoir étudié les vertébrales, et pour le moment nous nous bornerons à dire un mot de la distribution de l'artère ophtalmique.

En observant collectivement les rameaux de cette artère, on voit que les plus considérables et les plus nombreux appartiennent aux organes accessoires de

la vision. Les uns vont aux muscles qui meuvent l'œil, les autres aux voiles mobiles qui le recouvrent antérieurement, d'autres à l'appareil lacrymal. Les branches ciliaires et la centrale de la retine sont les seules qui appartiennent au globe de l'œil lui-même. Les premières très-multipliées se distribuent presque toutes à la choroïde, à l'iris, et aux procès ciliaires; tandis que la seconde extrêmement ténue se perd entièrement dans le nerf optique et sur la rétine. On n'est point assuré que des vaisseaux artériels se répandent sur le corps vitré et sur le cristallin.

C'est aussi de l'ophtalmique que naissent les ethmoïdales destinées à l'organe de l'odorat. L'une et l'autre appartiennent à cet organe soit par les rameaux qu'elles donnent près de leur origine aux cellules de l'ethmoïde, soit par leur terminaison à la paroi supérieure des fosses nasales où elles se trouvent rapprochées des nerfs olfactifs.

Enfin c'est de l'opthalmique que viennent les rameaux nombreux qui recouvrent le front et qui portent aux muscles de cette région l'excitation vive dont ils ont besoin pour concourir par leurs mouvemens rapides et multipliés à l'expression générale de la face.

ARTICLE DEUXIÈME.

Artères des membres supérieurs.

Un seul tronc artériel appartient à la partie inférieure du cou et à tout le membre supérieur. Né de l'aorte il se prolonge sans se diviser jusqu'à la partie inférieure du bras ; mais dans ce trajet il fournit un très grand nombre de branches diverses. La nécessité d'étudier toutes ces branches en particulier a obligé de diviser le tronc lui-même en diverses portions, et la crainte de jeter de la confusion dans les détails a engagé à considérer ces portions comme autant d'artères isolées et naissant les unes des autres. Ainsi la même artère a reçu successivement, selon les regions où elle se trouve, les noms de *sous-clavière*, d'*axillaire* et de *brachiale*. Nous suivrons cet usage par les mêmes motifs qui l'ont fait adopter, et nous considérerons sous trois paragraphes les trois portions de cette artère unique.

§ I. *Artère sous-clavière.*

Les deux artères sous-clavières offrent entre elles à leur origine quelques différences essentielles à remarquer.

La droite naît de l'artère innominée parvenue sur le côté de la trachée. La gauche naît immédiatement de la courbure aortique près de sa fin. L'une et l'autre diffèrent dès-lors en position, en longueur, en direction, en rapports.

1°. En position. La sous-clavière droite, simple continuation d'un tronc qui depuis l'aorte a parcouru déjà un certain trajet, est la plus superficielle, la portion de courbure aortique d'où ce tronc naissoit étant d'ailleurs la plus antérieure.

La sous-clavière gauche, tronc primitif né de l'aorte, est profondément cachée, d'autant plus que la portion de courbure aortique d'où elle part est la plus reculée.

2°. En longueur. La droite est plus courte que la gauche de toute l'étendue de l'artère innominée.

3°. En direction. La droite se porte obliquement en dehors et en haut jusque dans l'intervalle des muscles scalènes. La gauche remonte verticalement jusqu'auprès de ces muscles, et se recourbe tout-à-coup en dehors pour s'introduire entre eux.

4°. En rapports. La droite légèrement recouverte d'abord par la clavicule, par le muscle sterno-thyroïdien et par la veine sous-clavière droite est ensuite croisée dans sa direction par le nerf vague. En arrière un espace assez marqué la sépare de la colonne vertébrale et du muscle long du cou auxquels elle répond. En dedans un espace triangulaire la sépare de la carotide primitive. En dehors elle avoisine le sommet du poumon.

La sous-clavière gauche est recouverte en devant dans son origine par le poumon, puis par la veine sous-clavière gauche, puis par le nerf vague qui se trouve dans sa direction au lieu de la croiser. Elle répond d'une manière éloignée à la première côte, à la clavicule, et enfin au muscle sterno-thyroïdien dont elle se trouve séparée par un intervalle assez

sensible. En arrière elle est immédiatement appliquée sur la colonne vertébrale et sur le muscle long du cou. En dedans elle côtoie parallèlement la carotide primitive. En dehors elle répond immédiatement en grande partie au poumon gauche.

Parvenues auprès des scalènes les sous-clavières présentent absolument la même disposition. L'une et l'autre prennent tout-à-coup une direction transversale pour s'engager entre ces muscles où elles changent leur nom en celui d'*axillaire*. Immédiatement avant de s'engager ainsi, la sous-clavière donne un grand nombre de branches qu'on distingue en supérieures, inférieures et externes.

Branches supérieures.

Ce sont les artères vertébrale et thyroïdienne inférieure.

1°. *Artère vertébrale.*

C'est la plus volumineuse de toutes; on peut même la comparer en quelque sorte à son origine avec l'axillaire, et considérer ces deux troncs comme les divisions presque égales de la sous-clavière. Elle naît profondément dans l'endroit où la sous-clavière change de direction, et forme avec elle un angle très-obtus du côté droit, tandis que du côté gauche elle se trouve dirigée dans le même sens et semble la continuer en haut. Placée sur la colonne vertébrale et plus immédiatement sur le muscle long du cou, à côté du scalène antérieur, elle remonte verticalement de l'un et l'autre côté, cachée en devant par la

thyroïdienne inférieure et après un fort court trajet s'engage dans le trou qui se remarque à la base de l'apophyse transverse de la sixième vertèbre cervicale, quelquefois, mais rarement, dans un trou semblable de la septième. Chez certains sujets on la voit parcourir un trajet beaucoup plus long au-devant de la colonne vertébrale et ne s'engager dans son canal propre qu'au niveau de la troisième ou quatrième vertèbre. Elle suit dès-lors en gardant la même direction le canal qui résulte de tous les trous des apophyses transverses cervicales et qui se trouve complété par les muscles intertransversaires, jusqu'à la seconde vertèbre. Là elle sort par le trou de cette vertèbre, se porte en arrière, profondément cachée sous le muscle petit complexus, et forme entre la seconde et la première vertèbre une courbe verticale dont la convexité est en arrière, la concavité en devant. Puis elle s'engage au-dessous du muscle grand oblique de la tête dans le trou de l'apophyse transverse de l'atlas, et après l'avoir traversé se dirige en dedans en formant entre l'atlas et l'occipital, dans l'espace triangulaire des muscles droits et obliques, une courbe transversale dont la convexité postérieure est recouverte par le grand complexus et un peu par le grand droit, tandis que la concavité antérieure embrasse la portion latérale du ligament occipito-atloïdien postérieur. Enfin elle s'enfonce sous les muscles droits, traverse la dure-mère à côté du tubercule de l'atlas et s'introduit dans le crâne par le trou occipital. Placée alors sur la partie latérale de la moelle, elle se rapproche toujours en remontant, de sa partie antérieure qu'elle occupe au

niveau des éminences pyramidales et olivaires. Vers la rainure qui sépare la moelle de la protubérance cérébrale, l'artère vertébrale se termine enfin en se réunissant à la vertébrale opposée, et de cette anastomose unique dans l'économie entre deux gros troncs artériels, résulte l'artère basilaire.

Ainsi l'artère vertébrale protégée dans la plus grande partie de son trajet par le canal osseux dans lequel elle est renfermée, accommodée en haut par ses deux grandes flexuosités à la disposition des deux premières vertèbres entre elles, aboutit enfin dans le crâne et finit au cerveau auquel elle étoit spécialement destinée.

Dans le petit espace que l'artère vertébrale parcourt depuis son origine jusqu'à son introduction dans le canal des apophyses transverses, elle ne fournit pour l'ordinaire aucune branche. Pour examiner avec ordre celles qui en partent ensuite, il faut considérer l'artère, 1°. dans le canal des vertèbres, 2°. dans les deux courbures qu'elle forme avant d'entrer dans le crâne, 3°. enfin dans le crâne.

1°. Dans le canal des vertèbres, l'artère fournit beaucoup de petites branches en tous sens. Les externes, antérieures et postérieures vont aux muscles intertransversaires, les traversent même pour se rendre en devant aux scalènes et grand droit antérieur, en arrière aux petits complexus et splénius. Les internes pénètrent dans le canal vertébral par les trous de conjugaison, se répandent sur la moelle et sur la dure mère en s'anastomosant avec celles du côté opposé. Aucune n'est remarquable.

2°. Dans sa courbure verticale l'artère vertébrale

donne une petite branche qui se dirige en dedans au-dessous du muscle grand oblique de la tête, et se divise en deux rameaux dont l'un descend en arrière, se perd dans les faisceaux du transversaire épineux, tandis que l'autre remonte sous l'arc postérieur de l'atlas et se porte à la dure-mère. Plusieurs autres petites branches nées au même endroit se perdent dans les muscles grand oblique et petit complexus.

La courbure transversale de la vertébrale donne un assez grand nombre de petites branches aux muscles qui constituent par leur disposition l'espace triangulaire dans lequel elle se trouve. On doit en remarquer une plus considérable que les autres qui se dirige transversalement en dedans et se divise bientôt en deux rameaux. L'un se porte dans la direction de la branche entre le muscle grand complexus et le grand droit postérieur sur lequel il forme une espèce d'arcade en s'anastomosant avec celui de la vertébrale opposée. L'autre plus volumineux descend obliquement sur le muscle grand droit, s'y distribue ainsi qu'au petit droit et s'y perd.

3°. Mais les branches les plus remarquables et les plus importantes sont celles que fournit la vertébrale depuis son entrée dans le crâne jusqu'à sa terminaison. Ces branches sont la spinale postérieure, la spinale antérieure et la cérébelleuse inférieure.

Branche spinale postérieure. Elle naît de la vertébrale placée sur le côté de la moelle, quelquefois de la cérébelleuse inférieure, descend un peu obliquement en dedans et se place à la partie postérieure de la moelle sur laquelle elle descend, parallèle à la spinale postérieure opposée, jusqu'à la seconde vertèbre

des lombes où la moelle finit. Sa ténuité est égale à sa longueur. Dans son trajet elle donne des rameaux transverses dont les uns internes s'anastomosent avec la spinale opposée; les autres externes se distribuent sur le névrilème de la moelle pour donner leurs ramuscules capillaires à la substance médullaire elle-même.

Branche spinale antérieure. Elle naît en dedans de la vertébrale un peu avant sa terminaison; quelquefois la cérébelleuse inférieure ou même l'artère basilaire lui donnent naissance. Analogue à la précédente, quoiqu'un peu plus volumineuse, elle descend flexueuse sur la partie antérieure de la moelle à laquelle elle fournit plusieurs rameaux. Vers le trou occipital elle se réunit à celle du côté opposé, et la branche unique qui en résulte continue le même trajet jusqu'à la partie inférieure de la moelle en lui donnant ses rameaux de la même manière que la spinale postérieure.

Branche cérébelleuse inférieure. Elle naît en dehors de la vertébrale dans l'endroit où cette artère se rapproche de la partie antérieure de la moelle, par conséquent entre les origines des deux spinales; quelquefois c'est la basilaire qui la donne. Son volume est assez considérable, quoique assez sujet à varier. Dirigée transversalement en dehors sur l'éminence pyramidale qu'elle croise, elle gagne l'enfoncement qui sépare la moelle du lobe du cervelet, se recourbe fortement en bas, descend en contournant la moelle en arrière, et parvenue près de l'endroit où les deux lobes se rapprochent, elle se divise en trois ou quatre rameaux qui se répandent sur

la surface inférieure du lobe correspondant jusqu'à sa circonférence où ils s'anastomosent avec ceux de la cérébelleuse supérieure. Quelques-uns s'enfoncent dans les anfractuosités : le plus grand nombre se divise à la surface. Leurs ramuscules forment sur la pie-mère un réseau très-fin auquel succèdent les rameaux capillaires qui pénètrent dans la substance propre du cervelet.

Artère basilaire, réunion des deux Vertébrales.

Elle commence en arrière vers la rainure qui sépare la moelle d'avec la protubérance cérébrale, finit en devant dans l'intervalle qui sépare les prolongemens antérieurs de cette protubérance. Ainsi elle correspond en haut dans toute son étendue à la protubérance qui lui offre une gouttière très-marquée, tandis qu'en bas elle appuie sur la gouttière basilaire dont la sépare seulement la membrane arachnoïde.

Son volume, quoique considérable, est manifestement inférieur à celui des deux vertébrales réunies, exemple sensible qui confirme l'assertion fort connue sur le rapport des rameaux avec les troncs.

La basilaire fournit dans son court trajet un grand nombre de rameaux latéraux fort disproportionnés à elle pour le volume ; ils se répandent plus ou moins loin sur la protubérance en formant quelques flexuosités, puis pénètrent la substance de ce corps. Quelques-uns s'étendent jusqu'au cervelet. Les seules branches volumineuses qu'elle donne sont les cérébelleuses supérieures.

Branche cérébelleuse supérieure. Elle naît de la

basilaire un peu avant sa terminaison, se dirige transversalement en dehors sur la protubérance et sur son prolongement antérieur qu'elle contourne en arrière en s'engageant sous la tente du cervelet, jusqu'au niveau des tubercules quadrijumeaux. Là elle se divise en un grand nombre de rameaux plus ou moins considérables dont les uns remontent en formant beaucoup de flexuosités sur le lobe postérieur du cerveau et s'anastomosent avec ceux de l'artère cérébrale postérieure, tandis que les autres descendent suivant différentes directions sur la face supérieure du cervelet, s'y ramifient et s'y distribuent à la manière ordinaire.

C'est cette branche qui fournit principalement des rameaux aux parties qui constituent l'aqueduc de Sylvius et le quatrième ventricule.

L'artère basilaire se termine par deux branches qui sont les artères cérébrales postérieures.

Artère cérébrale postérieure.

Née au dessous de la branche cérébelleuse supérieure qu'elle surpasse de beaucoup en volume, elle se contourne parallèlement à elle sur le prolongement antérieur de la protubérance, mais s'en sépare en arrière où elle demeure au-dessus de la tente du cervelet, et se porte à la partie inférieure du lobe cérébral postérieur.

L'intervalle étroit qui sépare cette artère dans la première partie de son trajet, d'avec la branche cérébelleuse, contient l'origine du nerf moteur commun placé ainsi entre deux troncs artériels assez volumi-

neux. Par sa convexité l'artère cérébrale reçoit dans le même endroit la branche communiquante postérieure fournie par la carotide. Sa convexité donne des rameaux assez nombreux à la protubérance, à ses prolongemens, aux tubercules mamillaires, etc. Un d'entre eux pénètre le troisième ventricule, et se distribue principalement à la couche optique et à la voûte à trois piliers.

Parvenue sur le lobe postérieur, l'artère cérébrale en suit le lobe inférieur et interne en distribuant latéralement soit à la face inférieure, soit à la face interne de nombreux rameaux par lesquels elle finit. Ces rameaux se subdivisent dans la pie-mère en se comportant comme tous ceux que nous avons examinés jusqu'ici. Ils s'anastomosent en une foule d'endroits avec les cérébrales antérieure et moyenne.

Remarques sur la disposition des artères cérébrales.

Quatre troncs fournissent à l'organe cérébral tous les vaisseaux qui lui appartiennent. Deux lui viennent des carotides primitives, et deux des sous-clavières. Les premiers sont volumineux et courts, les seconds un peu moins considérables parcourent un trajet plus long. Du reste les uns et les autres se rapprochent par des caractères communs extrêmement remarquables, soit dans leur trajet hors du crâne, soit dans la manière dont ils se comportent en entrant dans le crâne, soit dans leur distribution à la masse encéphalique.

Dans leur trajet hors du crâne les troncs cérébraux, 1°. sont tous profondément situés, éloignés de

l'extérieur, protégés soit par des organes épais, soit par un canal osseux qui les renferme. Les carotides internes, aussitôt après leur origine s'enfoncent entre la colonne vertébrale et le pharynx. Bientôt les conduits carotidiens, les gouttières du sphénoïde complétées et converties en canaux par des lames épaisses de la dure-mère, offrent à ces deux artères un chemin solide par lequel elles traversent la base du crâne.

Les vertébrales dont le trajet est plus long sont aussi protégées d'une manière encore plus sûre. Engagées dès leur origine dans les trous des apophyses transverses cervicales, elles sont renfermées dans le canal qui résulte de ces trous réunis jusqu'à la partie supérieure du cou, et ne sortent ensuite de ce chemin couvert que pour se trouver garanties par les couches épaisses des muscles complexus, splénius et trapèze. Ce canal de l'artère vertébrale quoique formé par plusieurs portions osseuses isolées offre la même solidité que le conduit carotidien, vu les articulations multipliées qui assujettissent ici les os, tandis que les muscles intertransversaires en remplissent tous les intervalles. Si ce canal est légèrement flexible sur lui-même, comme l'exigeoient les mouvemens de la région à laquelle il appartient, cette flexion également répartie sur tous ses points ne peut jamais diminuer ses diamètres ou retrécir son calibre.

2°. Tant que les troncs cérébraux ne sont point parvenus dans la cavité du crâne, ils ne fournissent que de forts petits rameaux ou au moins des branches fort disproportionnées au volume qu'ils ont eux-mêmes. J'ai fait cette remarque plus haut à l'égard

des artères carotides internes; je l'applique ici aux vertébrales. Renfermées dans les conduits des apophyses elles ne donnent que des ramuscules peu importans, quoique nombreux, soit à la moelle, soit aux muscles vertébraux. Parvenues sous les muscles complexus elles donnent des branches un peu plus remarquables, mais toujours fort disproportionnées avec les troncs eux-mêmes.

En entrant dans le crâne, ou immédiatement avant d'y entrer, les troncs cérébraux forment sur eux-mêmes des courbures plus ou moins nombreuses, plus ou moins marquées, mais dont plusieurs sont constantes. La carotide interne, outre les flexuosités qu'elle présente presque toujours à la partie supérieure du cou, change nécessairement de direction à plusieurs reprises en traversant le canal carotidien et le sinus caverneux. La vertébrale offre entre la seconde et la première vertèbre, puis entre la première et l'occipitale deux courbures que l'on trouve toujours parce qu'elles sont en rapport nécessaire avec la disposition des parties osseuses.

Ce caractère remarqué depuis long-temps par les anatomistes a donné lieu, comme l'on sait, à une assertion physiologique presque unanimement adoptée sur la circulation du sang dans le cerveau. On a dit que ces courbures artérielles avoient l'utilité de diminuer la force de l'impulsion communiquée au sang, impulsion que la substance molle et délicate de l'organe cérébral ne pourroit supporter si cet organe la recevoit en ligne directe.

Mais, comme le remarque Bichat, pour admettre que les flexuosités vasculaires pussent retarder ainsi

le trajet du sang, il faudroit supposer les artères vides à l'instant de la contraction du cœur. On concevroit alors comment le flot du sang poussé par cette contraction et tendant à s'échapper toujours en ligne directe, seroit d'autant plus retardé qu'il heurteroit contre un plus grand nombre de courbures. Si au contraire cette supposition est inadmissible, si, comme on ne peut en douter, le système artériel est constamment plein dans toutes ses parties, le mouvement communiqué à cette masse sanguine continue par chaque contraction du cœur ne pourra être affoibli par de pareilles flexuosités, et sera aussi fort aux extrémités des vaisseaux, quelle que soit leur forme, qu'il l'étoit à leur origine. Le degré d'impulsion que la circulation communique à un organe est donc uniquement en raison de la quantité du sang qui lui est porté, nullement en raison de la direction des vaisseaux qui le lui transmettent (1). Ainsi j'ignore le rapport qui peut exister entre les courbures constantes des artères cérébrales et la circulation du sang dans le cerveau, et j'observe ici la disposition anatomique sans en déduire aucune conséquence.

Parvenus au cerveau les troncs artériels se divisent enfin, et on peut remarquer entre eux une analogie sensible de disposition en devant et en arrière. Les carotides, peu après leur division, communiquent ensemble par une branche courte et volumineuse placée entre les cérébrales antérieures. Les vertébrales communiquent d'une manière plus intime encore en

(1) Voyez l'*Anatomie générale*, tome II, pag. 330 et suiv.

se réunissant en un seul tronc qui ne tarde pas à se diviser lui-même. A ces anastomoses individuelles il faut joindre l'anastomose commune des troncs antérieurs avec les postérieurs par les branches communiquantes postérieures. L'effet de ces réunions vasculaires n'est point, comme on l'a pensé, de ralentir le cours du sang, mais de rendre plus uniforme et plus vive l'impulsion du sang sur le cerveau.

La plus remarquable de ces anatomoses, c'est sans contredit celle des carotides avec les vertébrales. Par elle les deux parties du système artériel cérébral forment un seul tout, et peuvent même se suppléer réciproquement dans certains cas. Ainsi dans les expériences sur les animaux vivans, on a vu quelquefois la vie subsister malgré la ligature des carotides, les vertébrales fournissant alors seules tout le sang du cerveau.

On doit observer ici avec Bichat que toutes les divisions vasculaires principales occupent la base de l'organe cérébral, et se trouvent placées entre lui et des surfaces osseuses, en sorte que le mouvement circulatoire répercuté de toutes parts par ces surfaces, se porte en entier sur la masse encéphalique et y produit une excitation d'autant plus vive ; excitation nécessaire pour que cet organe remplisse ses fonctions, et par conséquent pour que la vie extérieure soit entretenue. Ceux qui voudront approfondir davantage ces belles considérations, les trouveront admirablement développées dans la seconde partie des *Recherches physiologiques sur la vie et la mort.*

2°. *Artère thyroïdienne inférieure.*

Elle est plus superficielle et beaucoup moins volumineuse que la vertébrale. Née de la sous-clavière elle remonte verticalement sur le muscle scalène antérieur jusque vers la cinquième vertèbre cervicale; là se recourbe tout-à-coup en dedans, passe transversalement entre l'artère carotide primitive et la colonne vertébrale, et remonte ensuite flexueuse jusqu'à la glande thyroïde.

Dans ce trajet, la thyroïdienne donne un assez grand nombre de branches. Les unes nées de sa partie interne descendent sur le muscle long du cou auquel elles se distribuent, ou vont à l'œsophage et à la trachée-artère qu'elles accompagnent dans la poitrine pour s'anastomoser avec les bronchiques.

Les autres naissent de sa partie externe. Souvent elle donne la scapulaire postérieure et la scapulaire supérieure. Mais parmi celles qui sont constamment propres à la thyroïdienne, la seule qu'on doive distinguer, c'est la *cervicale ascendante*. Elle remonte sur le scalène antérieur et jusque sur le grand droit antérieur, fournit à ces muscles, au long du cou, au splénius, de nombreux rameaux par lesquels elle se perd et qui s'anastomosent avec ceux de la vertébrale et même de l'occipitale.

Les autres branches externes de la thyroïdienne inférieure sont plus ou moins ténues. Toutes remontent dans l'épaisseur du scalène antérieur et du long du cou auxquels elles se distribuent entièrement.

Parvenue auprès de la glande thyroïde, l'artère se

divise en deux grosses branches qui s'écartant l'une de l'autre, pénètrent la glande sur divers points par sa partie postérieure et s'y subdivisent en s'anastomosant soit avec la thyroïdienne inférieure opposée, soit avec les deux thyroïdiennes supérieures. Quelques-unes de ces branches les plus ténues pénètrent la trachée et vont se répandre sur la membrane muqueuse des voies aériennes.

Branches inférieures.

Ce sont les artères thorachique interne et intercostale supérieure.

1°. *Artère thorachique interne.*

Cette artère plus longue encore que volumineuse naît de la sous-clavière vis-à-vis la thyroïdienne inférieure. On la nomme ordinairement *mammaire interne*. Dirigée obliquement en bas et en dedans, elle s'enfonce dans la poitrine et va se placer sur la paroi antérieure de cette cavité. Elle descend sur les muscles intercostaux et sur les cartilages dont elle croise la direction, voisine des parties latérales du sternum et se rapprochant insensiblement de cet os à mesure qu'elle avance. Enfin vers l'appendice sternale elle se divise en deux branches qui se portent isolément dans les parois de l'abdomen.

Le nerf diaphragmatique croise obliquement l'artère thorachique interne à son origine, se place en dedans d'elle pour s'introduire dans le thorax et s'en écarte tout-à-fait ensuite.

En entrant dans le thorax, la thorachique interne donne un assez grand nombre de branches au thymus, aux muscles sterno-hyoïdien et sterno-thyroïdien, aux glandes lymphatiques. Parmi ces branches, il en est une très-étendue qu'on peut nommer *médiastine antérieure*. Pour l'ordinaire c'est la thorachique interne qui la fournit; quelquefois cependant elle vient ou de la courbure aortique elle-même ou de l'innominée. Cette branche descend dans la partie évasée que présente en haut le médiastin antérieur. Dès son origine elle donne quelques rameaux à la portion du péricarde qui environne l'aorte à sa sortie du cœur. Après quelques lignes de trajet elle se divise en deux branches secondaires. L'une remonte aussitôt à la partie inférieure du cou, couverte par les sterno-thyroïdiens, et se porte à la partie inférieure de la glande thyroïde, dans laquelle elle se subdivise et se perd en s'anastomosant avec les thyroïdiennes inférieures. L'autre branche plus considérable continue à descendre dans le médiastin, et se divise presque aussitôt en deux rameaux qui s'écartent à angle aigu et vont gagner l'une et l'autre plevre. Chacun d'eux descend sur cette portion membraneuse et s'y perd en donnant de nombreux ramuscules au thymus, aux glandes lymphatiques, et au tissu cellulaire graisseux qui contient le médiastin.

Un peu plus bas la thorachique interne fournit une branche plus remarquable nommée *diaphragmatique supérieure*.

Branche diaphragmatique supérieure. Elle est constante, mais d'un volume assez petit pour l'ordinaire. Une fois je l'ai vue aussi volumineuse que la

thorachique elle-même. Née de cette artère au niveau du sternum elle se porte en dedans, en arrière et en bas en suivant exactement le trajet du nerf diaphragmatique et formant plusieurs flexuosités. Placée entre le poumon et le péricarde elle donne à la membrane fibreuse de ce dernier un assez grand nombre de rameaux. Un d'entre eux né de la diaphragmatique près de son origine descend sur la partie latérale du péricarde jusque auprès du diaphragme en donnant de nombreux ramuscules soit au péricarde, soit à la surface interne du poumon. Ensuite il contourne le péricarde en arrière et va se jeter sur l'œsophage auquel il se distribue. Enfin la diaphragmatique supérieure parvenue à la partie moyenne antérieure du diaphragme se divise en plusieurs branches qui pénètrent ce muscle et s'anastomosent avec les diaphragmatiques inférieures fournies par l'aorte.

Dans son trajet derrière les cartilages costaux, la thorachique donne latéralement des branches distinguées en externes et internes.

Branches externes. Leur nombre égale ordinairement celui des espaces intercostaux auxquels correspond la thorachique. Les premières sont fort ténues et courtes, les dernières augmentent en volume et en longueur. Toutes naissent au niveau du bord inférieur des cartilages correspondans, suivent quelque temps ce bord et descendent ensuite sur le muscle intercostal interne dans lequel la plupart se perdent entièrement, tandis que d'autres et surtout les inférieures parcourant un plus long trajet vont s'anastomoser avec les intercostales aortiques voi-

sines, traversent même les muscles intercostaux pour aller sur la partie extérieure du thorax se repandre dans les muscles pectoraux et grand oblique.

Souvent il y a deux branches semblables pour chaque espace intercostal ; l'une suit le bord inférieur d'un cartilage, l'autre le bord supérieur du cartilage qui est au-dessous. Toutes deux finissent ensuite de la même manière.

Branches internes. Elles sont un peu plus volumineuses et pour l'ordinaire en nombre égal aux espaces intercostaux. Aussitôt après leur origine elles fournissent quelques rameaux transverses à la partie postérieure du sternum, puis traversent les muscles intercostaux internes sur les côtés du même os pour se porter sur la partie extérieure du thorax. Recourbées alors légèrement sur elles-mêmes elles suivent quelque temps les espaces où elles se trouvent, entre les muscles grand pectoral, ou grand oblique, ou droit abdominal, et les intercostaux externes, se distribuent enfin à tous ces muscles en s'anastomosant avec les branches thorachiques externes fournies par l'axillaire.

Les branches internes supérieures sont ordinairement plus grosses que les inférieures, ce qui est l'inverse des branches externes.

La dernière des branches internes née au niveau de l'appendice sternale se porte transversalement sur la partie postérieure de cette appendice, s'y ramifie en formant plusieurs flexuosités, et s'y anastomose avec une branche semblable de la thorachique interne opposée. Souvent ensuite elle descend entre la ligne blanche et le péritoine jusqu'auprès de l'ombilic,

s'engage entre les deux feuillets membraneux qui forment le ligament suspensoire du foie, et s'unit avec des rameaux de l'artère hépatique.

Des deux branches par lesquelles finit l'artère thorachique interne au-dessous de l'appendice sternale, l'une externe se porte obliquement en dehors et en bas derrière les derniers cartilages costaux, traverse les insertions du diaphragme auquel elle donne plusieurs rameaux, et se porte dans les muscles transverses et obliques de l'abdomen où elle se perd en rameaux multipliés anastomosés avec ceux des intercostales inférieures, des lombaires et de l'artère circonflexe iliaque. C'est cette branche que Haller nomme *musculo-phrénique*.

L'autre branche, antérieure, suit la direction primitive de la thorachique, descend entre le muscle droit abdominal et les cartilages costaux, puis entre lui et le péritoine en se rapprochant de l'ombilic vers lequel elle se termine en s'anastomosant avec l'artère épigastrique. Ses rameaux nombreux se répandent de tous côtés dans les muscles droits et obliques auxquels ils se distribuent.

2°. *Artère intercostale supérieure.*

Elle varie singulièrement en volume et en longueur; quelquefois elle n'égale pas la grosseur d'une des intercostales aortiques et ne s'étend guère au-delà de la première côte. Elle naît de la partie inférieure et postérieure de la sous-clavière à-peu-près au même endroit que la cervicale profonde, descend au-devant du col de la première côte, tantôt droite,

tantôt formant une ou deux flexuosités, et voisine du ganglion cervical inférieur. Parvenue au premier espace intercostal, elle se recourbe en dehors, suit pendant quelque temps le bord supérieur de la seconde côte au-devant de laquelle elle descend bientôt pour se terminer par deux ou trois branches. Dans ce trajet l'artère intercostale est recouverte en devant par la plèvre.

Au-devant de la première côte l'intercostale donne souvent un rameau assez volumineux qui se dirige sur cet os transversalement et se distribue au muscle scalène antérieur près de son attache.

Dans le premier espace intercostal l'artère donne deux branches, l'une postérieure, l'autre externe. La première fort petite donne quelques ramuscules à la moelle par le trou de conjugaison correspondant, passe ensuite entre les apophyses transverses et va se jeter dans les muscles du dos où elle se perd. La seconde suit le bord inférieur de la première côte et se distribue aux deux muscles intercostaux.

Dans le second espace intercostal, l'artère se termine en donnant également deux branches, l'une postérieure, l'autre externe, distribuées comme les précédentes. Quelquefois l'artère se prolonge jusqu'au troisième espace qu'elle fournit encore de la même manière. Ailleurs elle envoie seulement à cet espace un rameau qui s'y subdivise. Ordinairement c'est par ses rameaux que l'intercostale supérieure finit. D'autres fois elle s'anastomose avec la première intercostale aortique. Une fois j'ai vu cette artère se recourber tout-à-coup dans le second espace et se porter transversalement en dedans jusque sur le côté

correspondant de la colonne vertébrale sur laquelle elle descendoit ensuite obliquement et se perdoit.

Branches externes.

Ce sont les artères scapulaire postérieure, scapulaire supérieure, et cervicale profonde.

1°. *Artère scapulaire postérieure.*

Elle est un peu inférieure en volume à la thoracique interne. Très-souvent elle naît par un tronc commun avec la thyroïdienne inférieure. Dirigée transversalement en dehors elle contourne les muscles scalènes et les nerfs du plexus brachial, placée immédiatement sur eux dans le grand espace triangulaire que forment le sterno-mastoïdien, le trapèze et la clavicule. Bientôt elle se recourbe pour se porter obliquement en arrière et en bas, s'engage sous le trapèze et sous l'angulaire, change encore ici de direction et descend verticalement sous le rhomboïde en côtoyant le bord postérieur de l'omoplate pour se terminer près de son angle par plusieurs rameaux.

Depuis son origine jusqu'à sa première courbure, la scapulaire postérieure fournit plusieurs branches supérieures qui remontent verticalement sur le muscle scalène et s'y perdent. Souvent une d'entre elles plus volumineuse et plus superficielle remonte obliquement en arrière et va se distribuer aux muscles splénius et trapèze. En bas elle n'en donne aucune remarquable si ce n'est lorsque l'artère scapulaire supérieure vient d'elle au lieu de venir immediate-

ment de la sous-clavière, comme il arrive fréquemment.

Parvenue sous l'angulaire, la scapulaire postérieure donne ordinairement en haut une branche assez grosse qui remonte et se perd sur l'angulaire et sur le trapèze. En bas elle en fournit d'autres plus ou moins considérables qui descendent en dehors sous le trapèze jusqu'au sus-épineux, et se distribuent à l'un et à l'autre en s'anastomosant avec plusieurs branches de la scapulaire supérieure.

Enfin sous le muscle rhomboïde la scapulaire postérieure se divise souvent en deux branches égales dont l'une suit, le long du bord de l'omoplate, le trajet vertical que nous avons indiqué tout-à-l'heure, et finit près de l'angle inférieur de l'os en donnant ses rameaux au rhomboïde et au grand dorsal, tandis que l'autre dirigée obliquement en dehors sous l'omoplate va se distribuer aux muscles grand dentelé et sous-scapulaire. La branche verticale est constante et termine l'artère; la branche oblique est suppléée quelquefois par plusieurs branches transversales.

Il n'est pas très-rare de voir la scapulaire postérieure naître de l'axillaire. Elle passe alors entre les nerfs brachiaux, contourne les scalènes à leur attache inférieure, et parvenue en arrière se comporte comme nous venons de le dire.

2°. *Artère scapulaire supérieure.*

Inférieure à la précédente pour le volume, elle en tire souvent son origine; d'autres fois elle naît de la thyroïdienne inférieure, rarement de la thorachique interne. Dans le plus grand nombre de sujets elle

ne vient point immédiatement de la sous-clavière.

Dans tous les cas elle descend obliquement en dehors dans l'espace triangulaire des sterno-mastoïdien et trapèze, s'engage sous ce dernier muscle en suivant exactement le trajet du nerf sus scapulaire, et s'approche du muscle sus-épineux. Elle donne à ce muscle une branche superficielle assez considérable dont plusieurs rameaux s'anastomosent en arrière avec la scapulaire postérieure, d'autres se portent en devant et se répandent sur le sous-clavier.

La scapulaire externe s'engage ensuite dans la fosse sus-épineuse entre le bord supérieur de l'omoplate et le muscle sus-épineux, ordinairement au-dessus, quelquefois au-dessous du ligament qui ferme la petite échancrure coracoïdienne. Elle suit la fosse en dehors en donnant au muscle de nombreuses branches, puis s'enfonce sous la voûte formée par la clavicule et l'acromion réunis, se contourne sur le bord externe de l'épine de l'omoplate et s'engage dans la fosse sous-épineuse entre l'os et le muscle sous-épineux. Là elle s'anastomose avec la branche transversale de la scapulaire inférieure fournie par l'axillaire, puis se divise en deux branches principales. L'une descend en côtoyant le bord antérieur de l'omoplate et distribuant ses rameaux aux muscles petit rond et grand dorsal. L'autre se porte transversalement en arrière sous l'épine de l'omoplate et finit par un grand nombre de rameaux répandus dans le muscle sous-épineux.

3°. *Artère cervicale profonde.*

Elle naît très profondément de la sous-clavière derrière le scalène antérieur et immédiatement au-devant des apophyses transverses. Souvent elle vient d'un tronc qui lui est commun avec l'intercostale supérieure ; d'autres fois c'est la thyroïdienne inférieure ou la vertébrale qui la fournissent. Dirigée obliquement en dehors elle s'engage peu après son origine entre les apophyses transverses des deux dernières vertèbres cervicales ou de la dernière cervicale et de la première dorsale, se porte en arrière et en haut, et s'introduit entre le grand complexus et le transversaire épineux. Là elle devient verticale, remonte entre ces deux muscles jusque auprès de l'attache supérieure du premier, et finit en s'anastomosant par plusieurs divisions avec l'artère vertébrale et avec les rameaux de l'occipitale.

Avant de s'engager entre les apophyses transverses, la cervicale profonde donne plusieurs branches ascendantes qui se perdent dans le scalène antérieur et dans le long du cou en se réunissant à la branche cervicale superficielle de la thyroïdienne inférieure.

Parvenue entre les muscles grand complexus et transversaire épineux, elle leur fournit de nombreux rameaux dont aucun ne mérite d'être décrit.

Quelquefois la cervicale profonde manque tout-à-fait, et se trouve suppléée par une branche qui, née en haut d'une des courbures de la vertébrale, descend entre les muscles grand complexus et transversaire épineux.

§ II. *Artère axillaire.*

L'axillaire commence dans l'intervalle des scalènes dont elle sort aussitôt pour se diriger obliquement en bas et en dehors jusqu'à la partie inférieure du creux de l'aisselle, endroit où elle change son nom en celui de *brachiale*. Placée entre le thorax et le membre supérieur, elle appuie sur l'un depuis les scalènes jusqu'au-delà de la clavicule, se rapproche de l'autre inférieurement.

En devant l'axillaire répond d'abord au peaucier et à la peau dans un fort petit espace triangulaire que circonscrivent le scalène antérieur, les nerfs du plexus brachial et la clavicule; puis elle est recouverte par la clavicule dont elle croise la direction à angle aigu et par le muscle sous-clavier. Plus bas elle répond au grand pectoral, plus bas encore aux deux pectoraux réunis, tout-à-fait en bas au tendon du grand pectoral, puis au coraco-brachial et à la courte portion du biceps. Depuis la clavicule jusqu'au bas du creux de l'aisselle, la veine axillaire recouvre l'artère immédiatement.

En arrière l'axillaire répond d'abord en partie au plexus brachial, puis à l'intervalle celluleux des muscles grand dentelé et sous-scapulaire, intervalle qui forme en grande partie le creux de l'aisselle, enfin aux muscles grand dorsal et grand rond.

En dedans l'axillaire appuie d'abord immédiatement dans une assez grande étendue sur la première côte qui lui offre une gouttière plus ou moins profonde. Plus bas elle appuie encore sur le premier espace intercostal, sur la seconde côte et sur une

portion du muscle grand dentelé. Elle est ensuite éloignée de ce muscle, soit par le plexus brachial, soit par le tissu cellulaire abondant et par les glandes lymphatiques qui remplissent le creux de l'aisselle.

En dehors, recouverte jusqu'au-dessous de la clavicule par le plexus brachial, l'axillaire est ensuite appliquée immédiatement sur la capsule articulaire de l'humérus.

Ainsi le plexus brachial occupe d'abord la partie postérieure et externe de l'axillaire qui au-dessous de la clavicule passe entre les nerfs de ce plexus et se trouve ensuite enveloppée par eux de toutes parts, excepté en dehors.

D'après ces rapports essentiels à connoître, on voit, 1°. que depuis les scalènes jusqu'au-dessous de la clavicule, l'artère axillaire repose immédiatement sur une surface osseuse assez large et presque immobile formée par la première côte; 2°. qu'au-dessous de la clavicule elle a pour appui la seconde côte, moins large, un peu plus mobile, mais assez fixe pour supporter sans s'enfoncer beaucoup une compression assez forte; 3°. que dans le reste de son étendue elle n'a aucun appui osseux fixe, puisqu'elle ne répond qu'à une articulation.

Ainsi l'artère axillaire peut être comprimée sur la première côte par une puissance qui agira de haut en bas au-dessus de la clavicule dans l'intervalle des muscles scalènes; elle peut l'être sur la seconde côte par une puissance qui agira horizontalement au-dessous du milieu de la clavicule au travers des deux muscles pectoraux. Le premier mode de compression favorisé par l'abaissement de la clavicule

sera toujours difficile à exercer et surtout à soutenir, vu la saillie et la mobilité de cet os. Le second plus facile à soutenir n'a pour inconvénient que l'épaisseur médiocre des parties au travers desquelles on l'exerce.

On conçoit aussi comment l'abaissement forcé de la clavicule peut intercepter, au moins en grande partie, le cours du sang dans l'artère axillaire comprimée alors sur la première côte.

Les branches fournies par l'axillaire peuvent se distinguer en celles qu'elle donne en passant sur le thorax, celle qui en naît dans le creux de l'aisselle, celles qui en partent à la partie supérieure du bras.

Branches que donne l'axillaire en passant sur le thorax.

Il y en a trois constantes, l'acromiale, et les deux thorachiques externes.

1°. *Artère acromiale.*

Elle naît de l'axillaire au-dessous du milieu de la clavicule. Son volume est assez considérable. Cachée dans son origine par le muscle grand pectoral, elle donne quelques rameaux au sous-clavier, au grand dentelé et au premier intercostal. Puis elle se dirige obliquement en avant et en dehors jusqu'à l'intervalle étroit et graisseux qui sépare ce muscle du deltoïde. Là elle se divise en deux branches, l'une supérieure, l'autre inférieure.

Branche supérieure. Elle remonte flexueuse entre le pectoral et le deltoïde jusqu'à la clavicule.

Là elle donne un rameau assez volumineux qui se porte plus ou moins loin entre la peau et la partie supérieure du deltoïde en se distribuant à l'une et à l'autre. Puis elle s'enfonce sous le deltoïde et se divise aussitôt en deux branches secondaires. L'une suit le bord antérieur de l'extrémité de la clavicule jusqu'à son articulation avec l'acromion. L'autre plus grosse se répand par une foule de rameaux sur la capsule articulaire de l'humérus. Toutes deux se distribuent soit au deltoïde, soit au sus-épineux, en s'anastomosant avec la scapulaire supérieure.

Branche inférieure. Elle descend entre le grand pectoral et le deltoïde en suivant la veine céphalique, se divise bientôt en plusieurs rameaux qui s'enfoncent dans les deux muscles et s'y perdent entièrement, anastomosés d'un côté avec les thorachiques, de l'autre avec les circonflexes.

2°. *Artère thorachique externe supérieure.*

Le plus souvent elle naît par un tronc commun avec l'acromiale ; quelquefois celle-ci la fournit. Son volume est variable. Dirigée obliquement en bas et en devant entre le petit et le grand pectoral, elle se distribue à ces deux muscles par un grand nombre de rameaux dont quelques-uns traversent le grand pectoral et vont à la mamelle.

Il est très-ordinaire de trouver plusieurs autres thorachiques supérieures nées isolément de l'axillaire et distribuées soit aux muscles pectoraux, soit aux intercostaux qu'elles traversent pour s'anastomoser avec les intercostales.

3°. *Artère thorachique externe inférieure.*

On l'a nommée aussi *thorachique longue* et *mammaire externe.* Elle naît de l'axillaire un peu en dehors de la précédente, quelquefois d'un tronc qui lui est commun avec elle et avec l'acromiale. Dirigée d'abord verticalement en bas sur la partie latérale du thorax entre le grand dentelé sur lequel elle appuie et le grand pectoral qui la recouvre, elle se recourbe bientôt en dedans, suit le bord inférieur de ce dernier muscle en se rapprochant de la peau, puis se divise en plusieurs branches qui embrassent la mamelle et se distribuent soit à cette glande, soit à la peau.

Dans son trajet la thorachique inférieure fournit de nombreux rameaux, soit aux glandes axillaires, soit aux muscles grand dentelé, grand pectoral, et aux intercostaux. Les derniers se prolongent plus ou moins en devant dans les espaces intercostaux, traversent les muscles et communiquent avec la thorachique interne.

Souvent on trouve deux thorachiques inférieures. La plus petite née profondément de l'axillaire descend sur le muscle grand dentelé auquel elle se distribue presque exclusivement ainsi qu'aux intercostaux. L'autre, beaucoup plus considérable, naît plus en dehors au-devant du creux de l'aisselle, descend sous le grand pectoral, sur lequel elle est appliquée, et parvenue au bord inférieur de ce muscle, forme en bas et en devant une grande courbe pour se terminer à la mamelle. Dans la dernière partie

de son trajet celle-ci adhère au tissu cellulaire graisseux de la mamelle, en sorte que dans la dissection elle s'enlève avec la peau, l'autre demeurant fixée sur le thorax.

Branche que donne l'axillaire dans le creux de l'aisselle.

Cette branche unique, la plus volumineuse que fournisse l'axillaire, est l'artère scapulaire inférieure désignée par d'autres anatomistes sous le nom de *scapulaire commune*.

Artère scapulaire inférieure.

Elle naît de la partie inférieure de l'axillaire près de l'endroit où ce tronc change de nom, vers le bord inférieur du tendon du muscle sous-scapulaire, couverte antérieurement dans son origine par le plexus brachial. Dirigée obliquement en bas le long du bord du sous-scapulaire elle donne presqu'aussitôt trois ou quatre branches assez grosses qui se portent transversalement soit aux glandes axillaires, soit au sous-scapulaire. La plus grosse s'enfonce dans l'épaisseur de ce muscle, s'y ramifie et s'y distribue entièrement.

En même temps qu'elle donne ces branches ou immédiatement après les avoir données, la scapulaire se divise en deux branches considérables, l'une descendante ou antérieure, l'autre transversale ou postérieure.

Branche descendante. Elle suit le bord antérieur

de l'omoplate jusqu'à son tiers inférieur, placée sur le sous scapulaire, entre le grand dorsal et le grand dentelé, environnée de beaucoup de tissu cellulaire lâche. Puis elle se divise en un grand nombre de rameaux tous volumineux. Les uns se portent sur le grand dentelé, se subdivisent et se distribuent à ce muscle dans toute sa portion moyenne et inférieure. Les autres se répandent sur toute la face interne du grand dorsal dont plusieurs traversent les fibres pour se jeter dans les tégumens du dos. D'autres enfin suivent le bord de l'omoplate, se contournent sur son angle inférieur et remontent en arrière pour se réunir à des rameaux de la branche transversale. De nombreuses anastomoses réunissent cette branche à l'artère scapulaire postérieure.

Branche transversale. Dès son origine elle donne un rameau considérable au grand dorsal près de son tendon ; elle en donne d'autres au sous-scapulaire. Ensuite elle se recourbe sur le bord antérieur de l'omoplate, passe entre les grand dorsal et grand rond, le sous-scapulaire et la longue portion du brachial postérieur pour gagner la fosse sous-épineuse. Avant de s'y engager, elle donne sur le bord même de l'omoplate un rameau assez remarquable qui se porte entre la peau et l'aponévrose du sous-épineux, et se divise en deux rameaux secondaires dont l'un descend le long du bord de l'omoplate, l'autre se ramifie sur l'aponévrose et se perd ainsi que le premier soit à elle, soit à la peau.

La branche s'engage ensuite sous les muscles petit rond et sous-épineux, dans la fosse de même nom, remonte obliquement en haut et en arrière en don-

nant trois ou quatre gros rameaux qui descendent dans le sous-épineux et s'y subdivisent. Enfin elle passe sous l'acromion, traverse transversalement la fosse sus-épineuse, placée entre l'os et le muscle, et s'anastomose avec la branche profonde de l'artère scapulaire supérieure.

Branches que donne l'axillaire à la partie supérieure du bras.

Ces branches, au nombre de deux, sont les dernières que fournisse l'axillaire qui prend immédiatement au-dessous d'elles le nom de *brachiale*. On les nomme *circonflexes*, et on les distingue en postérieure et antérieure.

1°. *Artère circonflexe postérieure.*

Elle naît de la partie postérieure de l'axillaire au-dessous de la tête de l'humérus. Son volume, moindre que celui de la scapulaire inférieure, surpasse celui de toutes les autres branches précédentes. Dirigée horizontalement en arrière, elle contourne l'humerus en passant entre le sous-scapulaire et le grand rond, puis au-devant de la longue portion du brachial postérieur, et donnant à ces muscles plusieurs rameaux. Ensuite elle s'engage sous le deltoïde vers le milieu de sa longueur, et parvient ainsi à la partie antérieure externe de l'humérus en suivant toujours sa première direction. Dans ce trajet elle donne des rameaux supérieurs qui remontent les uns sur la tête de l'humerus pour se distribuer à la capsule ainsi qu'aux

muscles petit rond et sous-épineux, les autres dans l'épaisseur du deltoïde où ils s'anastomosent avec l'acromiale. D'autres rameaux moins nombreux descendent sur le deltoïde jusqu'à son tendon. Enfin l'artère elle-même finit en s'enfonçant dans ce muscle et s'y perd par plusieurs subdivisions.

2°. *Artère circonflexe antérieure.*

Elle naît au même endroit que la précédente qui souvent la produit. Toujours elle lui est fort inférieure en volume. Dirigée horizontalement en devant et en dehors, elle côtoie le bord supérieur du tendon des grand dorsal et grand rond, passe sous le coracobrachial et sous la courte portion du biceps, et contournant l'humérus, s'engage entre cet os et le muscle deltoïde jusqu'à la gouttière bicipitale. Dans ce trajet elle demeure appliquée sur l'humérus, différence sensible d'avec la postérieure qui s'enlève toujours avec le deltoïde lorsqu'on le renverse. Ses rameaux presque tous supérieurs vont se répandre principalement sur la capsule et sur le sous-scapulaire près de son attache. Le deltoïde n'en reçoit que fort peu.

Parvenue à la gouttière bicipitale, l'artère donne quelques ramuscules qui descendent dans la partie inférieure de cette gouttière en se distribuant à la gaîne fibreuse qui la revêt et s'y attache. Ensuite la circonflexe passe sous le tendon de la longue portion du biceps, se recourbe aussitôt et remonte à côté d'elle le long de la gouttière, toujours placée à l'extérieur de la gaîne fibreuse pour se perdre enfin soit à cette gaîne, soit à la capsule articulaire.

On voit en comparant la disposition des deux circonflexes, que la postérieure appartient plus particulièrement au deltoïde, et l'antérieure à l'articulation scapulo-humérale.

§ III. *Artère brachiale.*

Elle s'étend depuis la partie inférieure du creux de l'aisselle jusqu'à l'articulation du bras avec l'avant-bras. Placée en dedans du bras dans la plus grande partie de son trajet, elle devient plus superficielle et plus antérieure à mesure qu'elle avance en bas, et occupe enfin le milieu de l'articulation sur laquelle elle finit.

En devant l'artère brachiale est recouverte d'abord par le muscle coraco-brachial dont la sépare un intervalle celluleux assez large. Plus bas elle répond dans toute l'étendue du bras au bord interne du biceps auquel elle est immédiatement subjacente. Au pli du coude elle n'est plus recouverte que par l'aponévrose brachiale, par la veine médiane basilique, et par les tégumens dont un tissu cellulaire graisseux abondant la sépare.

En arrière elle est libre supérieurement et éloignée du brachial postérieur par beaucoup de graisse. Plus bas elle est appliquée en entier sur le brachial antérieur.

En dedans l'artère brachiale est côtoyée par la veine brachiale et par le nerf médian qui lui sont immédiatement contigus. Un tissu cellulaire plus ou moins graisseux la sépare des tégumens.

En dehors, appliquée près de l'aisselle sur l'hu-

mérus dont l'éloigne seulement le tendon du coraco-brachial, elle répond plus bas aux muscles biceps et brachial antérieur rapprochés, tout-à-fait en bas au tendon du biceps.

C'est donc seulement auprès de l'aisselle, au-dessus du brachial antérieur que l'artère brachiale se trouve voisine d'une surface osseuse, considération importante dans la pratique chirurgicale pour l'application des moyens compressifs propres à arrêter ou à prévenir l'hémorragie.

Les branches que donne l'artère brachiale peuvent se distinguer en antérieures, postérieures, externes et internes.

Branches antérieures.

Elles appartiennent toutes, soit au muscle biceps, soit aux tégumens. Ces dernières sont fort petites et en nombre indéterminé. Celles du biceps plus volumineuses varient aussi pour le nombre. Ordinairement on en trouve une ou deux constantes vers le tiers supérieur du bras. Dirigées un peu obliquement en avant et en bas elles se divisent bientôt en plusieurs rameaux qui pénètrent l'épaisseur du muscle en suivant leur direction primitive, placés d'abord entre les faisceaux les plus considérables, puis subdivisés en ramuscules ténus qui se perdent entre les fibres particulières. On suit très-bien les premiers rameaux jusqu'au tiers inférieur du muscle.

Branches postérieures.

Elles sont extrêmement courtes et en nombre incertain. Nées de la brachiale elles s'enfoncent aussitôt dans le muscle brachial antérieur et s'y subdivisent en rameaux qui suivent différentes directions. Les uns se portent en bas et suivent le muscle jusqu'à son tendon. Parmi ceux-ci on en voit qui sortent du brachial peu après y être entrés, et qui changeant de direction vont gagner le muscle biceps où ils se terminent. D'autres rameaux se recourbent en haut et suivent le muscle brachial antérieur jusqu'à son origine. J'ai vu un de ceux-ci très-considérable remonter obliquement en dehors entre le brachial antérieur et l'humérus pour aller se jeter et finir dans le muscle deltoïde.

Branches externes.

Ce sont plutôt de petits rameaux peu nombreux et peu multipliés dont les uns se jettent dans le muscle coraco-brachial; les autres passent entre le biceps et le brachial antérieur pour aller se perdre aux tégumens.

Branches internes.

Ce sont les plus multipliées et les plus considérables; on les distingue en supérieures et inférieures.

1°. *Branches internes supérieures.*

Elles sont superficielles ou profondes.

Les superficielles sont assez nombreuses; mais ce nombre est indéterminé.

Les unes remontent aussitôt après leur origine vers le bord antérieur du creux de l'aisselle et se portent soit en avant sur le muscle grand pectoral, soit en dehors sur le deltoïde. Elles s'y perdent après un trajet plus ou moins long en s'anastomosant avec les thorachiques et les circonflexes.

Les autres se portent transversalement en dedans et en arrière, contournent la longue portion du brachial postérieur dans laquelle elles s'enfoncent à peu de distance de son attache supérieure, et se divisent en rameaux qui se répandent dans le muscle en suivant en haut et en bas la direction de ses fibres.

Les dernières naissent plus bas et se dirigent inférieurement les unes en arrière pour se perdre dans la longue portion du brachial postérieur, les autres en devant se jettent dans sa portion interne. Parmi celles-ci on en distingue ordinairement une qui accompagne le nerf cubital jusqu'à la partie inférieure du bras. Là elle s'anastomose auprès de la tubérosité interne de l'humérus avec les rameaux de la branche interne inférieure.

Ordinairement il n'y a qu'une seule branche *profonde*. Elle est toujours très-volumineuse. Quelquefois elle vient de la circonflexe postérieure ou même de la scapulaire inférieure; mais le plus souvent on la voit naître de l'artère brachiale au-dessus de la portion interne du brachial postérieur et au niveau de l'endroit où le nerf radial contourne l'humérus pour se porter en arrière.

Cette branche suit le trajet du nerf radial, placée au-dessus de lui, s'engage entre la longue portion du brachial postérieur et l'humérus qu'elle contourne en

arrière et en bas. Parvenue à la moitié de la partie postérieure du bras, elle passe entre l'humérus et l'aponévrose qui réunit la portion externe du brachial postérieur avec le brachial antérieur, sort entre ces deux muscles en dehors et devient superficielle. Elle se dirige alors perpendiculairement en bas pendant quelque temps, puis se divise à une distance plus ou moins grande de l'articulation du coude en deux rameaux dont l'un suit la direction de la branche pour aller se perdre dans le brachial postérieur un peu au-dessus de son attache à l'olécrâne, tandis que l'autre se porte en dehors entre le brachial antérieur et les tégumens et se termine par plusieurs subdivisions soit à ceux-ci, soit au muscle grand supinateur près de son origine. D'autres fois la branche profonde continue son trajet oblique entre l'humérus et les trois portions du brachial postérieur jusqu'à quelque distance au-dessus de la tubérosité externe de l'os, et là s'anastomose avec une autre branche fournie en bas par la brachiale, de manière à former une arcade transversale qui embrasse l'humérus en dehors. Les rameaux partis de cette arcade se portent en bas soit à l'articulation huméro-cubitale, soit à l'attache des muscles extenseurs de la main.

Ainsi la branche profonde contourne exactement l'humérus et se trouve interne dans son origine, postérieure dans son trajet, externe dans sa terminaison.

Elle fournit dans toute son étendue beaucoup de rameaux dont le plus grand nombre en naît près de son origine.

De ces rameaux les uns sont postérieurs, les autres externes. Les rameaux postérieurs descendent plus

ou moins obliquement dans l'épaisseur du brachial postérieur et s'y subdivisent après un certain trajet. Un d'entre eux se distingue par sa longueur et par son existence constante. Né de la profonde peu après son origine, quelquefois même isolément de la brachiale, il descend d'abord sur la portion interne du brachial postérieur, continue son trajet dans la masse commune de ce muscle où il se perd enfin auprès de l'olécrâne.

Les rameaux externes se portent entre l'humérus et la portion externe du brachial postérieur pour se terminer soit sur le périoste, soit dans le brachial antérieur près de son origine.

C'est aussi la branche profonde qui, vers le milieu de son trajet, fournit le rameau nourricier de l'os.

2°. *Branche interne inférieure.*

Elle naît de la brachiale un pouce à-peu-près au-dessus de la tubérosité interne de l'humérus, se dirige transversalement en dedans au-devant du brachial antérieur et traverse suivant sa largeur l'aponévrose intermusculaire. En la traversant elle change de direction et se divise en deux rameaux.

L'un suit le bord de l'humérus jusqu'à la tubérosité interne sur laquelle il s'anastomose en se subdivisant avec la récurrente cubitale antérieure. Un de ces rameaux secondaires se jette entre la tubérosité et l'olécrâne, et accompagne le nerf cubital dans l'avant-bras jusqu'à une certaine distance.

L'autre rameau se porte en arrière, se plonge dans la cavité olécrânienne où il se subdivise pour se perdre au brachial postérieur près de son attache.

Les autres rameaux que donne cette branche dans son court trajet ne méritent pas d'être remarqués, tant leur volume est petit. Ils se perdent dans le brachial antérieur et dans le brachial postérieur.

Souvent on trouve une seconde branche interne inférieure qui naît plus bas que la précédente, se dirige transversalement, puis se recourbe sur le brachial antérieur où elle se perd.

Parvenue un peu au-dessous du pli du coude et à l'endroit où le tendon du biceps s'enfonce entre les muscles antérieurs de l'avant-bras, l'artère brachiale se divise en deux artères secondaires nommées *radiale* et *cubitale*. Avant cette division elle donne quelques petits rameaux internes qui vont se porter au faisceau musculaire implanté à la tubérosité interne et s'y distribuent.

Le point de division de l'artère brachiale n'est pas parfaitement constant. Elle a lieu quelquefois au-dessus du pli du coude ou même vers la partie supérieure du bras, la cubitale fournissant alors la branche interne inférieure qui appartient ailleurs à la brachiale.

Artère radiale.

Elle est la plus superficielle et se trouve dans la direction de la brachiale qui la produit. Elle descend un peu obliquement à la partie antérieure externe de l'avant-bras jusqu'à l'articulation du poignet. Là elle se détourne en dehors, passe obliquement sous les tendons extenseurs du pouce, et parvient dans l'intervalle des deux premiers os du métacarpe. Elle s'enfonce entre le second de ces os et le premier

muscle interosseux dorsal pour se porter profondément dans la paume de la main où elle se termine en formant l'arcade palmaire profonde.

On doit donc considérer l'artère radiale dans trois endroits, 1°. à l'avant-bras où elle est à-peu-près verticale ; 2°. au poignet où elle est très-oblique en dehors et en bas ; 3°. dans la main où elle devient transversale en dedans.

1°. *Portion antibrachiale.*

En arrière cette portion correspond dans toute son étendue au radius, mais elle en est séparée en haut par beaucoup de graisse et par le muscle petit supinateur, plus bas par le grand pronateur, plus bas encore par le grand fléchisseur du pouce et enfin par le petit pronateur. Au-dessous de ce dernier muscle elle est immédiatement appuyée sur l'os.

En devant la radiale recouverte par sa veine satellite répond par-tout à l'aponévrose et à la peau. Mais elle en est éloignée supérieurement par beaucoup de graisse, plus bas par la saillie que forment sur ses côtés les muscles grand palmaire et grand supinateur, et c'est seulement dans le tiers inférieur de l'avant-bras que ces muscles ayant dégénéré en tendons, l'artère se trouve immédiatement subjacente aux enveloppes aponévrotique et cutanée au travers desquelles on peut sentir ses pulsations.

En dedans la radiale répond au grand pronateur, au grand palmaire et au fléchisseur digital superficiel. *En dehors* elle répond au grand supinateur.

Les branches que donne la radiale à l'avant-bras

peuvent se distinguer en antérieures, postérieures externes et internes.

Branches antérieures. Elles sont fort petites, très-multipliées et en nombre incertain. Toutes traversent l'aponévrose et vont se distribuer aux tégumens.

Branches postérieures. Fort petites aussi. Elles vont au grand fléchisseur du pouce et au petit pronateur. Plusieurs se portent obliquement en bas pendant quelque temps sur ces muscles avant d'y pénétrer.

Branches externes. On en trouve constamment une assez volumineuse qui naît de la radiale dès son origine et que l'on nomme *récurrente radiale antérieure.* Dirigée transversalement vers le grand supinateur, elle remonte ensuite entre lui et le brachial antérieur jusqu'au voisinage de l'olécrâne. Plusieurs rameaux nés de sa convexité se jettent dans les muscles grand et petit supinateurs et vont même jusqu'aux radiaux. Ceux qui la terminent se perdent dans le brachial antérieur et dans le brachial postérieur en s'anastomosant avec les rameaux de la branche profonde fournie supérieurement par la brachiale.

Quelquefois la récurrente radiale se plonge toute entière dans le grand supinateur et remonte entre ses fibres au lieu de remonter entre lui et le brachial antérieur. Du reste sa distribution est la même.

Les autres branches externes sont nombreuses, mais aucune n'est constante. Elles descendent obliquement et se jettent soit dans le grand supinateur et les radiaux, soit en bas dans les grand abducteur et

petit extenseur du pouce contournés sur le radius.

Branches internes. Beaucoup plus nombreuses encore. Elles descendent obliquement suivant des directions un peu différentes et vont se distribuer à tous les muscles qui forment la première couche antérieure de l'avant-bras.

Deux de ces branches sont constantes. La radiale les donne immédiatement avant de quitter l'avant-bras.

L'une, très-petite et très-profonde, se dirige transversalement en suivant le bord inférieur du petit pronateur pour s'anastomoser bientôt avec une branche semblable née au même endroit de la cubitale. De cette espèce d'arcade naissent des rameaux supérieurs pour le petit pronateur, des rameaux inférieurs pour les ligamens du carpe.

L'autre branche est superficielle et se dirige très-obliquement au-devant du ligament annulaire du carpe pour gagner la paume de la main. Son volume varie beaucoup, même sur les deux membres du même sujet. Tantôt très-petite elle se perd par des ramuscules dans les muscles du pouce et dans les tégumens. Tantôt très-volumineuse elle traverse en partie l'épaisseur de ces muscles, et va s'anastomoser avec l'extrémité de l'arcade palmaire superficielle formée par la cubitale. J'ai vu cette branche communiquer seulement par un rameau avec cette arcade, puis descendre sur les muscles du pouce et se diviser en deux collatérales pour ce doigt. Dans tous les cas, ses rameaux appartiennent au faisceau des muscles du pouce, à l'aponévrose et aux tégumens de la paume de la main.

2°. *Portion carpienne.*

Elle s'étend depuis la partie inférieure du radius jusqu'au premier espace interosseux. Les tendons réunis des muscles grand abducteur et petit extenseur du pouce marquent l'endroit où elle commence, et le tendon du grand extenseur du pouce marque à-peu-près celui où elle finit. Recouverte par eux en dehors, la radiale correspond en dedans aux ligamens immédiats du carpe et à l'extrémité supérieure du premier os métacarpien.

Les branches qu'elle donne se distinguent en externes et internes.

Branches externes. Toutes appartiennent au pouce. On en compte ordinairement trois.

La première naît de la radiale à l'instant où elle s'engage sous les tendons des grand abducteur et petit extenseur. Elle descend en côtoyant ces tendons jusque sur l'attache supérieure du muscle petit abducteur du pouce auquel elle se distribue aussitôt.

La seconde naît au-delà des mêmes tendons. On la nomme *branche dorsale du pouce.* C'est la plus constante des trois. Elle descend sur la face convexe du premier os métacarpien et sur la première phalange du pouce en s'approchant toujours de leur bord radial où elle se termine en s'anastomosant avec la collatérale externe du même doigt. Ses rameaux forts petits comme elle-même, se perdent sur le périoste, aux tégumens et au muscle petit abducteur.

La troisième naît au-delà du tendon du grand extenseur. Elle descend en le côtoyant, sur le bord

cubital du premier os métacarpien auquel elle forme une petite collatérale. Ses rameaux ténus se répandent en dehors sur la face dorsale de l'os, en dedans se perdent dans le premier muscle interosseux dorsal.

Branches internes. Elles appartiennent au carpe et au métacarpe. On en compte ordinairement deux.

La première est connue sous le nom de *branche dorsale du carpe*. Elle est constante. Née de la radiale, entre les tendons du pouce, elle se dirige transversalement sur la face dorsale du carpe, recouverte en arrière par les tendons des radiaux et de l'extenseur digital, appliquée en devant sur les ligamens qui unissent le carpe au métacarpe. Parvenue au bord cubital du carpe, elle s'anastomose avec une branche semblable de la cubitale, d'autres fois se termine en se subdivisant en ramuscules ténus. Dans ce trajet elle donne des rameaux supérieurs et inférieurs. Les premiers fort courts pour la plupart se perdent sur les ligamens nombreux qui unissent les os du carpe entre eux et le carpe à l'avant-bras. Quelques-uns plus longs remontent jusque dans l'épaisseur des muscles postérieurs de l'avant-bras et s'anastomosent avec la branche interosseuse antérieure. Les rameaux inférieurs plus longs sont en nombre indéterminé. Ils descendent entre les os du métacarpe, communiquent par des ramuscules avec les rameaux perforans de l'arcade palmaire profonde, puis continuant leur trajet sur les muscles interosseux dorsaux se distribuent soit à ces muscles, soit aux tégumens.

La seconde branche interne, nommée par quelques-uns *la dorsale du métacarpe*, naît de la radiale

immédiatement avant qu'elle s'engage dans l'épaisseur du premier interosseux dorsal. Elle se détourne obliquement sur la face dorsale du second os métacarpien, et tantôt suivant la même direction parcourt ainsi la moitié du dos de la main, tantôt et plus souvent descend sur le second os et sur la partie postérieure de l'index où elle se perd. Ses ramuscules se distribuent en dedans au premier interosseux dorsal, en dehors se perdent sur le dos de la main en s'anastomosant avec les rameaux inférieurs de la dorsale du carpe.

3°. *Portion palmaire.*

En entrant dans la main par le premier espace interosseux, la radiale se divise en deux grosses branches.

L'une descend entre les muscles petit fléchisseur du pouce et premier interosseux dorsal jusqu'à la première phalange du pouce, se divise là en deux rameaux dont l'un suit le bord cubital du pouce, l'autre le bord radial de l'index pour s'anastomoser à l'extrémité de ces doigts avec les rameaux collatéraux opposés.

L'autre branche se porte transversalement jusqu'auprès du doigt annulaire en formant une légère courbe dont la convexité est en bas, la concavité en haut : c'est ce qu'on nomme l'*arcade palmaire profonde*. Recouverte en devant par le muscle adducteur du pouce, par les tendons des deux fléchisseurs digitaux et par les lombricaux, elle répond en arrière à l'extrémité supérieure des os du métacarpe et aux muscles interosseux.

Les branches qu'elle donne peuvent se distinguer

en supérieures, inférieures, antérieures et postérieures.

Branches supérieures. Elles sont peu nombreuses. Nées de la concavité de l'arcade, elles remontent sur le carpe et s'y perdent en se ramifiant.

Branches inférieures. Ce sont les plus volumineuses et les plus longues. On en compte ordinairement cinq.

Les quatre premières suivent les espaces interosseux depuis le second jusqu'au dernier. Parvenues aux têtes des os métacarpiens, elles se divisent en plusieurs rameaux qui descendent sur les côtés de chaque doigt et s'anastomosent avec les rameaux collatéraux fournis par l'arcade palmaire superficielle.

La cinquième descend un peu obliquement entre les muscles petit fléchisseur et opposant du petit doigt dans lesquels elle se ramifie et se perd.

Branches antérieures. Elles sont très-courtes et très-petites. Nées de l'arcade elles se jettent dans les muscles lombricaux où elles se perdent.

Branches postérieures. On en compte ordinairement trois connues sous le nom de *perforantes*, parce qu'aussitôt après leur origine elles traversent les muscles interosseux correspondans pour s'anastomoser au dos de la main avec des rameaux de la branche dorsale du carpe.

Après avoir fourni ces branches, la portion palmaire de la radiale finit en s'anastomosant avec une branche profonde de la cubitale au-dessous des muscles petit fléchisseur et opposant du petit doigt.

Artère cubitale.

Née au même endroit que la radiale elle est plus volumineuse. Peu apres son origine elle descend obliquement en dedans, s'enfonce entre la couche musculaire profonde de l'avant-bras et la couche musculaire superficielle dont elle croise la direction. Parvenue vers la fin du tiers supérieur de l'avant-bras elle sort de dessous les muscles antérieurs dans l'endroit où le fléchisseur digital superficiel s'écarte du cubital antérieur, et devient verticale jusqu'auprès de l'os pisiforme où elle est presqu'aussi superficielle que la radiale. Détournée alors obliquement en dehors, elle passe sur le ligament annulaire antérieur du carpe et gagne la paume de la main où elle se termine en formant l'arcade palmaire superficielle.

Ainsi changeant deux fois de direction, l'artère cubitale forme deux courbes, l'une en haut sous les muscles, l'autre en bas près de la main et se retrouve à sa terminaison dans la ligne droite de son origine.

En devant la cubitale recouverte supérieurement par la réunion des muscles grand pronateur, grand et petit palmaires, fléchisseur digital superficiel et cubital antérieur, répondant en bas à l'aponévrose et a la peau dont elle n'est éloignée que par les saillies latérales du fléchisseur superficiel et du cubital, est entièrement cachée à la main par le muscle palmaire cutané et par l'aponévrose palmaire.

En arrière la cubitale répond d'abord au brachial antérieur, puis dans tout l'avant-bras au fléchisseur digital profond, puis dans la main au liga-

ment annulaire et aux tendons réunis des deux fléchisseurs.

En dedans elle est côtoyée par le nerf cubital, par le muscle cubital antérieur, et répond enfin à l'os pisiforme avant de se porter à la main.

En dehors elle n'a de rapports remarquables que dans sa portion antibrachiale superficielle où elle côtoie le muscle fléchisseur digital superficiel.

Aussitôt après son origine la cubitale donne en dedans une petite branche qui remonte entre le brachial antérieur et l'attache commune des muscles superficiels de l'avant-bras jusqu'à la tubérosité interne de l'humérus où elle s'anastomose avec la branche interne inférieure fournie par la brachiale. On la nomme *récurrente cubitale antérieure*.

Pour mettre de l'ordre dans la description des autres branches importantes que donne la cubitale, il faut considérer cette artère, 1°. dans sa portion antibrachiale profonde, 2°. dans sa portion antibrachiale superficielle, 3°. dans sa portion palmaire

1°. *Portion antibrachiale profonde.*

Elle s'étend obliquement en bas et en dedans depuis l'origine de la cubitale jusqu'à la fin du tiers supérieur de l'avant-bras.

Les branches données ici par la cubitale sont externes, antérieures, et postérieures.

Branches externes. La plus volumineuse et la plus constante naît au niveau de l'attache inférieure du brachial antérieur. On la nomme *récurrente cubitale postérieure*. Transversalement dirigée au de-

vant du fléchisseur digital profond, elle remonte bientôt entre le muscle cubital antérieur et l'articulation huméro-cubitale, contiguë au nerf cubital, et parvenue entre la tubérosité interne et l'olécrâne, s'anastomose avec un rameau considérable de la branche interne inférieure fournie par la brachiale. Sa convexité donne plusieurs rameaux qui descendent dans l'épaisseur du muscle fléchisseur digital profond et du cubital antérieur où ils se distribuent. Quelques-uns traversent le cubital et son aponévrose pour se perdre à la peau.

Les autres branches externes sont peu remarquables. Elles se jettent dans le fléchisseur superficiel et dans le cubital antérieur.

Branches antérieures. Elles sont très-nombreuses et vont toutes se répandre dans les muscles de la couche superficielle où elles se perdent.

Une seule est remarquable par son volume et par sa longueur. Souvent elle vient de l'artère interosseuse. Dirigée obliquement en avant et en bas, elle côtoie en arrière le nerf médian et l'accompagne jusqu'à la partie inférieure de l'avant-bras où elle finit. Les rameaux latéraux qu'elle donne dans ce trajet embrassent le nerf médian et s'enfoncent dans le muscle fléchisseur superficiel, offrant d'autant plus de volume et de longueur qu'on les examine plus haut.

Branches postérieures. La seule qui mérite une description particulière, c'est l'*artère interosseuse.*

Elle naît un peu au-dessous de la tubérosité bicipitale du radius. Son volume est souvent presque égal à celui de la cubitale. Dirigée horizontalement

en arrière vers le ligament interosseux, elle se divise après quelques lignes de trajet en deux branches considérables nommées comme elle *interosseuses* et distinguées en antérieure et postérieure.

Dans le court espace qu'elle occupe, l'artère interosseuse fournit quelques petites branches qui se jettent dans les muscles profonds, et quelquefois celle qui accompagne le nerf médian, quoique souvent, comme nous l'avons dit, cette dernière vienne de la cubitale elle-même.

La branche interosseuse antérieure descend verticalement sur le ligament interosseux, placée entre les muscles fléchisseur digital profond et grand fléchisseur du pouce qui la recouvrent par leur réunion. Son volume diminue à mesure qu'elle avance. Enfin elle s'engage sous le petit pronateur en conservant la même direction, et parvenue vers l'articulation mutuelle des os cubitus et radius, elle traverse le ligament, continue le même trajet en arrière jusque sur le carpe où elle se réunit tantôt entière, tantôt par deux rameaux avec la branche dorsale du carpe fournie par la radiale.

Dans son trajet l'interosseuse antérieure donne des rameaux latéraux, antérieurs et postérieurs.

Les rameaux latéraux sont nombreux. Dirigés transversalement ou obliquement en bas, ils se distribuent en dehors au grand fléchisseur du pouce, en dedans au fléchisseur digital profond. Les rameaux antérieurs naissent principalement dans l'endroit où l'interosseuse est recouverte par le petit pronateur et se distribuent à ce muscle. Les rameaux postérieurs multipliés et fort petits pour la plupart, traversent le

ligament et vont se répandre aux muscles profonds de la partie postérieure de l'avant-bras en s'anastomosant avec ceux de l'interosseuse postérieure.

La branche interosseuse postérieure traverse le ligament en suivant la direction primitive de l'artère, et se trouve à la partie postérieure de l'avant-bras, au-dessous du muscle anconé. Là elle se divise en deux branches secondaires de volume à-peu-près égal.

L'une prend le nom de *récurrente radiale postérieure*. Elle remonte entre l'anconé et le cubital postérieur jusqu'à la tubérosité externe de l'humérus où elle s'anastomose avec des rameaux de la branche profonde de la brachiale. D'autres fois elle remonte verticalement entre les deux os, recouverte en arrière par le muscle anconé, et va auprès de la tubérosité humérale interne s'anastomoser avec les récurrentes cubitales. Les rameaux qu'elle donne dans son trajet vont à l'anconé, au cubital postérieur, et au brachial postérieur.

L'autre conserve le nom d'*interosseuse postérieure*. Elle descend verticalement entre les deux couches musculaires postérieures de l'avant-bras. Diminuée de volume inférieurement, elle se porte sur la face dorsale du carpe où elle s'anastomose avec l'interosseuse antérieure.

Dans ce trajet elle donne des rameaux antérieurs qui vont se répandre aux muscles grand abducteur, petit et grand extenseurs du pouce, extenseur de l'index ; des rameaux postérieurs qui vont aux muscles cubital postérieur et extenseur digital. Parmi ceux ci on en trouve assez souvent un très-long qui descend en côtoyant les muscles grand abducteur et petit ex-

tenseur du pouce pour aller se perdre isolément sur la face dorsale du carpe près du radius.

2°. *Portion antibrachiale superficielle.*

Elle s'étend verticalement depuis l'endroit où les muscles cubital antérieur et fléchisseur digital superficiel s'écartent l'un de l'autre jusqu'au côté externe de l'os pisiforme.

Les branches qu'elle donne soit en devant à la peau, soit latéralement aux muscles qui l'entourent, sont assez nombreuses, mais inconstantes dans leur disposition, excepté auprès du carpe. Là on trouve une petite branche externe qui se porte transversalement au-dessous du bord inférieur du petit pronateur pour se réunir à une branche semblable de la radiale.

Une autre branche un peu plus considérable naît en dedans de la cubitale, passe sous le muscle cubital antérieur, et tantôt descend verticalement sur le bord radial de la main sur lequel elle se perd, tantôt va rencontrer la branche dorsale du carpe avec laquelle elle se réunit.

3°. *Portion palmaire.*

Lorsque la cubitale a dépassé l'os pisiforme, elle descend d'abord verticalement au-devant du ligament annulaire, puis se recourbe en dehors dans la paume de la main en formant l'arcade palmaire superficielle dont la convexité regarde les doigts, la concavité répond au carpe.

Sa concavité donne de fort petits rameaux aux muscles lombricaux et au ligament annulaire.

Mais sa convexité donne ordinairement cinq branches considérables que l'on compte de dedans en dehors.

La première descend obliquement en dedans sur les muscles du doigt auriculaire dont elle gagne le bord radial pour lui former son rameau collatéral interne. Dans son trajet elle donne beaucoup de ramuscules aux muscles du petit doigt.

Les quatre autres branches descendent dans les espaces interosseux et arrivent ainsi jusqu'aux têtes des os du métacarpe. Là chacune se divise en deux rameaux qui suivent les bords correspondans des doigts auriculaire, annulaire, médius, index et le bord cubital du pouce. Ces rameaux collatéraux s'anastomosent ensemble par arcades à l'extrémité de ces doigts sur lesquels ils répandent des ramuscules ténus soit en devant, soit en arrière.

Les deux arcades palmaires offrent de nombreuses variétés dans leur disposition respective. Ordinairement c'est la superficielle qui fournit le plus grand nombre de branches. Mais d'autres fois elle finit au milieu de la main en donnant seulement deux branches interosseuses, l'une aux muscles du doigt auriculaire et à son bord cubital, l'autre au quatrième espace interosseux, divisée en deux collatérales pour le bord radial de l'auriculaire et pour le bord cubital du médius. Toutes les autres branches digitales partent alors de l'arcade palmaire profonde.

Remarques sur la disposition générale du système artériel des membres supérieurs.

Nous avons vu qu'un seul tronc vasculaire fournissoit à chaque membre supérieur toutes les artères qui lui appartiennent. Ce tronc né de l'aorte à sa sortie du thorax, forme aussitôt en se portant en dehors une grande courbure qui embrasse la première côte, s'écarte ensuite progressivement du thorax, et descend verticalement le long du bras jusqu'à sa partie inférieure. Là il se divise en deux branches volumineuses qui suivent l'avant-bras dans toute son étendue, se recourbent enfin en sens opposé l'une à l'autre dans l'épaisseur de la main pour finir en s'anastomosant ensemble soit par elles-mêmes, soit par leurs principaux rameaux.

Jetons maintenant un coup d'œil rapide sur l'ensemble des vaisseaux que ce tronc unique fournit par ses trois portions, et sur les deux branches qui le terminent.

1°. Les branches qui naissent de la sous-clavière peuvent se rapporter à trois ordres.

Les unes appartiennent au cou. Les plus considérables sont la thyroïdienne inferieure et la cervicale profonde. La première se perd presque toute entière dans la glande thyroïde en fournissant seulement aux muscles antérieurs du cou des rameaux nombreux. La seconde appartient spécialement aux muscles postérieurs du cou et fournit seulement quelques rameaux aux scalènes.

Le second ordre de branches est destiné à l'épaule.

Deux troncs principaux les fournissent; ce sont les scapulaire postérieure et supérieure; souvent même elles ont une origine commune. L'une et l'autre appartiennent principalement aux fosses sus-épineuse et sous-épineuse de l'omoplate et aux muscles qui meuvent cet os en arrière.

Enfin le troisième ordre formé par les artères intercostale supérieure et thorachique interne appartient à la cavité du thorax. L'intercostale se distribue à sa partie supérieure. La thorachique interne distribuée à sa partie antérieure finit par de nombreux rameaux répandus soit dans le diaphragme, soit dans la paroi antérieure de l'abdomen.

Cette dernière artère est sans contredit la branche la plus remarquable que la sous-clavière fournisse. C'est elle qui parcourt le trajet le plus étendu et qui établit enfin par sa grande anastomose avec l'épigastrique la communication la plus directe entre le système artériel des membres supérieurs et celui des membres inférieurs. Au reste, cette communication doit être considérée d'une manière purement anatomique, et je suis fort éloigné d'admettre comme prouvées les conséquences physiologiques qu'on en tiroit autrefois (1).

---

(1) On sait que les physiologistes ont long-temps regardé l'anastomose de la thorachique interne avec l'épigastrique comme le moyen naturel des rapports sympathiques qui lient entre eux chez la femme les organes génitaux et mammaires; explication ingénieuse sans doute et spécieuse au premier aperçu, mais qui ne se lie point assez rigoureusement avec les faits et qui ne peut s'appliquer à plusieurs d'entre eux.

2°. Les branches fournies par l'axillaire peuvent aussi être distinguées en trois ordres. Les unes appartiennent au thorax et à la mamelle: ce sont les thoraciques. Les autres appartiennent à l'épaule ; un seul tronc les produit ; elles se distribuent principalement aux fosses sous-scapulaire et sous-épineuse. Les dernières sont destinées à la partie supérieure du bras : ce sont les circonflexes et la plus grande partie de l'acromiale; elles se distribuent en entier soit à l'articulation, soit au muscle deltoïde, agent essentiel des grands mouvemens de l'humérus.

3°. On doit remarquer que la brachiale fournit un assez petit nombre de branches. Presque toutes naissent de sa partie supérieure. Les unes peu multipliées s'enfoncent aussitôt dans les muscles biceps et brachial antérieur, et suivent ces muscles jusqu'auprès de leur attache inférieure. Une autre beaucoup plus considérable et plus importante contourne l'humérus en dedans et en arrière pour se distribuer au brachial postérieur et finit autour de l'articulation du coude par de nombreuses anastomoses avec les radiale et cubitale. Cette disposition vasculaire, essentielle à connoître dans la pratique chirurgicale, explique comment la circulation peut être entretenue à l'avant-bras malgré la ligature de l'artère brachiale, et détermine à quelle hauteur cette ligature peut être faite.

4°. Si nous considérons maintenant la disposition des branches par lesquelles la brachiale se termine, nous verrons, 1°. que l'une et l'autre occupent la partie antérieure de l'avant-bras, c'est-à-dire l'endroit où les muscles les plus nombreux se trouvent accumulés, tandis qu'une seule branche fournie par une

d'elles va se distribuer à la partie postérieure garnie de muscles moins multipliés ; 2°. que ces deux branches se portent ensuite également à la paume de la main dans laquelle la radiale s'enfonce profondément, tandis que la cubitale en occupe la superficie. Le dos de la main ne reçoit au contraire que de fort petits rameaux.

Il y a donc soit à l'avant-bras, soit à la main, un rapport évident entre la disposition des vaisseaux artériels et le sens dans lequel les mouvemens les plus étendus doivent s'opérer, puisque les principales artères sont placées du côté des muscles fléchisseurs et que toujours la flexion prédomine sur l'extension qui n'en est pour ainsi dire que le moyen préparatoire.

Nous remarquerons aussi qu'à l'avant-bras les artères radiale et cubitale fournissent toujours des rameaux assez petits, quoique multipliés. Au contraire, dans la paume de la main, ces deux vaisseaux recourbés en arcade et anastomosés ensemble donnent naissance à une foule de branches extrêmement volumineuses et rapprochées. Il semble même qu'il y ait ici disproportion entre les vaisseaux et les organes, puisque la main est encore plus pourvue de tendons que de muscles, et que les branches les plus considérables sont précisément les collatérales placées sur les doigts où aucun muscle ne se trouve. Assurément on ne peut point penser que ces derniers vaisseaux soient uniquement destinés à la nutrition des parties sur lesquelles ils se répandent. Leurs anastomoses mutuelles en arcade, le petit nombre de rameaux qu'ils donnent, tout concourt à éloigner cette idée.

Il faut donc nécessairement en revenir ici à cet autre but important de la circulation générale, reconnu et prouvé par Bichat, je veux dire l'excitation des organes destinés à opérer de grandes ou de nombreuses fonctions. Alors on remarquera que la main est l'agent principal de la locomotion, et spécialement de cette locomotion tactile qui pour s'exercer utilement doit être aussi sûre et précise que rapide et variée, et on ne sera plus surpris qu'un mouvement artériel considérable soit nécessaire dans un pareil organe. Ce rapport intéressant seroit porté sans peine au plus haut degré d'évidence par des détails physiologiques plus étendus, si c'étoit ici le lieu d'y insister.

III. DES ARTÈRES QUE FOURNIT L'AORTE PAR SA PORTION THORACHIQUE.

L'aorte, depuis l'endroit où elle s'engage entre les deux plèvres en arrière jusqu'à celui où elle passe entre les appendices diaphragmatiques, fournit un assez grand nombre de branches qu'on peut distinguer en antérieures et latérales.

§ Ier. *Branches antérieures.*

Ce sont les bronchiques, les œsophagiennes, et les médiastines postérieures.

Artères bronchiques.

Pour l'ordinaire on n'en compte que deux, une de chaque côté.

L'artère bronchique droite naît de l'aorte, tantôt seule, tantôt et plus souvent par un tronc commun avec la première intercostale aortique qui lui est un peu inférieure en volume. Dès son origine elle donne quelques ramuscules à l'œsophage, et se dirige en devant pour se porter, en formant quelques flexuosités, sur la partie postérieure de la bronche. Dans ce trajet elle fournit quelques ramuscules à la plèvre, à la partie postérieure du péricarde, aux glandes bronchiques.

Quelquefois on trouve une seconde bronchique droite née de l'aorte au-dessous de la précédente et dirigée aussitôt sur la bronche où elle se comporte comme la première.

L'artère bronchique gauche, lorsqu'elle vient isolément de l'aorte, naît à côté et au niveau de la droite, fournit des rameaux aux mêmes parties et se porte sur la partie postérieure de la bronche gauche où elle se divise de même sans offrir rien de particulier.

Il est très-ordinaire de trouver une seconde bronchique gauche inférieure à la précédente et née de l'aorte tantôt par un tronc commun avec elle, tantôt isolément et beaucoup plus bas, au niveau de la troisième ou quatrième intercostale aortique. Elle accompagne la veine pulmonaire supérieure gauche, donne des rameaux à l'œsophage, puis aux glandes bron-

chiques, etc., et se divise sur la bronche comme les autres.

Très-souvent les deux artères bronchiques ordinaires naissent par un tronc commun. Presque toujours alors ce tronc naît de l'aorte avec la première intercostale aortique droite, et lui est supérieur pour le volume. Il se porte entre la bronche droite et le tronc correspondant de l'artère pulmonaire, se divise ensuite en deux branches dont la plus petite gagne le poumon gauche, la plus grosse le poumon droit. Celle-ci donne alors quelques ramuscules à l'œsophage. L'une et l'autre se divisent en plusieurs rameaux avant de se répandre immédiatement sur les bronches.

Beaucoup d'autres variétés s'observent selon les individus soit pour le nombre, soit pour le mode d'origine des artères bronchiques. Il seroit aussi inutile que fastidieux d'y insister davantage.

Dans tous les cas, chaque artère parvenue sur la bronche se divise aussitôt pour accompagner par deux ou trois rameaux flexueux chacune des divisions de ce conduit. Leurs ramuscules se distribuent principalement à la bronche; plusieurs cependant se jettent dans la substance propre du poumon, et sur les parois des artères et des veines pulmonaires.

Il est certain que les artères bronchiques appartiennent au système artériel général, et qu'elles portent dans le tissu pulmonaire un sang déjà préparé par la respiration, destiné à la nutrition de l'organe; qu'au contraire l'artère pulmonaire appartient au système veineux général, et porte dans les poumons un sang noir destiné à être élaboré par l'air. Cepen-

dant les anatomistes les plus distingués, tels que Ruysch, Cowper, Bidloo, et enfin Haller, assurent avoir vu de grandes et sensibles anastomoses entre les artères bronchiques et les rameaux de l'artère pulmonaire (1). Ce fait mérite de fixer l'attention des physiologistes.

Artères œsophagiennes.

Leur nombre varie beaucoup. On en trouve tantôt deux, tantôt cinq ou six. Leur volume égale à-peu-près celui des bronchiques. Nées de la partie antérieure de l'aorte, elles se recourbent presque aussitôt à droite et en bas pour se porter sur la partie antérieure ou latérale gauche de l'œsophage. Dans ce petit trajet elles donnent de nombreux ramuscules soit aux plèvres, soit aux parois de l'aorte et au canal thorachique. Ensuite elles se ramifient à l'extérieur de l'œsophage, s'enfoncent bientôt dans l'épaisseur de ses parois, et se distribuent soit à la portion musculeuse, soit à la membrane muqueuse. La plus inférieure des œsophagiennes s'anastomose avec les rameaux œsophagiens ascendans fournis par la branche gastrique supérieure de l'artère cœliaque.

Artères médiastines postérieures.

On comprend sous ce nom une foule de rameaux fort ténus qui naissent antérieurement de l'aorte dans

(1) *Cum arteria pulmonali evidentissimis et magnis anastomosibus bronchiales communicant.* Haller, Fascic. anat. *Tab. arter. bronchial.*

toute sa portion thorachique. Le nombre de ces rameaux est toujours incertain et variable. Les uns paroissent se perdre dans le tissu cellulaire du médiastin postérieur, les autres se répandent sur les plèvres et sur l'œsophage. Mais le plus grand nombre appartient aux parois de l'aorte elle-même. On voit ces rameaux se recourber aussitôt après leur origine, et se porter transversalement ou obliquement sur l'aorte en formant beaucoup de flexuosités, et en se subdivisant de manière à former par leurs anastomoses mutuelles plusieurs réseaux plus ou moins compliqués. De ces rameaux, les uns vont s'unir aux intercostales aortiques, les autres remontent jusque sur la courbure de l'aorte et s'y perdent. J'ai vu quelques-uns de ces derniers s'anastomoser par arcades avec des rameaux thymiques produits par la thorachique interne.

§ II. *Branches latérales. Artères intercostales aortiques.*

Il y a ordinairement neuf intercostales aortiques de chaque côté, l'intercostale supérieure fournissant les deux premiers espaces. Quand celle-ci s'étend plus loin, les aortiques sont moins nombreuses. Quelquefois enfin, mais plus rarement, l'aorte fournit elle-même la première intercostale.

Considérées de l'un et de l'autre côté, ces artères se ressemblent presque entièrement, et diffèrent seulement en étendue, les droites étant plus longues que les gauches de toute la largeur de l'œsophage sous lequel elles passent.

Toutes les intercostales naissent de la partie latérale et postérieure de l'aorte, dans l'endroit où elle repose sur le corps des vertèbres. Elles se dirigent aussitôt plus ou moins obliquement en haut et en dehors sur la colonne vertébrale, de manière à former avec l'aorte un angle rentrant fort aigu en haut. Ces angles sont très-prononcés à l'origine des premières intercostales; ils sont plus ouverts inférieurement, mais jamais ils ne sont droits. Il résulte de cette disposition que chaque intercostale naît plus bas que l'espace auquel elle doit appartenir, et que pour gagner cet espace elle est obligée de remonter plus ou moins sur les vertèbres.

Les intercostales droites contournent en grande partie le corps des vertèbres placées dans la gouttière que chaque corps présente jusqu'à l'articulation de la tête des côtes. L'œsophage et la veine azygos les recouvrent et les croisent dans ce petit trajet. Les intercostales gauches parviennent à cette même articulation des côtes par un trajet beaucoup plus court et n'occupent le corps des vertèbres que dans une fort petite étendue. La plèvre et les ganglions thoraciques sont les seules parties qui les recouvrent.

Près de l'articulation des côtes avec le corps des vertèbres, les intercostales placées dans les intervalles qui leur appartiennent se divisent chacune en deux branches, l'une dorsale, l'autre thoracique.

Branches dorsales. Chacune d'elles se porte en arrière entre les apophyses transverses correspondantes, placée en dedans du ligament costo-transversaire. Elle donne plusieurs rameaux dont les uns se répandent sur le périoste des vertèbres, les autres

vont, soit en haut, soit en bas, former des arcades anastomotiques avec les rameaux des dorsales voisines. Un autre rameau s'introduit par le trou de conjugaison correspondant dans le canal vertébral et se distribue au névrilème de la moelle. Ensuite la branche dorsale traverse horizontalement les faisceaux du transversaire épineux, descend entre lui et le long dorsal, et se perd enfin dans ses muscles et dans le sacro-lombaire. Quelques-uns de ces rameaux traversent le grand dorsal ou le trapèze et vont à la peau.

Branches thorachiques. Ce sont les plus volumineuses; elles peuvent même être regardées comme la continuation des artères. Chacune suit l'espace intercostal correspondant, placée d'abord entre la plèvre et le muscle intercostal externe et environnée de beaucoup de graisse. Bientôt elle se divise en deux branches secondaires qui s'engagent toutes deux entre les deux muscles intercostaux externe et interne.

La branche inférieure, assez petite pour l'ordinaire, suit pendant quelque temps le bord supérieur de la côte qui est au-dessous, se dirige obliquement ensuite sur la face interne de cette côte et se perd sur le périoste par plusieurs rameaux ténus.

La branche supérieure, beaucoup plus grosse, suit le bord inférieur de la côte qui est au-dessus, placée dans la gouttière que ce bord présente. Vers le tiers antérieur de la côte, elle quitte ce bord et occupe à-peu-près le milieu de l'espace intercostal. Là elle donne plusieurs rameaux dont les uns traversent le muscle intercostal externe pour se jeter dans les muscles extérieurs du thorax, les autres se distribuent

aux muscles intercostaux et s'anastomosent avec les rameaux de la branche inferieure.

Parvenue à la partie antérieure du thorax, les branches thorachiques qui répondent aux vraies côtes s'anastomosent avec les branches externes de la thorachique interne; celles qui répondent aux fausses côtes se ramifient dans les muscles de l'abdomen en s'unissant aux rameaux de la thorachique interne, de l'épigastrique et de la circonflexe iliaque.

Cette disposition est commune à toutes les intercostales. La dernière offre cependant quelques différences. Son origine est cachée par l'appendice diaphragmatique à laquelle elle donne quelques rameaux. Après avoir fourni sa branche dorsale, elle suit le bord inférieur de la dernière côte, et vers le milieu de la longueur de cet os se divise en deux ou trois branches. L'une continue à se porter en dehors et se perd dans les muscles larges de l'abdomen. Les autres descendent verticalement entre les muscles obliques abdominaux et se portent jusque vers la crête iliaque en se divisant en plusieurs rameaux qui se distribuent à ces muscles et s'anastomosent soit avec les lombaires, soit avec la circonflexe iliaque.

Quelquefois la dernière intercostale manque tout-à-fait, et se trouve suppléée par des rameaux de l'avant-dernière, ou par ceux de la première lombaire.

IV. DES ARTÈRES QUE FOURNIT L'AORTE PAR SA PORTION ABDOMINALE.

En donnant les dernières intercostales, l'aorte s'engage entre les appendices diaphragmatiques, pénètre

dans l'abdomen et descend sur le corps des vertèbres jusqu'à la dernière lombaire.

Dans ce trajet elle fournit des artères assez considérables et importantes qu'on peut distinguer en antérieures, latérales, supérieures et inférieures.

§ Ier. *Artères fournies antérieurement par l'aorte abdominale.*

Ces artères sont : la cœliaque, la mésentérique supérieure et la mésentérique inférieure.

Artère cœliaque.

C'est la plus courte de toutes celles que fournit l'aorte abdominale. Elle naît de ce tronc vasculaire avant qu'il sorte de l'intervalle des appendices diaphragmatiques, et forme avec lui à cette origine un angle droit. Dirigée horizontalement en avant et un peu à droite, elle se divise après un demi-pouce de trajet tout au plus en trois branches d'inégal volume qui sont les artères gastrique supérieure, hépatique et splénique.

L'artère cœliaque est renfermée dans l'écartement postérieur des deux feuillets de l'épiploon gastro-hépatique. Elle correspond en haut au côté gauche du lobule du foie, en bas au bord supérieur du pancréas sur lequel elle appuie, à gauche à l'orifice cardiaque de l'estomac, à droite elle est séparée de l'orifice pylorique par un espace assez considérable qu'occupe le petit épiploon.

Dans son court trajet la cœliaque tantôt ne donne

aucune branche, tantôt et assez souvent fournit quelques rameaux pancréatiques ainsi que les artères diaphragmatiques inférieures et capsulaires que nous décrirons plus tard.

1°. *Artère gastrique supérieure.*

On la nomme ordinairement *coronaire stomachique*. C'est la moins volumineuse des trois. Née de la cœliaque elle se dirige en haut, se recourbe presque aussitôt à gauche, et parvenue au côté droit de l'orifice cardiaque, continue à se recourber en bas pour se porter sur le bord concave de l'estomac qu'elle suit jusqu'au pylore où elle s'anastomose avec le rameau pylorique fourni par l'artère hépatique. Quelquefois elle ne fait que la moitié de ce trajet, le rameau pylorique s'avançant plus loin qu'à l'ordinaire et venant la rencontrer au milieu du bord concave.

On doit remarquer que l'artère gastrique supérieure placée entre les deux feuillets de l'épiploon gastro-hépatique répond à l'endroit où ces deux feuillets adhèrent ensemble après avoir formé par leur écartement l'espace triangulaire dont nous avons parlé en décrivant l'estomac.

Dans son trajet cette artère donne un assez grand nombre de branches qu'on peut distinguer en œsophagiennes et stomachiques.

Branches œsophagiennes. Les unes sont verticales, les autres transverses. Les verticales varient en nombre; souvent il n'y en a qu'une seule. Nées de la convexité de la courbure que forme l'artère gastrique à côté de l'œsophage, elles remontent sur ce conduit

qu'elles suivent jusque dans la poitrine. Leurs rameaux plus ou moins nombreux serpentent quelque-temps sur la surface extérieure de l'œsophage, pénètrent son tissu musculaire auquel ils se distribuent ainsi qu'à la tunique muqueuse en s'anastomosant avec les artères œsophagiennes aortiques.

Les branches transverses nées au même endroit que les précédentes se portent dans le sens que leur nom indique sur les parties antérieure et postérieure de l'orifice cardiaque de l'estomac qu'elles embrassent en se subdivisant pour pénétrer enfin entre les tuniques et s'y distribuer en s'anastomosant avec les rameaux gastriques de l'artère splénique connus sous le nom de vaisseaux courts.

Branches stomachiques. Elles naissent des parties latérales de la gastrique pendant son trajet sur le bord concave de l'estomac et se portent sur les deux faces de cet organe. Leur nombre est incertain; leur volume varie aussi beaucoup. Subdivisées sur l'estomac elles s'anastomosent avec les rameaux fournis par les branches gastriques inférieures.

Très-souvent l'artère gastrique supérieure appartient au foie autant qu'à l'estomac, ce qui lui a fait donner par quelques uns le nom de *gastro-hépatique.* Dans ce cas elle est à-peu-près aussi volumineuse que l'hépatique. Peu après son origine elle se divise en deux branches inégales, dont la plus grosse dirigée un peu en arrière remonte vers le sillon transversal du foie, s'y enfonce et se subdivise dans cet organe en s'anastomosant avec les rameaux de l'artère hépatique. La seconde branche gagne l'estomac et s'y distribue comme nous l'avons dit tout-à-l'heure.

1°. *Artère hépatique.*

Elle est très-volumineuse comparativement à la précédente. Née de la cœliaque elle se dirige transversalement à droite jusqu'auprès et un peu au-dessus du pylore. Là elle change de direction et remonte obliquement à droite en se rapprochant de la vésicule biliaire et du sillon transversal du foie.

Dans ce trajet l'artère hépatique fournit deux branches fort inégales en volume, 1°. la pylorique ; 2°. la gastrique droite inférieure.

Branche pylorique. Elle naît de la partie antérieure de l'hépatique avant qu'elle ait changé de direction, se porte aussitôt dans un sens rétrograde à cette artère et gagne la petite courbure de l'estomac auprès du pylore. Prolongée plus ou moins sur cette courbure elle se termine en s'anastomosant avec l'artère gastrique supérieure. Dans son trajet elle donne de chaque côté des rameaux qui se répandent sur les deux faces de l'estomac et s'anastomosent avec ceux de la gastrique droite inférieure. Quelquefois cette branche naît plus loin de l'artère hépatique à l'endroit où elle se divise pour pénétrer dans la substance du foie.

Branche gastrique inférieure droite. Elle naît de la partie inférieure de l'hépatique, au moment où cette artère change de direction, au côté droit de l'extrémité pylorique de l'estomac. Son volume assez considérable a donné lieu aux anatomistes de la regarder comme la seconde division de l'hépatique bifurquée. Mais l'hépatique considérée dans le reste de

son trajet la surpasse toujours beaucoup en grosseur.

Cette branche descend verticalement derrière l'estomac jusqu'à la grande courbure de cet organe. Dans ce trajet elle répond en arrière à la portion verticale du duodénum, à gauche, au pancréas. Parvenue à la grande courbure de l'estomac, elle la suit dans toute son étendue, et finit en s'anastomosant avec la gastrique inférieure gauche.

Par sa portion verticale, la gastrique inférieure droite donne des rameaux duodénaux et un rameau pancréatique.

Les rameaux duodénaux naissent à droite, et se jettent aussitôt sur le duodénum où ils se distribuent en s'anastomosant. Leur nombre est incertain, leur volume peu considérable.

Le rameau pancréatique naît à gauche, et se dirige transversalement derrière le pancréas dont il suit la longueur. Il s'y termine en s'anastomosant avec ceux que fournit l'artère splénique. Son existence est constante, mais souvent il vient de la mésentérique supérieure. Je l'ai vu naître isolément de l'hépatique, au même endroit que la gastrique inférieure droite. Toujours il a peu de volume.

Par sa portion horizontale, la branche gastrique, placée sur la grande courbure de l'estomac, donne des rameaux supérieurs et inférieurs.

Les rameaux supérieurs sont en nombre indéterminé. Ils remontent sur les deux faces de l'estomac et s'y distribuent en s'unissant à ceux de la gastrique supérieure et aux divisions de la branche pylorique.

Les rameaux inférieurs sont moins nombreux.

Ils descendent entre les feuillets du grand épiploon, et vont gagner la grande courbure du colon transverse où ils s'anastomosent avec les rameaux des artères coliques.

L'artère hépatique, parvenue près du sillon transversal du foie, au côté droit du lobule de Spigel, se divise en deux branches considérables, l'une droite, l'autre gauche.

La branche droite s'engage au-dessous du conduit hépatique dont elle croise la direction en se portant obliquement en haut et en dehors. Au-delà de ce conduit elle donne un rameau volumineux qu'on nomme *cystique*. Il gagne le col de la vésicule biliaire, fournit un ramuscule constant qui se porte sur la partie inférieure de ce réservoir membraneux et serpente quelque temps entre la tunique sereuse et la muqueuse à laquelle il se distribue. Le rameau lui-même s'enfonce supérieurement entre la vesicule et la substance du foie en se distribuant à l'une et à l'autre.

Après avoir fourni le rameau cystique, la branche droite s'enfonce dans la partie droite du sillon transversal, pénètre le lobe droit du foie et s'y perd.

La branche gauche, dirigée obliquement en haut et en dedans, s'enfonce dans le sillon transversal, entre le lobule de Spigel et le lobe gauche, penètre la substance de celui-ci, et se ramifie dans tous les deux.

Souvent l'artère hépatique se divise en trois branches, en sorte qu'il faut en distinguer une moyenne aux précédentes, moins volumineuse, qui penètre le sillon transversal dans l'endroit où il se réunit au

sillon horizontal, et s'enfonce ensuite dans la substance du foie pour s'y comporter comme les autres.

3°. *Artère splénique.*

Elle est plus volumineuse que l'hépatique chez l'adulte, moins chez l'enfant. Née de la cœliaque, elle se recourbe aussitôt à gauche et suit transversalement cette direction jusqu'à la scissure de la rate. Dans son trajet elle se trouve recouverte par la portion gauche de l'estomac, appuyée sur la partie supérieure du pancréas, et logée dans un léger sillon que cet organe lui présente. Elle fournit des rameaux pancréatiques et une branche gastrique inférieure gauche.

Rameaux pancréatiques. Leur nombre est incertain. Ils naissent inférieurement de la splénique, s'enfoncent aussitôt perpendiculairement dans la substance du pancréas, parallèles les uns aux autres. Subdivisés en ramuscules ténus, ils s'anastomosent avec le rameau pancréatique transverse fourni par la branche gastrique inférieure droite.

Branche gastrique inférieure gauche. Elle naît ordinairement du tronc même de l'artère splénique, quelquefois cependant d'une des divisions qui la terminent. Son volume est assez souvent un peu moindre que celui de la gastrique inférieure droite; d'autres fois il est tel que cette branche paroît être l'artère splénique elle-même continuée, et changeant de direction. Quand cette branche naît du tronc de la splénique, elle remonte un peu à gauche pour aller gagner la grosse extrémité de l'estomac sous laquelle elle

étoit d'abord cachée, et se porter sur sa grande courbure. Quand elle vient d'une des divisions de la splénique, elle descend aussitôt vers cette même courbure dont elle est plus rapprochée. Dans tous les cas, elle contourne ensuite l'estomac inférieurement comme la gastrique droite avec laquelle elle s'anastomose.

Peu après son origine, la branche gastrique gauche donne quelques rameaux pancréatiques peu importans par leur volume, peu constans pour le nombre. Parvenue à la grande courbure, elle fournit comme la gastrique droite des rameaux supérieurs qui vont à l'estomac, des rameaux inférieurs qui vont au colon transverse après un certain trajet entre les lames du grand épiploon.

C'est donc aux deux branches gastriques inférieures réunies qu'est due cette grande arcade artérielle qui borde l'estomac en bas, arcade remarquable par son volume, par sa position et par la manière dont elle est formée. En effet elle avoisine de très-près les parois abdominales, surtout quand l'estomac est distendu. Elle est logée entre les lames épiploïques, dans l'endroit où ces lames se réunissent après avoir formé sur la grande courbure, par leur écartement, cet espace triangulaire dont nous avons parlé ailleurs.

Parvenue à quelque distance de la scissure de la rate, l'artère splénique se divise en plusieurs branches pour y pénétrer. Assez ordinairement sa division primitive n'est qu'en deux ou trois branches qui aussitôt se subdivisent elles-mêmes en un plus ou moins grand nombre de rameaux, le plus souvent en six ou huit. Ces rameaux divergent entre eux suivant la longueur de la rate, et avant d'y pénétrer parcou-

rent un trajet plus ou moins long entre les deux feuillets péritonéaux qui vont de l'estomac à cet organe. C'est dans ce trajet qu'on peut estimer à deux pouces ou deux pouces et demi que les branches spléniques fournissent quelques rameaux assez volumineux mais très-courts, qui vont aussitôt gagner la grosse extrémité de l'estomac près de l'orifice cardiaque et se répandre sur les deux faces de cet organe, en s'anastomosant avec les rameaux œsophagiens transverses fournis par l'artère gastrique supérieure. On les connoît sous le nom de *vaisseaux courts*. Ce sont eux qui complètent à gauche le cercle artériel dont l'estomac est environné de toutes parts. Ces vaisseaux naissent assez souvent du tronc de la splénique un peu avant sa division.

Plongées dans la scissure de la rate, les branches spléniques pénètrent cet organe dans toute son étendue en suivant leur direction primitive. Bientôt elles se subdivisent et forment en s'anastomosant ensemble des arcades et des aréoles multipliées dont les derniers rameaux se perdent dans le tissu intime de l'organe.

Artère mésentérique supérieure.

Cette artère égale au moins la cœliaque en volume mais la surpasse considérablement en longueur. Elle naît de l'aorte un peu au-dessous de la cœliaque, quelquefois confondue avec elle dans son origine qui se trouve alors cachée par le pancréas. Aussitôt elle descend perpendiculairement derrière cette glande et après l'avoir dépassée se trouve au-devant de la portion transversale du duodénum sur lequel elle appuie et

dont elle marque la terminaison. En continuant à se porter en avant et en bas elle passe au côté gauche du méso-colon transverse dans l'endroit où il se réunit au mésentère. Jusque là elle avoit été recouverte soit par le pancréas, soit par le feuillet supérieur du méso-colon. Mais dès qu'elle a dépassé l'origine de ce repli elle s'engage entre les deux lames péritonéales qui constituent le mésentère auquel elle appartient dans tout le reste de son trajet. Elle suit la direction que ce dernier repli présente, et forme dans le milieu de sa largeur une grande courbe dirigée à droite et en bas de manière que la convexité regarde en bas, à gauche et en devant, la concavité à droite, en haut et en arrière. Cette courbe fort éloignée d'abord de l'intestin grêle, s'en rapproche successivement en se prolongeant en bas. Diminuée de volume à mesure qu'elle avance, l'artère se termine enfin vers la région lombaire gauche en s'anastomosant avec une des branches qu'elle-même a fournies.

Près de son origine la mésentérique ne donne que quelques rameaux peu constans et peu remarquables qui se distribuent soit au pancréas, soit au duodénum.

Mais quand elle est parvenue dans le mésentère, elle fournit un grand nombre de branches qu'on peut distinguer en celles qui partent de sa concavité et celles qui naissent de sa convexité.

Branches que donne la mésentérique par sa concavité.

Toutes appartiennent au cœcum et au colon. On en trouve ordinairement trois qu'on nomme *coliques droites* et que l'on distingue en supérieure, moyenne et inférieure. Très-souvent il n'y en a que deux ; une seule branche répondant à la supérieure et à la moyenne : l'inférieure est constamment isolée.

Branche colique droite supérieure. C'est la première que donne la mésentérique en passant au côté gauche du méso-colon transverse. Elle s'engage aussitôt entre les deux lames du méso-colon et se porte horizontalement en devant jusqu'auprès de la partie moyenne du colon. Avant d'y arriver, elle se divise en deux rameaux considérables qui s'écartent l'un de l'autre en formant entre eux un angle plus ou moins aigu. L'un d'eux se recourbe transversalement à gauche en suivant le colon, et parvenu vers la région lombaire s'anastomose avec le rameau ascendant de la colique gauche fournie par la mésentérique inférieure.

L'autre rameau se recourbe transversalement à droite et s'anastomose bientôt avec un rameau semblable de la colique droite moyenne.

Branche colique droite moyenne. Elle naît de la mésentérique un peu au-dessous de la précédente, se dirige obliquement à droite et en avant dans le méso-colon, et se divise bientôt comme la précédente en deux rameaux dont l'un se recourbant à gauche, va s'anastomoser avec le rameau droit de la colique

supérieure, tandis que l'autre se recourbe à droite et en bas, pour s'unir au rameau ascendant de la branche colique droite inférieure.

Lorsque la mésentérique ne donne qu'une seule branche colique au lieu des deux que nous venons de décrire, cette branche se divise bientôt en deux rameaux volumineux qui se comportent ensuite comme les deux branches lorsqu'elles sont isolées.

Branche colique droite inférieure ou *iléo-colique*. Elle est fort rapprochée de la moyenne dans son origine. Son volume est plus considérable. Dirigée transversalement à droite dans la partie correspondante du méso-colon, elle parvient jusqu'auprès du cœcum sans se diviser. Là elle se divise en trois rameaux. L'un remonte dans le méso-colon en se recourbant un peu et s'anastomose bientôt avec le rameau droit de la colique moyenne. L'autre descend dans le mésentère et s'anastomose avec le tronc de la mésentérique. Le troisième né dans l'angle des deux précédens suit la direction de la branche colique elle-même, s'enfonce un peu dans les graisses du méso-colon et se porte à la partie postérieure du colon à l'endroit où il naît du cœcum. Là il donne un ramuscule qui se porte dans le repli péritonéal de l'appendice cœcale, règne tout le long de ce repli et y forme une petite arcade de la convexité de laquelle partent de petits ramuscules parallèles qui vont se rendre sur l'appendice et s'y terminent en s'y subdivisant. Puis il se divise en deux rameaux secondaires qui se portent l'un en haut sur le colon, l'autre en bas sur le cœcum, et s'y subdivisent en une multitude de ramuscules distribués à ces intestins.

On voit d'après cette description que les rameaux des branches coliques forment par leurs anastomoses mutuelles des arcades distinctes réunies à angles aigus à l'endroit où les branches finissent et présentant leur convexité du côté de l'intestin, leur concavité du côté du méso-colon. Ces arcades ne donnent par leur concavité aucun rameau ; mais leur convexité en donne un grand nombre surtout dans les angles rentrans par lesquels elles sont séparées. Plusieurs de ces rameaux se portent dans des directions obliques, se rencontrent et s'anastomosent de manière à former des aréoles de diverse figure, d'où naissent d'autres rameaux secondaires qui vont directement à l'intestin. Mais presque tous en partant des arcades se dirigent parallèlement les uns aux autres jusqu'au colon, et se portent ainsi sur ces deux faces. C'est là seulement qu'ils se subdivisent en ramuscules ténus qui s'enfoncent au-dessous de la tunique séreuse et se ramifient à l'infini dans les tuniques musculeuse et muqueuse où ils se terminent.

Ces rameaux sont éloignés les uns des autres par des intervalles assez larges dans toute l'étendue du colon transverse. Ceux qui vont au cœcum sont beaucoup plus nombreux et plus rapprochés.

Branches que donne la mésentérique par sa convexité.

Elles varient beaucoup en nombre. On en compte ordinairement une vingtaine. Leur volume et leur longueur sont assez exactement en rapport. Les plus supérieures qui sont nécessairement les plus

longues, l'artère se trouvant alors fort éloignée de l'intestin, sont aussi les plus grosses. Les suivantes deviennent toujours plus courtes et plus minces, et enfin celles qui partent de l'arcade formée par l'union de la mésentérique avec la branche colique droite inférieure ne méritent plus que le nom de rameaux, et se portent parallèlement sur l'intestin après un trajet fort court.

Ces branches se dirigent toutes plus ou moins obliquement en bas et à gauche entre les deux lames du mésentère en se rapprochant de l'intestin. Après un certain trajet dont la longueur varie pour chacune, elles se divisent en branches secondaires qui s'écartent à angles très-aigus, se dirigent les uns en haut, les autres en bas, et se rapprochent des branches secondaires voisines avec lesquelles elles s'anastomosent quelquefois, mais assez rarement. Ces branches secondaires se subdivisent bientôt ensuite en rameaux plus ou moins nombreux qui s'écartent de la même manière, rencontrent de plus près les rameaux voisins également subdivisés et s'anastomosent avec eux de tous côtés. Les angles saillans qui résultent de ces anastomoses sont les points d'origine d'autres rameaux secondaires qui se comportent de même et forment par leurs anastomoses mutuelles une multitude d'aréoles diversement configurées, toujours fort irrégulières pour la grandeur et pour la forme. Des ramuscules naissent du contour extérieur de ces aréoles, s'anastomosent, forment des aréoles nouvelles plus petites, et ainsi de suite jusqu'à l'endroit où les deux lames péritonéales cessant d'adhérer ensemble forment près de l'intestin l'espace triangulaire destiné à favo-

riser l'ampliation accidentelle de ce tube membraneux. Là le réseau artériel cesse, et les dernières aréoles qui le formoient donnent naissance à des ramuscules parallèles qui se dirigent isolément au-dessous de l'une et l'autre lame peritonéale pour gagner la surface extérieure de l'intestin auquel ils sont perpendiculaires. Ils se prolongent plus ou moins sur lui entre la tunique séreuse et la musculeuse, puis se subdivisent en ramuscules très-ténus répandus à l'infini et formant un nouveau réseau fort délicat d'autant plus serré qu'on avance davantage. Ils se plongent ainsi dans la tunique musculeuse, parviennent à la muqueuse sur laquelle ils se terminent en devenant capillaires.

Ainsi en observant d'un seul coup d'œil la distribution artérielle depuis la convexité de l'artère mésentérique jusque sur l'intestin, nous voyons d'abord des branches volumineuses isolées, puis un réseau vasculaire formé par les rameaux de ces branches, réseau d'autant plus compliqué qu'on approche plus de l'intestin, puis des rameaux isolés et parallèles nés de ce réseau et dirigés immédiatement sur l'intestin lui-même, puis un nouveau réseau beaucoup plus ténu, né de ces rameaux et terminé par le système capillaire. On peut donc dire que les branches de la mésentérique sont au réseau vasculaire qui leur succède, ce que les rameaux nés de ce réseau sont à la distribution immédiate du système artériel à l'intestin grêle.

Artère mésentérique inférieure.

Elle égale à-peu-près en volume la précédente et naît beaucoup plus bas qu'elle de la partie antérieure de l'aorte, un pouce ou un pouce et demi à-peu-près au-dessus de sa division en iliaques. Elle se dirige aussitôt un peu obliquement à gauche, placée au-dessous du péritoine, puis s'engage entre les deux lames du méso-colon iliaque dans lequel elle forme une courbe beaucoup moins étendue que celle de la mésentérique supérieure, étant toujours placée près du bord adhérent de ce repli. Arrivée au détroit supérieur du bassin, elle se plonge dans l'écartement postérieur du méso-rectum, où elle se divise pour se distribuer au rectum sous le nom d'*hémorroïdale supérieure*.

Dans ce trajet, la mésentérique inférieure donne en dehors par sa convexité un grand nombre de branches ; aucunes ne naissent de sa concavité.

Parmi ces branches qui toutes appartiennent au colon, on en remarque trois principales que l'on nomme *coliques gauches* distinguées en supérieure, moyenne et inférieure.

Branche colique gauche supérieure. C'est la plus volumineuse et la seule constamment distincte. Née de la mésentérique un peu au-dessous de son origine, elle se dirige transversalement à gauche derrière le péritoine, et parvient ainsi jusqu'à quelque distance de la portion lombaire gauche du colon. Là elle se divise en deux rameaux considérables, l'un ascendant l'autre descendant.

Le rameau ascendant suit le bord concave du colon lombaire jusqu'au colon transverse, en se recourbant de manière à former une arcade dont la convexité répond à l'intestin. Il s'anastomose bientôt avec le rameau gauche de la colique droite supérieure fournie par la mésentérique supérieure. Le rameau descendant se porte inférieurement dans une direction semblable jusqu'au méso-colon iliaque où il s'anastomose avec le rameau ascendant de la colique gauche moyenne.

Branches coliques gauches moyenne et inférieure. Je réunis ces branches dans une même description, parce que leur nombre varie beaucoup et que d'ailleurs elles ont toutes une disposition semblable.

Souvent au lieu de deux on en trouve trois ou quatre tout-à-fait distinctes à leur origine. D'autres fois on les voit naître de la mésentérique par deux origines seulement, mais se diviser aussitôt en nombre indéterminé. Toutes se portent obliquement en bas, entre les deux lames du méso-colon iliaque, et avant d'arriver à l'intestin se divisent chacune en deux rameaux, l'un ascendant, l'autre descendant. Ces rameaux s'anastomosent entre eux, forment ainsi des arcades plus ou moins nombreuses qui, par leur convexité, fournissent un grand nombre de rameaux secondaires. Ceux-ci se portent d'abord parallèlement vers l'intestin, puis se subdivisent avant d'y arriver, et forment par leurs anastomoses quelques aréoles desquelles partent enfin d'autres ramuscules parallèles qui vont immédiatement se rendre sur les deux faces du colon iliaque. Ces aréoles sont en général

peu nombreuses; souvent il n'en existe pas, et les rameaux nés des arcades vont en droite ligne à l'intestin. Parvenus sur cet organe, ils s'y comportent comme ceux de la mésentérique supérieure.

Le rameau descendant fourni par la plus inférieure des branches coliques gauches, se porte sur la face postérieure du rectum où il se subdivise et s'anastomose avec les autres rameaux que donne la mésentérique dans sa terminaison.

Lorsque la mésentérique inférieure a fourni les branches coliques, elle diminue de volume, prend une direction perpendiculaire et descend dans l'excavation du bassin, placée sur la face postérieure du rectum et logée dans l'écartement des deux lames du méso-rectum. Bientôt elle se divise en deux branches qui s'écartent et gagnent les parties latérales du rectum. Souvent une de ces branches en donne peu après une autre secondaire qui descend sur le milieu du même intestin. Ces branches descendent perpendiculairement, superficielles d'abord, puis bientôt engagées entre les fibres musculeuses longitudinales où elles sont presque entièrement cachées. Elles diminuent progressivement de volume et finissent par des rameaux extrêmement minces. Dans ce trajet elles donnent un grand nombre de rameaux qui naissent presque tous à angles droits et se portent transversalement sur le contour du rectum qu'ils embrassent en se subdivisant entre ses tuniques où ils se perdent, réunis et confondus avec ceux des branches hémorroïdales moyenne et inférieures. Quelques-uns de ces rameaux, au lieu de se porter sur le rectum, suivent en arrière la lame péritonéale correspondante, et vont

sur les côtés du sacrum s'anastomoser avec les artères sacrées latérales, branches de l'hypogastrique.

§ II. *Artères fournies latéralement par l'aorte abdominale.*

Ces artères sont les capsulaires, les rénales, les spermatiques et les lombaires.

Artères capsulaires.

On les nomme ordinairement *capsulaires moyennes* par opposition avec les branches que donnent aux capsules en haut les diaphragmatiques, en bas les rénales.

Il y a une capsulaire de chaque côté. Leur volume est très-petit. Nées pour l'ordinaire de l'aorte, quelquefois de la cœliaque, elles se dirigent transversalement sur les côtés de la colonne vertébrale jusqu'au bord antérieur des capsules. Là elles se divisent en plusieurs branches qui s'enfoncent dans ces organes et s'y distribuent. Avant d'y arriver, elles donnent plusieurs rameaux au tissu graisseux environnant et même aux appendices diaphragmatiques.

Artères rénales.

Ce sont les plus volumineuses et en même temps les plus courtes que fournisse l'aorte abdominale. Le plus ordinairement il n'y en a qu'une de chaque côté, mais il n'est point rare d'en trouver deux et même trois. Nous supposons ici le premier cas.

Nées au-dessous des artères capsulaires, les rénales forment chacune pour l'ordinaire avec l'aorte deux angles droits ou fort rapprochés des droits. Elles naissent à-peu-près l'une vis-à-vis de l'autre; souvent cependant la rénale gauche naît un peu plus haut que la droite. Dirigée transversalement sur les côtés du corps des vertèbres, au-devant d'un tissu graisseux abondant, derrière la veine rénale et le péritoine, chacune arrive, après un trajet fort court, au rein auquel elle appartient. La droite a cependant un peu plus de longueur que la gauche, l'aorte ne se trouvant pas directement sur la ligne médiane. Cette rénale droite est placée tantôt devant, tantôt derrière la veine cave inférieure.

Dans leur trajet les rénales fournissent un nombre indéterminé de branches toutes fort petites. Les unes supérieures vont aux capsules et s'y perdent en s'anastomosant avec les artères capsulaires aortiques. Les autres inférieures se perdent dans le tissu graisseux extérieur du rein; on les a nommées quelquefois *branches adipeuses*. Très-souvent les artères spermatiques naissent aussi inférieurement des rénales.

Parvenue à quelque distance de la scissure du rein la rénale se divise en deux, trois ou quatre branches considérables. Ces branches, écartées les unes des autres, s'introduisent dans le rein au-dessus de l'origine de l'uretère, et se divisent en un nombre variable de branches secondaires qui se portent entre les parois du bassinet et la substance propre du rein, et suivent les calices jusqu'à l'endroit où ils embrassent les tubercules mamelonnés. Là chaque branche se divise en

plusieurs rameaux qui contournent la portion correspondante de substance tubuleuse, et forment autour d'elle, en s'anastomosant ensemble, une arcade sensible dont la convexité répond à la substance corticale. Les ramuscules très-nombreux que donnent en tout sens ces arcades se répandent soit dans la substance tubuleuse, soit dans la corticale; on en a même vu quelques-uns traverser entièrement cette dernière pour se jeter dans le tissu graisseux dont le rein est environné.

Cette distribution artérielle dans l'intérieur du rein ne se fait pas toujours avec autant de régularité. Souvent on ne voit point ces arcades qui circonscrivent les portions de la substance tubuleuse, et les rameaux paroissent se répandre sans aucun ordre sensible dans l'une et l'autre substance à la fois.

Lorsqu'il y a deux ou trois artères rénales de chaque côté, tantôt elles naissent à peu de distance les unes des autres, et se portent parallèlement pour pénétrer toutes ensemble par la scissure du rein, tantôt une d'elles naît beaucoup plus bas, remonte obliquement et entre dans le rein par son extrémité inférieure.

Artères spermatiques.

On en trouve une de chaque côté, rarement deux. Leur volume est aussi petit que leur longueur est considérable. Elles naissent de l'aorte tantôt en devant, tantôt latéralement; souvent ce sont les rénales qui les fournissent.

Dans tous les cas, elles se portent sur les côtés de la colonne vertébrale, descendent presque verticale-

ment sur les muscles psoas dont elles croisent enfin très-obliquement la direction pour se comporter ensuite différemment chez l'homme et chez la femme.

Toutes deux, dans ce premier trajet, sont placées derrière le péritoine. La droite est tantôt devant, tantôt derrière la veine cave. Toutes deux sont extrêmement flexueuses. Elles donnent des rameaux fort petits qui se perdent dans les graisses voisines, dans les glandes lymphatiques, dans les parois des uretères. Quelquefois, parvenue vers le détroit supérieur du bassin, la spermatique se divise en deux branches d'égal volume, dont l'une remonte obliquement en dehors pour se perdre dans les graisses extérieures du rein, tandis que l'autre continue le trajet ordinaire de l'artère.

Vers le milieu ou vers la partie inférieure du bord saillant du psoas, l'artère spermatique croise ce bord en se dirigeant en-dedans. Chez l'homme elle se place à côté du conduit déférent, sort avec lui par l'anneau inguinal et va au testicule. Dans ce trajet elle donne de petits rameaux au conduit déférent et au crémaster. Enfin elle se divise en un grand nombre de rameaux dont les uns s'introduisent dans l'épididyme par son tubercule arrondi, les autres traversant la tunique albuginée se plongent dans la substance propre du testicule. Les uns et les autres se perdent ensuite dans ces deux corps et n'offrent plus rien de remarquable dans leur distribution.

Chez la femme l'artère spermatique, après avoir croisé le bord du psoas, s'enfonce dans l'excavation du bassin et se porte à l'ovaire. De ses rameaux les uns traversent la membrane fibreuse de ce corps

dans lequel ils se perdent, les autres vont se répandre à la trompe, au ligament rond et aux parties latérales de la matrice, en s'anastomosant avec l'utérine.

Artères lombaires.

On pourroit nommer celles-ci branches postérieures, si l'on n'avoit égard qu'à leur point d'origine, car elles naissent plutôt de la partie postérieure que de la partie latérale de l'aorte. Mais comme elles se dirigent toutes en dehors primitivement et qu'elles se distribuent principalement aux muscles latéraux de la colonne vertébrale, nous ne croyons pas devoir en former ici une classe séparée.

Les artères lombaires sont assez ordinairement au nombre de cinq comme les vertèbres de la même région. Souvent cependant il ne s'en trouve que quatre; quelquefois même il n'y en a que trois, et dans ces deux cas elles se subdivisent de manière à former auprès des trous de conjugaison le nombre ordinaire de cinq. Leur volume surpasse constamment celui des intercostales. Toujours elles se dirigent plus ou moins transversalement depuis l'aorte jusqu'auprès des apophyses transverses, et dans ce trajet correspondent chacune à la gouttière que présente dans son milieu le corps de chaque vertèbre. Toujours à la base des apophyses transverses chaque artère se divise en branche postérieure ou dorsale qui s'enfonce dans les muscles du dos en donnant par le trou de conjugaison un rameau à la moelle, et branche antérieure ou lombaire proprement dite qui se répand dans les muscles des lombes et du bassin.

Tels sont les caractères communs de toutes les artères lombaires. Mais comme chacune d'elles présente en outre une disposition particulière et des rapports différens, on ne peut les connoître avec exactitude lorsqu'on continue à les décrire collectivement, et il faut de toute nécessité en venir à la description particulière, mais abrégée, de chacune. J'observe seulement que les branches postérieures se perdant toutes dans la masse commune et confuse du muscle sacro-spinal, ne méritent pas d'être comprises dans ces détails individuels; il suffit de les indiquer à mesure qu'elles se présentent.

1re *Artère lombaire.*

Elle a quelque analogie avec les intercostales. Cachée entièrement à son origine par l'appendice diaphragmatique, elle suit la gouttière de la première vertèbre lombaire jusqu'à la base de l'apophyse transverse. Là elle se divise en deux branches. L'une dorsale descend un peu, puis s'engage entre les deux apophyses transverses correspondantes, donne un rameau à la moelle par le trou de conjugaison et se jette ensuite dans les muscles du dos. L'autre lombaire se porte en dehors, au-dessous du bord inférieur de la dernière fausse côte en suivant exactement l'attache du diaphragme. Ainsi elle se recourbe en bas et descend enfin presque verticalement entre le péritoine et le muscle transverse abdominal dans lequel elle se perd.

Quelquefois cette première lombaire manque tout-

à-fait. Ailleurs le même sujet la présente d'un côté tandis qu'elle manque de l'autre.

2e *Artère lombaire.*

Elle naît au niveau du fibro-cartilage qui unit les seconde et troisième vertèbres lombaires, remonte un peu, devient transversale et suit la gouttière de la seconde vertèbre en passant sous le tendon de l'appendice diaphragmatique, puis sous l'attache supérieure du psoas. Sa division a lieu plus ou moins loin de l'apophyse transverse. La branche dorsale se comporte comme à l'ordinaire. La lombaire, assez petite, s'enfonce en se recourbant inférieurement dans l'épaisseur du quarré des lombes et s'y perd.

3e *Artère lombaire.*

Elle naît au niveau du fibro-cartilage qui unit les troisième et quatrième vertèbres, remonte et suit transversalement la gouttière de la troisième où elle est bientôt couverte en dehors par le psoas. Avant de se diviser, elle donne à ce muscle plusieurs rameaux dont un volumineux descend assez loin entre ses fibres. Ensuite elle se divise. La branche dorsale n'a rien de particulier. La lombaire, très-volumineuse, s'enfonce entre le quarré des lombes et le transverse abdominal, se porte, en se recourbant, jusqu'à la crête iliaque, vers l'union de son tiers postérieur à ses deux tiers antérieurs. Là elle se divise en deux gros rameaux qui, rapprochés l'un de l'autre, traversent les muscles abdominaux près de leur attache,

et descendent en arrière dans les muscles fessiers où ils se perdent en s'anastomosant avec les divisions de la fessière, branche de l'hypogastrique.

4° *Artère lombaire.*

Elle naît au niveau de la quatrième vertèbre, suit aussitôt transversalement la gouttière, cachée presque entièrement par le psoas, et plus profondément par une des branches du plexus lombaire. Elle se divise ensuite en branche dorsale et branche lombaire. Celle-ci très-considérable se dirige transversalement entre le psoas et l'attache inférieure du quarré, fournit plusieurs rameaux volumineux qui se répandent en dehors sur le muscle iliaque; puis elle traverse l'attache du quarré et des abdominaux à la crête iliaque, descend dans les muscles fessiers et s'y perd comme la précédente.

Lorsque la cinquième artère lombaire manque, ce qui arrive souvent, c'est la quatrième qui la supplée. Elle se divise alors, vers le milieu de son trajet sur le corps de la vertèbre, en deux grosses branches. L'une forme la continuation de la quatrième artère et se comporte comme nous venons de le dire. L'autre descend sur le côté du corps des vertèbres, couverte par le plexus lombaire jusqu'au niveau du dernier trou de conjugaison, donne là une branche dorsale, comme celle que fournit ailleurs la cinquième lombaire, puis se détourne obliquement en dehors et se ramifie sur le muscle iliaque en s'anastomosant avec l'ilio-lombaire, branche de l'hypogastrique. D'autres fois cette seconde branche s'enfonce toute entière

dans le trou de conjugaison, formant elle-même la cinquième dorsale, sans donner aucun rameau en dehors.

5e *Artère lombaire.*

Elle manque souvent. Lorsqu'elle existe, elle naît tantôt de l'aorte par un tronc commun avec la sacrée moyenne ou avec la cinquième lombaire opposée, tantôt de l'iliaque primitive. C'est tout ce qu'elle a de remarquable, sa distribution ressemblant d'ailleurs tout-à-fait à celle de la branche que la quatrième lombaire fournit pour la suppléer quand elle manque.

Dans leur trajet sur le corps des vertèbres, les lombaires donnent beaucoup de petits rameaux supérieurs et inférieurs au périoste et aux portions musculaires qui les recouvrent. Elles en donnent de plus considérables au psoas et au quarré des lombes en passant entre eux.

§ III. *Artères fournies supérieurement par l'Aorte abdominale.*

Ce sont les *diaphragmatiques inférieures*. Tantôt elles naissent isolément, tantôt par un tronc commun. Elles viennent plus souvent de la cœliaque que de l'aorte elle-même; on les a vues quelquefois naître des rénales. L'une et l'autre se ressemblent beaucoup dans leur distribution au diaphragme; cependant elles different assez pour qu'on doive les décrire chacune en particulier.

Artère diaphragmatique droite.

Elle remonte verticalement sur l'appendice droite du diaphragme près de son bord libre, en donnant plusieurs rameaux soit à cette appendice, soit à la capsule surrénale. Elle donne aussi quelques rameaux hépatiques qui s'enfoncent en arrière dans le foie en suivant la veine cave; ensuite elle se divise en deux branches, l'une antérieure, l'autre droite.

Branche antérieure. Elle suit en haut et en devant le trajet primitif de l'artère, donne un rameau transverse qui s'anastomose au-devant de l'ouverture œsophagienne avec un rameau semblable de la diaphragmatique gauche, puis elle s'approche de l'ouverture de la veine cave, donne plusieurs rameaux qui traversent le diaphragme et vont se répandre à la partie inférieure du péricarde, en s'anastomosant avec la diaphragmatique supérieure. D'autres rameaux vont s'enfoncer dans le foie à la partie la plus reculée de sa face convexe. Enfin la branche continuant à se porter en devant, s'enfonce entre les fibres musculaires, contourne la portion moyenne du centre aponévrotique et s'anastomose par arcade avec la branche antérieure de la diaphragmatique gauche.

Branche droite. Elle se dirige transversalement sur la portion droite du diaphragme et se termine dans les attaches de ce muscle aux côtes. En passant sur le bord convexe de la capsule surrénale elle lui donne deux ou trois rameaux. Dans tout le reste de son trajet elle fournit soit en avant, soit en arrière un grand nombre de rameaux qui se perdent dans le diaphragme.

Artère diaphragmatique gauche.

Elle se porte vers l'appendice gauche sur laquelle elle remonte en lui donnant plusieurs rameaux parmi lesquels on en remarque un qui gagne la partie latérale gauche de l'œsophage, remonte sur le conduit jusque dans le thorax et s'unit aux œsophagiennes aortiques. Ensuite la diaphragmatique donne trois ou quatre rameaux capsulaires. Parvenue sur le centre aponévrotique elle en fournit d'autres qui vont se rendre à la portion musculeuse du diaphragme implantée au milieu du rebord inférieur des fausses côtes. Enfin au-delà de l'ouverture œsophagienne l'artère se divise comme la précédente en deux branches, l'une antérieure, l'autre gauche.

Branche antérieure. Elle reçoit d'abord le rameau transverse anastomotique que lui envoie, comme nous l'avons dit, la diaphragmatique droite, ensuite elle se porte en devant et se divise en plusieurs rameaux dont les uns contournent la portion moyenne du centre aponévrotique et s'unissent à la branche antérieure de cette même diaphragmatique droite, tandis que d'autres se perdent dans la portion musculeuse antérieure du diaphragme en s'unissant à ceux de la thorachique interne. Plusieurs ramuscules traversent le muscle et se distribuent à la portion inférieure du péricarde.

Branche gauche. C'est la plus considérable. Elle se porte transversalement en dehors et se distribue à la portion musculaire gauche par beaucoup de rameaux qui s'anastomosent avec la dernière inter-

costale et avec la première lombaire. Quelques ramuscules partis d'elle vont se distribuer au lobe gauche du foie, d'autres se portent à la rate, renfermés dans le repli péritonéal de cet organe.

§ IV. *Artère sacrée moyenne, fournie inférieurement par l'aorte abdominale.*

Elle naît de la partie postérieure de l'aorte, un peu au-dessus de sa division en iliaques, au niveau de la dernière vertèbre lombaire. Son volume égale à-peu-près celui des artères lombaires, quelquefois lui est inférieur. Elle descend aussitôt sur la partie moyenne et antérieure du sacrum, correspondant pour l'ordinaire exactement à la ligne médiane, quelquefois déviée obliquement d'un côté et rapprochée d'une des sacrées latérales. Parvenue au coccix et fort diminuée de volume, elle suit également la partie moyenne de cet os jusqu'à son sommet où elle finit de diverses manières suivant les individus.

Dans ce trajet la sacrée moyenne, toujours immédiatement appliquée sur le sacrum, est séparée antérieurement du rectum par le tissu cellulaire lâche qui remplit l'intervalle des feuillets du méso-rectum, par les vaisseaux hémorroïdaux et par les nerfs du plexus hypogastrique.

Les branches qu'elle fournit sont toutes latérales. Les premières naissent au niveau de la dernière vertèbre, et vont sur elles s'anastomoser avec les iléo-lombaires. Ce sont les plus petites et les plus irrégulières.

Les autres viennent de l'artère pendant son trajet

sur le sacrum. Ce sont les plus volumineuses. Pour l'ordinaire il en naît une de chaque côté, sur le milieu de chaque fausse vertèbre du sacrum. Transversalement dirigées en dehors, tantôt droites, tantôt flexueuses, ces branches vont se réunir près des trous sacrés antérieurs avec des rameaux des sacrées latérales, d'autres fois pénètrent elles-mêmes par les trous sacrés pour aller se distribuer aux nerfs qui terminent la moelle. Dans leur trajet elles donnent de nombreux ramuscules, soit en haut, soit en bas, au périoste du sacrum.

Ces dernières branches ne sont cependant constantes ni pour le volume, ni pour le nombre, ni pour la disposition. Quelquefois, surtout quand la sacrée moyenne est déviée d'un côté, on voit une branche assez grosse, fournie par elle supérieurement du côté opposé, descendre obliquement jusqu'à la partie inférieure du sacrum, donner dans ce chemin tous les rameaux latéraux que l'artère fournit ailleurs elle-même, et s'anastomoser près du dernier trou sacré avec la sacrée latérale.

Enfin sur le coccix, l'artère sacrée moyenne donne plusieurs branches latérales qui toutes se portent obliquement en bas et en dehors pour se jeter dans les graisses du rectum et dans le muscle ischio-coccigien.

Ailleurs l'artère se divise sur le coccix en deux branches égales qui se recourbent en dehors et en haut pour former deux arcades anastomotiques avec les sacrées latérales. Cette disposition assez ordinaire est bien loin d'être constante, tant les sacrées latérales sont sujettes à varier pour la longueur et pour le mode de terminaison.

Remarques sur la disposition générale des artères que fournit l'aorte dans le thorax et dans l'abdomen.

Ces artères peuvent se distinguer en deux classes. Les unes vont aux parois du tronc, les autres aux organes que renferment les cavités thorachique et abdominale.

I. Les premières naissent des parties latérales et postérieures de l'aorte dans toute son étendue, depuis l'endroit où elle s'engage entre les deux plèvres jusqu'à celui où elle se divise en iliaques. A la poitrine elles prennent le nom d'*intercostales*, à l'abdomen celui de *lombaires*. Mais par-tout elles offrent les caractères d'analogie les plus frappans. Leur volume est à-peu-près le même. Toutes forment avec l'aorte un angle plus ou moins aigu en haut à leur origine, et se recourbent aussitôt pour se porter transversalement sur le corps des vertèbres correspondantes jusqu'aux apophyses transverses. Toutes se divisent ensuite en deux branches dont l'une postérieure appartient à la moelle et aux muscles du dos, l'autre antérieure aux parois du thorax et de l'abdomen. Les branches postérieures se comportent partout de même : chacune donne des rameaux à la moelle et aux corps des vertèbres, puis se jette dans les muscles des gouttières vertébrales. Les branches antérieures seules diffèrent entre elles pour la disposition, et cette différence tient uniquement à la conformation des parois de l'une et de l'autre cavité. Au thorax elles sont plus régulières et parcourent

un trajet plus étendu dont la direction est marquée exactement par celle des côtes. A l'abdomen elles se divisent plutôt et se ramifient plus vaguement dans les couches musculeuses flottantes qu'elles rencontrent en dehors.

Ces artères aortiques se distribuent principalement aux parties latérales des parois thorachiques et abdominales, tandis que la partie antérieure de ces mêmes parois est fournie par deux grosses branches dont l'une née de la sous-clavière se porte de haut en bas sous le nom de *thorachique interne*, l'autre nommée *épigastrique* naît de l'iliaque externe, et se porte de bas en haut. L'ombilic est le point de leur réunion mutuelle, et c'est à cette grande anastomose que viennent se terminer comme à leur centre commun presque toutes les branches antérieures soit des intercostales, soit des lombaires.

Je ne parle point ici de l'artère sacrée moyenne fournie en bas par l'aorte, mais entièrement destinée au bassin, peu remarquable d'ailleurs dans sa distribution, puisque les rameaux fournis ici à la partie inférieure de la moelle et aux muscles du dos appartiennent presque toujours uniquement aux sacrées latérales.

II. Les artères destinées aux organes des deux cavités ne présentent ni cette égalité de volume, ni cette uniformité de distribution qu'offrent les artères des parois. Proportionnées aux divers organes, elles diffèrent nécessairement entre elles de manière à ne pouvoir être rapprochées que d'une manière assez vague sous un coup d'œil général.

Dans le thorax ces artères sont peu nombreuses et fort petites. Les unes, répandues sur l'œsophage et sur la partie postérieure du péricarde, méritent plutôt le nom de rameaux que celui d'artères. Les autres, plus remarquables, se distribuent aux poumons sous le nom de *bronchiques*. Cependant telle est encore la ténuité de ces dernières qu'elles semblent d'abord manifestement disproportionnées avec les organes très-volumineux qui les reçoivent. Mais on peut remarquer, 1°. que, comme nous l'avons dit ailleurs, le volume des poumons est dû en grande partie à l'air qui les remplit sans cesse plutôt qu'à leur substance solide qui est très-peu abondante; 2°. que les artères bronchiques appartiennent principalement aux conduits dont elles prennent le nom, et se trouvent avec eux dans un rapport assez exact de volume.

Je ne dois point omettre ici un phénomène anatomique fort singulier observé depuis peu. Sur le corps d'un enfant de sept ans, on trouva une artère très-volumineuse qui, née de l'aorte abdominale au niveau de la cœliaque, se recourboit supérieurement, pénétroit dans le thorax par l'ouverture œsophagienne du diaphragme et se divisoit aussitôt derrière l'œsophage en deux grosses branches qui s'enfonçoient dans les poumons par la partie inférieure et postérieure de leur face interne pour se distribuer de l'un et de l'autre côté à tout le lobe inférieur. Ces branches s'anastomosoient sensiblement par plusieurs rameaux avec l'artère pulmonaire supérieure, comme on s'en assura en injectant celle-ci. Les veines pulmonaires étoient disposées à la manière ordinaire, et se distri-

buoient également à toute l'étendue des poumons, quoique les lobes inférieurs ne reçussent de vaisseaux artériels que de la pulmonaire abdominale, et que l'artère pulmonaire supérieure ne se distribuât qu'aux lobes supérieurs. Cette observation très-curieuse dont aucun anatomiste n'avoit cité d'exemples est due au cit. Maugars d'Angers (1).

De nombreuses artères se distribuent aux organes volumineux et multipliés que contient l'abdomen. Ces organes sont ou parenchymateux, ou membraneux. Dans les premiers on voit presque par-tout une artère très-grosse se porter perpendiculairement à l'organe et pénétrer son tissu par plusieurs branches épanouies qui se subdivisent ensuite. C'est ce qu'on observe au foie, à la rate, aux reins. Ces derniers organes sont surtout remarquables par la grosseur des artères qu'ils reçoivent, proportionnellement à leur volume, et par la brièveté de ces artères qui pénètrent le tissu de l'organe presque aussitôt après leur origine de l'aorte. On ne peut nier qu'il n'en résulte une impulsion circulatoire plus vive, que par conséquent les reins ne soient excités plus énergiquement que beaucoup d'autres organes; et on est assez fondé à trouver ici avec plusieurs auteurs un rapport sensible entre la disposition artérielle et la promptitude de la sécrétion urinaire.

Les artères qui se distribuent aux organes membraneux, c'est à-dire a ceux qui constituent la plus

(1) Voyez le Journal de Médecine des cit. Corvisart, Leroux et Boyer, pluviôse an 10. L'auteur a joint à son observation le dessin de cette artère extraordinaire.

grande partie du tube digestif, se comportent d'une manière fort différente. Toutes forment soit par elles-mêmes, soit par leurs principales divisions, des arcades vasculaires le long des organes auxquels elles appartiennent, et ce sont ces arcades qui fournissent par leur convexité les rameaux distribués immédiatement aux organes eux-mêmes. Renfermées dans les replis péritonéaux qui soutiennent les diverses portions du tube digestif, et fixées à ces replis, ces arcades artérielles n'adhèrent point à l'intestin lui-même qui se trouve plus ou moins rapproché ou éloigné d'elles, suivant les divers degrés de sa dilatation ou de sa contraction.

L'estomac est de toutes les parties du conduit digestif celle qui reçoit le plus grand nombre de vaisseaux. Deux arcades artérielles embrassent ses deux courbures, et les rameaux qu'elles fournissent viennent en deux sens opposés s'entrecroiser et s'anastomoser ensemble entre les tuniques musculeuse et muqueuse de cet organe. Au contraire l'intestin grêle ne reçoit de vaisseaux que par un seul côté, et il en est de même des gros intestins. Il y a donc un mouvement circulatoire beaucoup plus énergique sur l'estomac que sur les intestins, considération intéressante que le physiologiste ne doit point oublier dans l'étude des phénomènes digestifs.

Les artères que fournit encore l'aorte abdominale soit au diaphragme, soit aux capsules surrénales, soit aux organes génitaux, n'ont dans leur disposition générale rien d'assez remarquable pour que nous croyons devoir y revenir ici.

V. DES ARTÈRES PAR LESQUELLES L'AORTE SE TERMINE.

Parvenue sur le corps de la quatrième vertèbre lombaire, ou sur le fibro-cartilage qui réunit la quatrième à la cinquième, l'aorte finit en donnant naissance à deux gros troncs vasculaires nommés *artères iliaques primitives*.

Ces artères égales en volume et en longueur s'écartent l'une de l'autre à angle aigu, se dirigent obliquement en dehors, en bas et un peu en avant en s'éloignant progressivement de la cinquième vertèbre sur laquelle elles reposoient d'abord. Elles passent au-devant des parties latérales de la base du sacrum, et près des symphyses sacro-iliaques se divisent chacune en deux artères considérables nommées *hypogastrique* et *iliaque externe* ou *artère du membre inférieur*.

Dans ce court trajet les deux iliaques primitives côtoyées en dehors par les psoas correspondent en dedans à un intervalle celluleux qui les sépare l'une de l'autre. En devant la droite est recouverte en grande partie par la veine cave inférieure; le péritoine seul recouvre la gauche. Aucune branche n'est fournie par l'une ni par l'autre.

ARTICLE PREMIER.

Artère hypogastrique ou pelvienne.

Elle se dirige un peu obliquement en avant, en bas et en dedans, s'enfonce bientôt dans l'excavation du bassin en prenant une direction presque verticale et aussitôt se divise en une multitude de branches que l'on peut distinguer, pour la commodité de la description, en postérieures, antérieures, internes, et inférieures.

§ Ier. *Branches postérieures.*

Ce sont les artères iléo-lombaire, sacrée latérale et fessière.

Artère iléo-lombaire.

Elle naît tantôt de l'hypogastrique elle-même au niveau de la base du sacrum, tantôt un peu plus bas de la fessière. Son volume est variable. Dirigée horizontalement en arrière et en dehors elle se porte vers la ligne obtuse qui borne en-devant la base du sacrum, couverte dans ce petit trajet par le psoas et passant au-dessus du nerf obturateur si elle vient de l'hypogastrique, au-dessous de lui si elle vient de la fessière; puis elle se divise en deux branches principales.

L'une remonte verticalement sous le psoas entre l'os iléum et la dernière vertèbre des lombes et s'anastomose bientôt avec une branche de la cinquième

ou de la quatrième artère lombaire; elle donne des rameaux nombreux au psoas et en dehors à l'iliaque.

L'autre branche dirigée transversalement entre le psoas et l'iliaque se subdivise aussitôt en deux ordres de rameaux. Les uns superficiels se répandent sur le muscle iliaque, couverts par le péritoine, donnent plusieurs ramuscules à ce muscle ainsi qu'au tissu graisseux qui le recouvre et vont vers la crête iliaque s'anastomoser soit avec les lombaires, soit avec la circonflexe iliaque. Souvent ces rameaux superficiels sont fournis par la quatrième lombaire. Les rameaux profonds s'enfoncent dans l'épaisseur du muscle iliaque auquel ils se distribuent en tout sens. Plusieurs passent entre le muscle et l'os et se ramifient sur le périoste de la fosse iliaque. Ceux-ci fournissent le rameau nourricier de l'os qui s'introduit dans son tissu spongieux par un conduit particulier. Souvent ce rameau assez volumineux naît primitivement de l'artère elle-même.

Artère sacrée latérale.

Tantôt il n'y en a qu'une, tantôt et souvent il s'en trouve deux. Elles naissent plus souvent de l'iléo-lombaire ou de la fessière que de l'hypogastrique elle-même.

Lorsqu'il n'y en a qu'une, elle descend un peu obliquement sur la partie latérale et antérieure du sacrum, au-devant des trous sacrés, en se rapprochant progressivement de la sacrée moyenne avec laquelle elle s'anastomose enfin sur le coccix. Souvent elle ne se prolonge point aussi bas, mais se plonge

dans le troisième ou le quatrième trou sacré pour se distribuer à la moelle et aux muscles postérieurs de l'épine et donne seulement un rameau qui continue à se porter inférieurement au-devant du sacrum sur lequel il se perd.

Dans son trajet la sacrée latérale donne des rameaux internes et des rameaux postérieurs. Les premiers se portent transversalement sur le sacrum et s'unissent à ceux de la sacrée moyenne. Leur nombre est variable.

Les rameaux postérieurs s'introduisent dans le canal du sacrum par les trous sacrés antérieurs. Chacun d'eux se divise bientôt en deux rameaux secondaires dont l'un se porte sur la face postérieure du corps de la fausse vertèbre, l'autre sort par le trou sacré postérieur et se perd dans les muscles de l'épine. L'un et l'autre à leur origine fournissent des ramuscules aux nerfs de la moelle.

Ces rameaux postérieurs sont au nombre de cinq, tous fournis par la sacrée latérale quand elle occupe toute la hauteur du sacrum. Quand cette artère naît au-dessous du premier trou sacré, l'iléo-lombaire fournit le premier de ces rameaux.

Lorsqu'il y a deux sacrées latérales du même côté, la supérieure naît de l'hypogastrique, se dirige transversalement sur le sacrum et se divise bientôt en deux branches dont l'une remonte vers le premier trou sacré, l'autre descend vers le second. La sacrée inférieure née de la fessière se porte aussi transversalement, communique par un rameau avec la sacrée moyenne, s'introduit elle-même dans le troisième trou sacré en donnant une branche qui continue à

se porter en bas au-devant du sacrum jusqu'au coccix et qui fournit les rameaux des quatrième et cinquième trous. Tous ces rameaux introduits dans le canal sacré se comportent ensuite comme nous l'avons dit plus haut.

Au reste rien n'est plus variable que la disposition des artères sacrées latérales. J'ai indiqué celles de ces variétés que j'ai observées; on en trouvera sans doute beaucoup d'autres en observant soi-même.

Artère fessière.

Son volume est considérable. Elle naît de l'hypogastrique un peu au-dessous des précédentes que souvent elle fournit; d'autres fois elle part d'un tronc qui lui est commun avec l'ischiatique. Dirigée aussitôt en bas, en dehors et en arrière, elle passe après un demi-pouce de trajet au dessus et derrière le muscle pyramidal, sort par la grande échancrure sciatique et gagne la partie postérieure du bassin où, couverte par le grand fessier et placée sur le bord postérieur du petit, elle se divise en deux branches. Le nerf fessier la suit exactement.

Dans le bassin la fessière donne de petits rameaux en nombre incertain qui vont au rectum. Très-souvent elle fournit, outre les sacrées latérales, l'obturatrice, l'ischiatique ou la honteuse interne.

Des deux branches volumineuses qui terminent la fessière au dehors du bassin l'une remonte et se porte un peu en dehors entre le grand et le moyen fessier, donne dans ce trajet un grand nombre de rameaux considérables qui se répandent les uns sur la surface

antérieure du grand fessier, les autres sur la surface postérieure du moyen. Une couche graisseuse épaisse sépare ces deux ordres de rameaux qui, lorsqu'on écarte les deux fessiers, demeurent adhérens à l'un et à l'autre.

L'autre branche plus profonde donne d'abord un rameau nourricier postérieur à l'os des iles, se porte ensuite transversalement en dehors entre le moyen et le petit fessiers, et se divise bientôt en trois branches secondaires, dont une supérieure, une moyenne et une inférieure. La supérieure remonte obliquement en dehors, se rapproche de la crête iliaque et forme en se recourbant une grande arcade qui répond à l'attache supérieure demi-circulaire du petit fessier. Cette arcade terminée près de l'épine antérieure supérieure de l'os des iles fournit par sa convexité de nombreux rameaux au moyen fessier qui la recouvre; elle en fournit d'autres par sa concavité au petit fessier sur lequel elle appuie. La branche moyenne beaucoup plus grosse se dirige transversalement en dehors sur le petit fessier dont une grande quantité de graisse la sépare, donne dans ce trajet un grand nombre de rameaux qui remontent dans le moyen fessier et s'y perdent; puis elle se recourbe inférieurement et va se jeter toute entière par plusieurs divisions dans ce même moyen fessier près de son attache au grand trochanter. La branche inférieure semblable en volume à la supérieure donne d'abord quelques rameaux soit au muscle pyramidal, soit à la partie postérieure du petit fessier; ensuite elle se porte transversalement sur ce dernier muscle en s'inclinant un peu en bas. Bientôt elle traverse l'épaisseur

des fibres du petit fessier, se place entre lui et l'os des iles, et continue à se porter transversalement en dehors jusque sous le muscle tenseur de l'aponévrose fémorale, et finit en se perdant dans les moyen et petit fessiers. Quelquefois cependant elle continue son trajet, se contourne sur l'attache supérieure du droit antérieur de la cuisse, et va s'anastomoser avec une grosse branche externe superficielle fournie par l'artère fémorale.

§ II. *Branches antérieures.*

Ce sont les artères ombilicale, vésicales et obturatrice.

Artère ombilicale.

Cette artère née en devant de l'hypogastrique offre de grandes differences selon qu'on l'observe avant ou après la naissance. Toujours elle se dirge un peu obliquement en avant et en dedans jusque sur la partie latérale supérieure de la vessie, adhere à cet organe par du tissu cellulaire, et se recourbe aussitôt pour remonter derrière la partie antérieure des parois abdominales, renfermée dans un repli particulier du péritoine et placée à côté de l'ouraque dont elle se rapproche progressivement jusqu'à l'ombilic.

Mais cette artère n'est dilatée et perméable au sang dans toute son étendue que chez le fœtus. Son volume est alors très-considérable, en sorte qu'elle forme essentiellement la continuation de l'hypogastrique dont toutes les autres branches sont au contraire extrêmement ténues. Parvenue à l'ombilic,

l'artère ombilicale sort par l'anneau et va au placenta.

Après la naissance, l'artère ombilicale considérablement rétrécie dès son origine est encore perméable au sang jusque sur la vessie à laquelle elle fournit toujours deux ou trois branches. Mais son calibre intérieur diminue progressivement, et déjà sur la vessie ses parois augmentées d'épaisseur ne laissent plus apercevoir en dehors la couleur du sang ni des fluides injectés que le vaisseau contient, en sorte que les branches vésicales entièrement remplies semblent naître d'un ligament. Au delà de la vessie l'artère ombilicale n'admet plus de sang, et réduite à l'état ligamenteux elle finit à l'ombilic dans la cicatrice de l'anneau.

On conçoit que ces deux états de l'ombilicale changent tout-à-fait l'aspect général de l'hypogastrique. Chez le fœtus ce tronc artériel forme sur les côtés de l'excavation du bassin une grande courbure pour remonter ensuite sur les parois abdominales. La convexité de cette courbure donne naissance à toutes les branches alors ténues qui se plongent dans le bassin. Après la naissance au contraire l'hypogastrique paroît se terminer également par toutes les branches pelviennes dilatées, et l'ombilicale ne peut plus être regardée comme sa continuation.

Ajoutons à ceci que chez le fœtus l'artère hypogastrique nommée alors toute entière *ombilicale* forme la principale division de l'iliaque primitive, et l'emporte de beaucoup pour le calibre sur l'iliaque externe encore peu dilatée. On reviendra plus en détail sur cet article dans l'histoire du fœtus.

Artères vésicales.

Les vésicales en nombre très-variable ont différentes origines. Toujours l'artère ombilicale en fournit deux ou trois qui descendent sur le côté de la vessie et se ramifient entre ses tuniques. D'autres naissent de l'hémorroïdale moyenne, de la honteuse interne, de l'obturatrice, etc. Ordinairement l'hypogastrique en fournit une qui naît soit à côté de l'ombilicale, soit par un tronc commun avec elle. Cette artère gagne la vessie près de son bas-fond et lui donne de nombreux rameaux ainsi qu'au commencement de l'urètre, et chez l'homme à la prostate, aux vésicules séminales, au conduit déférent.

Artère obturatrice.

Assez souvent elle vient de l'épigastrique et alors descend verticalement derrière le pubis jusqu'au trou ovale.

Lorsque l'hypogastrique la fournit elle naît tantôt de l'hypogastrique elle-même, tantôt et plus souvent d'une de ses branches, comme l'ischiatique, la honteuse interne ou même la fessière. Dirigée en avant et en dehors elle se contourne horizontalement dans l'excavation du bassin sur le muscle obturateur interne jusqu'à son arcade aponévrotique par laquelle elle sort conjointement avec le nerf obturateur pour gagner la partie supérieure interne de la cuisse.

Près de son origine l'obturatrice donne une branche assez considérable qui se porte transversalement en

dehors, passe sous le nerf obturateur, remonte un peu et s'engage entre la fosse iliaque et le muscle du même nom auquel elle se distribue. L'obturatrice donne ensuite un assez grand nombre de petits rameaux au muscle obturateur interne en passant sur lui. Avant de s'engager dans l'arcade aponévrotique elle donne une branche remarquable qui se porte derrière le pubis en remontant un peu, répand quelques rameaux sur le périoste et s'anastomose avec une branche de l'obturatrice opposée.

En passant par l'arcade aponévrotique, l'obturatrice se divise en deux branches.

L'une externe, descend en côtoyant la partie externe du trou ovale, placée entre les deux muscles obturateurs. Tantôt elle se distribue entièrement à l'un et à l'autre et finit près de la tubérosité de l'ischion; tantôt parvenue à cette tubérosité, elle se recourbe en dehors et cachée par le muscle quarré se porte transversalement a la partie postérieure de la cuisse où elle donne plusieurs rameaux à la capsule articulaire et finit en s'anastomosant avec la branche descendante de l'ischiatique. Dans son trajet, cette branche externe fournit ordinairement un rameau qui pénètre dans la cavité cotyloïde par son échancrure inférieure et se distribue au corps celluleux rougeâtre qui occupe la partie postérieure de cette cavité. Ce rameau, d'après la disposition connue de la membrane synoviale, ne se trouve point, comme on le suppose ordinairement, renfermé dans l'articulation.

L'autre branche, interne, se porte horizontalement en avant et en dedans au-delà de l'obturateur externe,

donne à ce muscle et aux adducteurs, puis tantôt s'anastomose avec un rameau de la circonflexe interne, tantôt traverse les muscles etva se perdre, chez l'homme dans le scrotum, chez la femme dans les grandes lèvres. En traversant le trou ovale, elle donne ordinairement un rameau qui descend le long de la partie interne de ce trou et s'anastomose avec la branche externe, de manière à former sur la circonférence du trou ovale un cercle artériel complet.

§ III. *Branches internes.*

Ces branches dont une seule se trouve chez l'homme, sont l'hémorroïdale moyenne, l'utérine et la vaginale.

Artère hémorroïdale moyenne.

Elle n'est pas constante. On la trouve plus souvent chez la femme que chez l'homme. Sa grosseur et son origine varient beaucoup. Née tantôt de l'hypogastrique, tantôt de l'ischiatique ou de la honteuse interne elle se porte obliquement de haut en bas sur la partie antérieure du rectum, entre lui et le bas-fond de la vessie chez l'homme, entre lui et le vagin chez la femme. Divisée aussitôt en un grand nombre de rameaux elle se distribue principalement au rectum en s'anastomosant en haut avec la mésentérique inférieure, en bas avec les rameaux hémorroïdaux de la honteuse interne. Elle envoie plusieurs rameaux chez l'homme à la vessie, aux vésicules séminales, à la prostate, chez la femme au vagin.

Artère utérine.

Elle est plus ou moins volumineuse suivant les différens états de la matrice. Née de l'hypogastrique tantôt isolément, tantôt par un tronc commun à elle et à l'ombilicale, quelquefois produite par la honteuse interne, elle se porte aussitôt sur la partie latérale et supérieure du vagin entre lui et la vessie en fournissant à l'une et à l'autre plusieurs rameaux assez considérables. Ensuite elle remonte sur la partie latérale de la matrice renfermée dans le repli péritonéal qui constitue le ligament large, et formant un grand nombre de flexuosités. Dans ce trajet elle donne un grand nombre de rameaux volumineux qui se portent transversalement sur les surfaces antérieure et postérieure de la matrice, pénètrent par divers points le tissu de cet organe et s'y distribuent en s'anastomosant avec l'utérine opposée. Parvenue au niveau de la trompe elle se divise en plusieurs branches dont les unes vont en devant au ligament rond, les autres à la trompe, les plus grosses à l'ovaire sur lequel elles s'anastomosent sensiblement avec les spermatiques.

Artère vaginale.

Souvent elle manque, et le vagin ne reçoit que des rameaux nombreux fournis par l'utérine, les vésicales, l'hémorroïdale moyenne. Lorsqu'elle existe, elle vient de la honteuse, de l'hémorroïdale, de l'ombilicale, quelquefois de l'obturatrice. Dirigée obliquement en bas et en devant elle donne d'abord un

rameau assez considérable à la partie latérale inférieure de la vessie; ensuite elle se porte sur le côté du vagin en se rapprochant de sa partie inférieure, et se prolonge en devant jusqu'à l'orifice de ce conduit auquel elle fournit dans ce trajet de nombreux rameaux.

§ IV. *Branches inférieures.*

Ce sont les deux artères ischiatique et honteuse interne. Leur volume et leur direction les font regarder ordinairement comme les terminaisons principales de l'hypogastrique.

Artère ischiatique.

Elle naît de l'hypogastrique tantôt isolément, tantôt par un tronc commun avec la fessière ou avec la honteuse. Son volume inférieur à celui de la fessière surpasse presque toujours celui de la honteuse que souvent elle fournit. Dirigée presque verticalement en bas entre le rectum et les parois du bassin, elle sort de cette cavité par la partie inférieure de la grande échancrure sciatique, entre le muscle pyramidal et le petit ligament sacro-sciatique, puis se divise en plusieurs branches.

Dans le bassin l'ischiatique donne souvent la honteuse, l'obturatrice, ou l'hémorroïdale moyenne. Elle donne aussi d'autres rameaux peu importans au rectum, à la vessie, etc.

Sortie du bassin, l'ischiatique donne aussitôt une branche très-grosse qui se porte obliquement en dedans et en bas en suivant l'attache du grand fessier

qui la recouvre, gagne la partie latérale du sacrum et se perd dans les muscles postérieurs de l'épine; ensuite l'artère se porte obliquement en bas et en dehors et se divise bientôt en trois ou quatre branches. Les unes se répandent sur le grand fessier dans sa moitié inférieure et s'y distribuent en entier. La dernière descend avec le nerf sciatique jusqu'au milieu de la partie postérieure de la cuisse en donnant des rameaux aux jumeaux, à l'obturateur interne, au quarré, puis aux fléchisseurs de la jambe, et finit en s'anastomosant avec les musculaires perforantes et les circonflexes.

Artère honteuse interne.

Elle est un peu antérieure dans son origine à l'ischiatique qui souvent la fournit ou qui naît d'un tronc commun avec elle. Son volume est tantôt égal, tantôt et souvent inférieur, quelquefois supérieur à celui de l'ischiatique. Dirigée verticalement en bas, tantôt droite, tantôt formant de légères flexuosités, elle sort du bassin par la partie inférieure de la grande échancrure sciatique, entre le muscle pyramidal et le bord postérieur du muscle releveur de l'anus réuni au petit ligament sacro-sciatique. Dans ce passage la honteuse voisine de l'ischiatique n'en est séparée que par une couche graisseuse assez épaisse. Mais bientôt elle se porte en bas et en dedans, et rentre dans le bassin, entre les deux ligamens sacro-sciatiques en se recourbant sur le petit qu'elle embrasse en dehors. Placée ensuite sur la face interne de l'ischion, entre l'obturateur interne sur lequel elle appuie et l'apo-

névrose qui sépare ce muscle du releveur de l'anus, elle se dirige presque horizontalement en avant et en dedans jusqu'auprès de l'attache commune des muscles ischio-caverneux et transverse du périné. Là elle se divise en deux branches.

Dans le bassin la honteuse interne fournit souvent quelques-unes des autres branches principales de l'hypogastrique, telle que l'hémorroïdale moyenne, l'obturatrice, etc. Du reste elle ne donne que des rameaux peu remarquables à la vessie, aux vésicules séminales, à la prostate, au rectum.

Depuis son passage entre les ligamens jusqu'à sa division, la honteuse donne un grand nombre de branches, toutes d'un volume médiocre. Les unes descendent sur la tubérosité de l'ischion, et se perdent dans l'attache commune des muscles fléchisseurs de la jambe; les autres plus considérables se portent transversalement en dedans au milieu de la graisse abondante qui environne le rectum et vont se distribuer soit au sphincter cutané, soit plus profondément au releveur de l'anus.

Des deux branches qui terminent la honteuse chez l'homme, l'une peut être nommée *périnéale*, l'autre *pénienne*.

Branche périnéale. C'est la plus petite. Elle s'engage au-dessous du muscle transverse, entre lui et la peau, se porte en avant dans le tissu graisseux qui remplit l'espace triangulaire des muscles du périné, en se rapprochant toujours du raphé et donnant de nombreux rameaux au sphincter, au transverse, aux ischio et au bulbo-caverneux et à la peau. Ceux qui vont au sphincter et à la portion inférieure du rectum sont

ceux qu'on nomme *rameaux hémorroïdaux inférieurs*. Enfin elle s'enfonce tantôt par un, tantôt par plusieurs rameaux, dans la cloison du dartos auquel elle se distribue, ainsi qu'à la peau du scrotum et de la verge.

Branche pénienne. Son volume la fait regarder comme la continuation principale de la honteuse. Elle traverse l'épaisseur du muscle transverse et remonte ensuite au-dessus de lui le long de la branche ascendante de l'ischion, cachée par le muscle ischio-caverneux, jusqu'à l'intervalle celluleux triangulaire qui sépare les deux corps caverneux à leur attache au pubis. Près de son origine elle donne une branche secondaire plus ou moins grosse, connue ordinairement sous le nom d'*artère transverse du périné*, laquelle remonte au-dessus et le long du muscle dont elle prend le nom jusqu'au bulbe de l'urètre, s'enfonce dans la portion spongieuse de ce canal et s'y subdivise en une foule de rameaux. J'ai vu cette branche égaler en volume la branche pénienne elle-même.

Cette branche pénienne dans le reste de son trajet donne de nombreux rameaux au muscle obturateur interne, aux ischio-caverneux et transverse, aux glandes de Cowper.

Parvenue dans l'intervalle des deux corps caverneux, la branche pénienne se divise en deux rameaux, l'un caverneux, l'autre dorsal.

Le rameau caverneux s'enfonce dans le corps caverneux qui lui correspond en traversant sa membrane fibreuse, se divise aussitôt en plusieurs rameaux secondaires qui suivent la longueur de ce

corps en donnant en tout sens au tissu spongieux qui le remplit une foule de ramuscules dont quelques-uns traversent la membrane et pénètrent dans la portion spongieuse de l'urètre.

Le rameau dorsal traverse le ligament suspenseur de la verge, se place sur la face dorsale de cet organe qu'elle suit parallèlement au rameau dorsal du côté opposé, en formant quelques flexuosités et donnant des ramuscules multipliés, soit à la membrane fibreuse, soit à la peau. Parvenu près du gland, le rameau dorsal se subdivise et s'enfonce dans le tissu de ce corps où il finit.

Quelquefois la branche transverse du périné naît de la honteuse elle-même en même temps que la branche périnéale. Elle traverse alors l'épaisseur du muscle transverse près de son attache fixe pour se comporter ensuite comme nous l'avons dit.

Nous avons considéré la honteuse interne chez l'homme, parce que c'est là que sa distribution est la plus étendue et que ses rapports sont plus essentiels à connoître exactement.

Chez la femme elle se divise de même auprès du muscle transverse en branches périnéale et *clitoridienne*. La première donne au sphincter, au constricteur du vagin et va finir dans la grande lèvre. L'autre remonte le long de l'ischion jusqu'à l'intervalle des corps caverneux du clitoris et s'y divise en deux rameaux dont l'un pénètre le corps caverneux, l'autre se porte sur la face dorsale du clitoris et se termine à son extrémité.

ARTICLE DEUXIÈME.

Artère du membre inférieur.

Un seul tronc artériel né de l'iliaque primitive au même endroit que l'hypogastrique, va fournir à tout le membre inférieur les vaisseaux qui lui appartiennent. Renfermé d'abord dans le bassin, il en sort par l'arcade crurale, descend le long de la partie interne de la cuisse, et se contournant toujours, se trouve enfin dans le milieu de l'espace poplité, gagne la jambe et s'y divise. Les rapports intéressans qu'il présente et les nombreux rameaux qu'il donne dans les diverses parties de son trajet obligent de le considérer comme formé de plusieurs portions distinctes et continues désignées sous les noms d'*artère iliaque externe*, *fémorale* et *poplitée*.

§ Ier. *Artère iliaque externe.*

Née de l'iliaque primitive elle descend obliquement en dehors en côtoyant le psoas sur lequel elle est immédiatement appliquée, jusqu'à l'arcade crurale par laquelle elle sort avec lui du bassin. En dehors elle répond au psoas, en dedans et un peu en arrière à la veine iliaque externe; dans le reste de son contour le péritoine la recouvre. Ordinairement elle est droite; quelquefois cependant elle forme une ou plusieurs courbures plus ou moins étendues.

Dans son trajet l'iliaque externe ne donne que

quelques rameaux peu remarquables au psoas et aux glandes lymphatiques voisines. Mais avant son passage par l'arcade elle fournit deux artères assez considérables, l'épigastrique et la circonflexe iliaque.

Artère épigastrique.

Elle naît de la partie interne de l'iliaque un peu avant qu'elle approche de l'arcade crurale, se dirige aussitôt en dedans et un peu en avant en formant quelques flexuosités, s'engage sous le cordon spermatique dont elle croise la direction, et remonte verticalement en dedans de lui, derrière la partie supérieure externe de l'anneau inguinal, appliquée immédiatement sur l'aponévrose abdominale le long du bord externe du muscle droit sur lequel elle se place ensuite. Ainsi le cordon spermatique se trouve embrassé à son côté interne par l'artère recourbée autour de lui, et lorsqu'on repousse ce cordon à la partie interne de l'anneau, il entraîne nécessairement avec lui l'artère dans le même sens, remarque importante, comme l'on sait, pour l'opération de la hernie inguinale.

Parvenue sur le muscle droit, l'épigastrique continue à remonter verticalement entre lui et le péritoine jusqu'auprès de l'ombilic, où elle s'anastomose par plusieurs rameaux avec la thorachique interne et avec l'épigastrique opposée.

Près de son origine, l'épigastrique fournit assez souvent, comme nous l'avons dit, l'artère obturatrice qui pour l'ordinaire vient de l'hypogastrique. Dans ce cas, l'origine de l'obturatrice répond au

niveau de l'arcade crurale : j'ai même vu cette artère former dans l'arcade une courbure considérable avant de descendre derrière le pubis. Lorsque l'obturatrice vient de l'hypogastrique, l'épigastrique lui envoie ordinairement un rameau anastomotique qui descend derrière le pubis.

L'épigastrique fournit aussi dans cet endroit plusieurs rameaux, soit au péritoine, soit au cordon spermatique. Un d'entre eux s'engage dans l'anneau inguinal avec ce cordon qu'il accompagne plus ou moins loin en se distribuant au crémaster, au conduit déférent, et s'anastomose avec la spermatique. Chez la femme il suit le ligament rond auquel il se distribue.

Dans le reste de son trajet, l'épigastrique fournit latéralement de nombreuses branches soit au muscle droit sur lequel elle se trouve, soit surtout en dehors aux autres muscles abdominaux. Ces dernières branches communiquent avec les lombaires et les intercostales inférieures.

Artère circonflexe iliaque.

C'est elle qu'on nomme ordinairement *iliaque antérieure* ou *abdominale*. Elle naît de la partie externe de l'iliaque tantôt au-dessous, tantôt au niveau de l'épigastrique qu'elle égale à-peu-près en volume. Cachée par le péritoine et par beaucoup de graisse, elle se porte obliquement en haut et en dehors en se recourbant un peu, placée sur le muscle iliaque près de son bord externe jusqu'au-dessus de l'épine antérieure supérieure de l'os des îles. Là elle

continue à ce recourber en arrière et bientôt se divise en deux branches principales.

Dans ce trajet la circonflexe iliaque fournit un grand nombre de rameaux soit externes, soit internes. Les externes remontent tous obliquement et vont se plonger et se perdre dans le muscle transverse. Les internes se portent dans différentes directions sur le muscle iliaque, s'y perdent et s'y anastomosent avec l'iléo-lombaire.

Des deux branches qui terminent la circonflexe iliaque l'une est externe, l'autre interne.

La branche externe traverse presque aussitôt l'attache du muscle transverse à la crête iliaque, se porte entre ce muscle et le petit oblique en formant plusieurs flexuosités, et se perd enfin dans l'un et dans l'autre, ainsi que dans le grand oblique.

La branche interne suit pendant quelque temps la crête iliaque, remonte ensuite un peu et traverse l'attache aponévrotique du transverse pour finir dans ce muscle et dans le petit oblique par plusieurs rameaux.

§ II. *Artère fémorale.*

L'artère fémorale commence au-dessous du ligament de Fallope à-peu-près au milieu de l'espace qui sépare l'épine antérieure supérieure de l'os des iles d'avec l'épine du pubis. Dirigée un peu obliquement à la partie antérieure interne de la cuisse, elle s'engage vers le tiers inférieur de ce membre dans une arcade aponévrotique du muscle grand adducteur et y prend le nom d'*artère poplitée*.

L'étendue de l'artère fémorale est donc déter-

minée en haut par l'arcade crurale, en bas par la fin du grand adducteur. Ses rapports sont importans et faciles à reconnoître.

En devant l'artère fémorale répond d'abord à l'aponévrose et aux tégumens dans le grand espace triangulaire que circonscrivent en haut l'arcade crurale, en dehors le couturier, en dedans les muscles moyen adducteur et grêle interne. Mais elle en est éloignée par une grande quantité de graisse et par les glandes inguinales profondes. Plus bas le couturier la recouvre en croisant obliquement sa direction jusqu'à l'endroit où elle perd son nom.

En arrière la fémorale appuyée à son passage par l'arcade crurale sur le pubis dont elle est séparée par le muscle pectiné, correspond dans tout le reste de son étendue soit au pectiné, soit aux petit et moyen adducteurs dont elle est séparée par une plus ou moins grande quantité de graisse.

En dehors contiguë d'abord au nerf crural et appliquée sur les muscles iliaque et psoas, correspondant ensuite à une assez grande distance au muscle couturier, elle est enfin en bas immédiatement appliquée sur la portion interne du crural qui la sépare du fémur.

En dedans contiguë à la veine crurale elle répond d'abord d'une manière éloignée au bord interne du moyen adducteur sur lequel elle est appliquée en bas. D'après ces détails on voit, 1°. que l'artère fémorale n'est appuyée sur des portions osseuses qu'en deux endroits, à l'arcade crurale où elle répond en arrière au pubis, et à la partie inférieure de la cuisse où elle répond en dehors au fémur. 2°. Que l'appui

osseux supérieur est d'un côté le plus immédiat, puisque le seul muscle pectiné, médiocrement épais, est interposé entre l'artère et l'os; de l'autre le plus voisin des tégumens vu la saillie antérieure du pubis et le défaut absolu de muscles devant l'artère, tandis qu'en bas cette même artère séparée du fémur par l'épaisseur considérable de la portion interne du crural, se trouve d'ailleurs éloignée des tégumens soit par le couturier, soit par la saillie des muscles moyen adducteur et grêle interne. 3°. Que l'artère fémorale contiguë en haut à plusieurs muscles, enveloppée en bas de tous côtés par des muscles épais et forts, se trouve dans le milieu de son trajet éloignée de tout organe solide par une graisse abondante.

Les deux premières considérations sont essentielles à remarquer puisqu'elles servent de base à la pratique chirurgicale quant au choix du lieu où la compression doit être appliquée pour se rendre maître du sang dans diverses opérations.

Les branches que donne la fémorale peuvent se distinguer en internes, externes, antérieures et postérieures.

Branches internes.

Les plus remarquables sont les *honteuses superficielles*, au nombre de deux, distinguées en sous-cutanée et sous-aponévrotique.

La *sous-cutanée* naît de la fémorale un peu au-dessous de l'arcade crurale. Dirigée transversalement en dedans entre la peau et l'aponévrose elle se divise avant d'arriver aux parties génitales en deux rameaux. L'un remonte vers le pubis, et se perd dans la peau de la

partie inférieure de l'abdomen en s'unissant aux rameaux de l'épigastrique et de la sous-cutanée abdominale. L'autre se porte à la peau du scrotum et de la verge, et s'y distribue par une foule de ramuscules qui s'étendent jusqu'au prépuce, et s'anastomosent avec ceux des branches dorsales de la verge fournies par la honteuse interne. Chez la femme ce dernier rameau se distribue dans l'épaisseur de la grande lèvre.

La *sous-aponévrotique* naît un peu plus bas tantôt de l'artère fémorale, tantôt de l'artère musculaire profonde. Dirigée d'abord un peu obliquement en bas entre l'aponévrose et les muscles, elle se porte bientôt transversalement, traverse l'aponévrose, et va se distribuer chez l'homme au scrotum, chez la femme à la grande lèvre, en s'anastomosant avec le rameau inférieur de la précédente. Dans son trajet elle passe quelquefois derrière la veine saphène interne.

Les autres branches internes plus volumineuses que les précédentes sont variables pour le nombre, le volume et la disposition. Elles vont soit aux muscles droit interne et moyen adducteur, soit aux tégumens et s'y distribuent sans offrir rien de remarquable.

Branches externes.

On en trouve une très-volumineuse que l'on peut nommer *musculaire externe superficielle*. Née de la fémorale à-peu-près au même endroit que l'artère musculaire profonde, et souvent de celle-ci, elle se porte transversalement en dehors entre le couturier

et le droit antérieur, et se divise aussitôt en rameaux ascendans et descendans.

Les premiers se dirigent obliquement en haut et en dehors, s'enfoncent entre le muscle iliaque et les couturier et tenseur aponévrotique réunis, en se distribuant soit à eux, soit au moyen fessier dans lequel ils se terminent.

Les seconds plus considérables se dirigent obliquement en bas et se terminent soit dans le couturier, soit dans le droit antérieur. Il en est un qu'on peut suivre jusqu'à la partie inférieure de ce dernier muscle.

Les autres branches externes sont en petit nombre et aucune n'est constante. Quelques-unes naissent immédiatement au-dessous de l'arcade crurale et se jettent transversalement dans les muscles psoas et iliaque. Les autres, nées dans toute l'étendue de l'artère fémorale, se portent sur le muscle crural et s'y perdent.

Branches antérieures.

On en trouve constamment une aussi remarquable par sa ténuité que par sa longueur; on la nomme *sous-cutanée abdominale*. Elle naît immédiatement au-dessous de l'arcade crurale, remonte aussitôt un peu obliquement en dehors entre l'aponévrose abdominale et la peau jusqu'à peu de distance de l'anneau ombilical. Ses rameaux multipliés et ténus se jettent d'abord dans les glandes inguinales superficielles, puis se répandent sous la peau de l'abdomen où ils s'anastomosent en dedans avec la sous-cutanée opposée, en dehors avec l'épigastrique.

Les branches antérieures que donne la fémorale dans l'espace triangulaire antérieur de la cuisse, sont toutes fort petites et cutanées. Plus bas elle en fournit de plus volumineuses au muscle couturier qui la recouvre.

Branches postérieures. Artère musculaire profonde.

La fémorale donne en arrière dans toute son étendue, surtout inférieurement, un assez grand nombre de branches musculaires qui vont se jeter soit dans le crural, soit dans les adducteurs. Mais aucune ne peut entrer en comparaison avec *l'artère musculaire profonde* qui semble par son volume être une subdivision primitive de la fémorale elle-même, quoiqu'elle lui soit toujours un peu inférieure.

Cette artère naît de la fémorale un pouce et demi à-peu-près ou deux pouces au-dessous de l'arcade crurale. Elle descend obliquement en arrière jusqu'à l'attache supérieure de la partie moyenne du crural; là se détourne en dedans, descend sur les muscles moyen et petit adducteurs près de leur attache, en côtoyant le fémur jusqu'au milieu de la longueur de la cuisse. Diminuée de volume elle traverse alors l'aponévrose d'insertion du moyen adducteur, gagne la partie postérieure de la cuisse et se termine par deux grosses branches, d'un côté dans la courte portion du biceps, de l'autre dans le demi-aponévrotique.

Les branches que fournit la musculaire profonde dans son trajet sont : en dehors la circonflexe externe,

en dedans la circonflexe interne, en arrière les perforantes ou musculaires postérieures.

Branche circonflexe externe. Elle naît de la profonde à l'endroit où elle change de direction pour devenir interne. Son volume est tantôt médiocre, tantôt égal à celui de la profonde dont elle paroît alors être une bifurcation. Dirigée un peu obliquement en dehors et en bas derrière le muscle droit antérieur elle se divise bientôt en deux branches secondaires, l'une transversale, l'autre descendante.

La branche transversale continue son trajet sous le droit antérieur et se divise en plusieurs rameaux dont les uns remontent obliquement sur le col du fémur près de son union avec le grand trochanter et se perdent à la capsule ; les autres s'engagent sous la portion externe du crural auquel ils se distribuent en contournant le fémur en arrière; les derniers plus volumineux se portent directement en dehors et se perdent soit dans le droit antérieur, soit dans le tenseur aponévrotique.

La branche descendante beaucoup plus grosse appartient toute entière au crural. Ses rameaux très-volumineux descendent, les uns verticalement dans la portion moyenne de ce muscle, les autres obliquement en dehors dans sa portion externe. On les suit jusqu'à la partie inférieure de la cuisse.

Branche circonflexe interne. Elle naît de la profonde à l'endroit même où celle-ci naît de la fémorale. Son volume est assez considérable. Engagée aussitôt entre le pectiné et le tendon des psoas et iliaque elle contourne le fémur à la base de son col, en côtoyant l'obturateur externe, recouverte par les petit

et grand adducteurs et donnant plusieurs rameaux à tous ces muscles. Parvenue à la partie postérieure de l'os elle se divise en deux rameaux, l'un ascendant, l'autre transversal.

Le premier remonte obliquement sur le col du fémur au-devant du quarré crural et va se plonger dans la cavité digitale du grand trochanter où il se termine. Ses ramuscules appartiennent principalement au quarré, aux jumeaux et à l'obturateur interne.

Le rameau transversal plus volumineux se dirige quelque temps en dehors entre le muscle quarré et le fémur. Bientôt il se divise en deux rameaux secondaires qui traversent le quarré en s'écartant l'un de l'autre. L'un va gagner l'attache commune des muscles demi-tendineux, demi-aponévrotique et biceps, descend sur la partie antérieure de ce dernier muscle auquel il se distribue enfin. L'autre se porte vers l'attache supérieure du grand adducteur sur lequel il se distribue en entier en s'anastomosant avec les branches perforantes.

Branches perforantes ou *musculaires postérieures*. On en compte ordinairement trois; souvent il n'y en a que deux. Nées de la profonde elles traversent toutes aussitôt les muscles adducteurs près de leur attache au fémur et se portent à la partie postérieure de la cuisse pour se perdre dans les muscles épais de cette région.

La première est la plus considérable. Elle naît au-dessous du petit trochanter vers la fin du tiers supérieur de la cuisse, traverse les aponévroses d'insertion des muscles petit et grand adducteurs. Parvenue à la partie postérieure de la cuisse elle donne d'abord quelques

rameaux au muscle grand fessier près de son attache inférieure, puis se dirige obliquement en bas et en dehors jusque dans l'intervalle des muscles fléchisseurs de la jambe. Là elle fournit quelques rameaux ascendans qui se jettent dans ces muscles et vont en haut s'anastomoser avec la circonflexe interne. Mais ses rameaux principaux accompagnent inférieurement ces mêmes muscles dans lesquels ils se terminent aussi-bien que dans le grand adducteur et dans la portion externe du crural.

La seconde perforante naît beaucoup plus bas que la précédente à laquelle elle est inférieure pour le volume. Elle traverse les moyen et grand adducteurs, se divise ensuite en rameaux ascendans qui s'anastomosent avec ceux de la première, et rameaux descendans qui se réunissent à la troisième. Tous se distribuent aux mêmes muscles. C'est ordinairement de celle-ci que naît le rameau nourricier du fémur.

La troisième perforante plus petite encore que la seconde, naît à peu de distance de l'endroit où la profonde elle-même se porte en arrière, et traverse le grand adducteur à-peu-près en même temps. Sa distribution est aussi la même et n'a rien de remarquable.

Outre ces branches, la profonde donne encore dans tout son trajet un grand nombre de rameaux internes plus ou moins volumineux qui se portent aux muscles adducteurs et droit interne dans lesquels ils se perdent.

§ III. *Artère poplitée.*

C'est le nom que prend la fémorale en traversant le muscle grand adducteur pour se porter à la partie postérieure de la cuisse.

Cette artère descend un peu obliquement de dedans en dehors dans le creux du jarret et s'étend ainsi depuis le commencement du tiers inférieur de la cuisse jusqu'à la fin du quart supérieur de la jambe où elle finit en se divisant. Son volume est égal à celui qu'elle avoit étant fémorale.

En arrière la poplitée recouverte dans la plus grande partie de son étendue par le nerf sciatique et par la veine poplitée correspond d'abord au muscle demi-aponévrotique, plus bas à la graisse abondante qui dans l'espace poplité la sépare de l'aponévrose et de la peau, plus bas encore aux muscles jumeaux, jambier grêle et soléaire.

En devant elle répond dans tout l'espace poplité au fémur dont une graisse assez abondante la sépare; plus bas à l'articulation du genou au niveau des ligamens croisés, puis au muscle poplité.

En dehors voisine d'abord du biceps elle en est ensuite fort écartée par la graisse, plus bas répond immédiatement au jumeau externe, au jambier grêle et au soléaire.

En dedans elle avoisine d'abord le demi-aponévrotique, dont elle est ensuite écartée par un espace graisseux moins large que celui qui la sépare du biceps; plus bas elle répond au tronc nerveux tibial et au jumeau interne.

D'après ces rapports on voit, 1°. que la poplitée environnée en haut d'une manière assez lâche par les muscles, entourée immédiatement en bas par des muscles forts et épais, est plongée de toutes parts dans la plus grande partie de son trajet au milieu d'une graisse abondante; 2°. Que dans tout l'espace poplité elle appuie sur le fémur sans autre intermède que la graisse ; 3°. que cependant sa compression est difficile en cet endroit vu la saillie latérale des muscles demi-aponévrotique et biceps qui l'éloignent beaucoup de l'aponévrose et de la peau. D'ailleurs cette compression comprend nécessairement le nerf sciatique avec l'artère et porte toujours sur le premier avant de porter sur la seconde.

Pour décrire avec plus d'ordre les branches de la poplitée, il faut considérer cette artère dans l'espace poplité et à la partie supérieure de la jambe.

1°. *Portion poplitée.*

Elle ne donne que trois branches remarquables connues sous le nom d'*articulaires supérieures* et distinguées en interne, externe et moyenne.

Branche articulaire supérieure interne.

Elle est considérable et varie beaucoup dans son point d'origine.

Souvent elle naît de la poplitée renfermée encore dans le grand adducteur, ou même de la fémorale au-dessus de ce muscle. Elle descend alors en côtoyant le tendon et bientôt se divise en deux bran-

ches secondaires, l'une transverse, l'autre descendante.

La première s'enfonce dans la portion interne du muscle crural et bientôt y prend une direction oblique en bas et en dehors jusqu'à l'endroit où cette portion se réunit au tendon du droit antérieur. Ses rameaux répandus en tout sens dans ce vaste muscle s'y anastomosent avec ceux de la circonflexe externe.

La seconde branche côtoie le tendon du grand adducteur jusqu'à son attache au condyle interne du fémur où elle finit. Ses rameaux répandus transversalement en dedans sur le fémur se distribuent soit au muscle crural, soit au périoste de l'os. Les derniers s'enfoncent dans l'articulation du genou et s'anastomosent avec ceux de l'articulaire supérieure externe.

D'autres fois l'articulaire supérieure interne naît immédiatement au niveau du condyle correspondant, se porte transversalement sur lui et passe sous le tendon du grand adducteur pour gagner la partie antérieure du fémur. Près du tendon elle fournit un rameau ascendant qui se porte obliquement entre le fémur et le muscle crural, se distribue à ce muscle et au périoste. Puis elle se divise en plusieurs rameaux divergens qui embrassent le condyle et se répandent autour de la rotule en s'anastomosant derrière le tendon du crural avec les rameaux de l'articulaire externe.

Enfin il n'est point rare de trouver deux articulaires supérieures internes distribuées l'une de la première, l'autre de la seconde manière, sauf quelques variétés qu'il seroit impossible de spécifier toutes en détail.

Branche articulaire supérieure externe.

Elle naît au-dessus du condyle interne dont elle est plus ou moins rapprochée. Dirigée transversalement en dehors elle passe sous le muscle biceps en se contournant sur le fémur. Bientôt elle se divise en deux gros rameaux. L'un supérieur suit la direction de la branche, et s'engage entre le fémur et le muscle crural auquel il se distribue en entier.

L'autre descend obliquement en avant sur le condyle du fémur, au-dessous de l'aponévrose jusqu'à la circonférence de la rotule. Il finit sur cet os en s'anastomosant avec l'articulaire supérieure interne. Ses ramuscules se répandent soit en avant sur le muscle crural, soit en arrière sur le condyle et sur l'attache inférieure du biceps auquel la branche elle-même donne quelques rameaux avant sa division.

Branche articulaire moyenne.

Elle naît antérieurement de la poplitée, tantôt au-dessus, tantôt au niveau de l'articulation. Quand elle naît au-dessus, elle descend verticalement, et dans tous les cas traverse bientôt horizontalement d'arrière en avant l'aponévrose dont cette articulation est recouverte. Alors elle se divise en deux rameaux dont l'un descend derrière les ligamens croisés et se perd dans le tissu cellulaire qui les sépare de l'aponévrose. L'autre suit la direction horizontale de la branche et se plonge dans l'espace qui sépare les deux condyles du fémur en se perdant dans le tissu cellulaire rou-

geâtre qui occupe cet espace. Il est facile de voir qu'aucun de ces rameaux ne traverse la membrane synoviale et ne pénètre dans l'articulation proprement dite.

2°. *Portion jambière.*

Elle s'étend depuis la partie supérieure des muscles jumeaux jusqu'au niveau de l'ouverture supérieure du ligament interosseux.

Les branches qu'elle donne sont : en arrière les deux jumelles, sur les côtés les articulaires inférieures distinguées en interne et externe.

Branches jumelles.

Elles sont constantes. Nées de la partie postérieure et un peu latérale de la poplitée, elles sont séparées l'une de l'autre à leur origine par le nerf sciatique. L'externe naît souvent un peu plus bas que l'interne, et se portant obliquement en arrière gagne le milieu de la face antérieure du jumeau correspondant. L'interne un peu plus élevée dans son origine se porte sur le bord externe du jumeau de son côté. L'une et l'autre descendent sur ces muscles en conservant avec eux les mêmes rapports généraux, mais en s'enfonçant toujours plus dans leur épaisseur. On les suit sans peine jusqu'à l'endroit où ces muscles se réunissent au soléaire par une aponévrose commune.

Près de leur origine ces branches donnent quelques rameaux soit au jambier grêle, soit au poplité. Du reste elles se perdent entièrement dans les jumeaux en s'anastomosant entre elles.

Branche articulaire inférieure interne.

Elle naît assez haut de l'artère, au-dessus du muscle poplité, descend obliquement en dedans, au-dessous de la tubérosité interne du tibia qu'elle contourne, cachée d'abord par le nerf sciatique dévié de son côté et par le jumeau interne, puis engagée entre le ligament latéral interne de l'articulation et le tibia. Elle devient ensuite transversale, passe sous les tendons des couturier, droit interne et demi-tendineux, et remonte le long du ligament de la rotule jusqu'auprès de cet os où elle se réunit avec un rameau de l'articulaire inférieure externe.

Quelques-uns de ses rameaux vont au muscle poplité et au jumeau interne. Les autres se perdent sur le périoste du tibia.

Branche articulaire inférieure externe.

Elle naît plus bas que la précédente et se trouve cachée dans son origine par le muscle jambier grêle. Dirigée obliquement en haut et en dehors, elle côtoie le soléaire près de son attache, placée entre le poplité et le jumeau externe, puis s'engage sous le tendon du biceps et le ligament latéral externe de l'articulation. Alors devenue transversale, elle côtoie le bord convexe du fibro-cartilage semi-lunaire, et se porte ainsi jusqu'à la partie postérieure du ligament de la rotule. Là elle se divise en deux rameaux dont l'un se perd dans le tissu cellulaire graisseux interposé entre ce ligament et le tibia, l'autre remonte le long

du ligament pour s'anastomoser sur la rotule avec l'articulaire inférieure interne.

Dans la première partie de son trajet, cette branche fournit des rameaux au jambier grêle, au poplité et au soléaire. Dans la seconde, elle en donne supérieurement au condyle externe du fémur, inférieurement à la partie supérieure externe du tibia.

Après avoir fourni les articulaires inférieures, la poplitée descend verticalement derrière le muscle poplité, placé près de la tête du péroné, en donnant en dehors des rameaux assez volumineux au muscle soléaire près de son attache. Parvenue au-dessous du bord inférieur du poplité, elle se divise en artère tibiale antérieure et tronc tibial postérieur.

Artère tibiale antérieure.

Elle prend une direction horizontale, donne quelques rameaux au jambier postérieur et au grand fléchisseur des orteils, et traverse aussitôt le ligament interosseux. Placée dès-lors à la partie antérieure de la jambe, elle se recourbe en bas, descend obliquement entre les muscles de cette région en se rapprochant progressivement du tibia sur lequel elle se trouve enfin située inférieurement, puis passe sous le ligament annulaire supérieur du tarse, entre le grand extenseur des orteils et l'extenseur du gros orteil, et prend le nom de *pédieuse*.

En arrière la tibiale répond au ligament interosseux par ses deux tiers supérieurs et par son tiers inférieur au tibia. En devant elle répond à la réunion des muscles antérieurs de la jambe, et tout-à-fait en

bas aux deux extenseurs seulement. En dedans, appliquée d'abord contre le jambier antérieur, elle répond inférieurement au tibia. En dehors elle répond supérieurement au grand péronier et au grand extenseur des orteils, et depuis le milieu de la jambe jusqu'en bas, au seul extenseur du gros orteil. Le nerf tibial antérieur recouvre l'artère en devant dans presque toute son étendue.

Aussitôt que la tibiale antérieure a traversé le ligament interosseux, elle donne une assez grosse branche qui remonte obliquement en dedans entre le tibia et l'attache du jambier antérieur, donne à ce muscle beaucoup de rameaux, puis traverse l'aponévrose tibiale, et va à la partie inférieure du genou se terminer à la peau en s'anastomosant avec les articulaires inférieures.

Dans tout le reste de son trajet la tibiale fournit latéralement un grand nombre de rameaux aux muscles péroniers, jambier antérieur et extenseurs. Elle donne aussi plusieurs rameaux postérieurs qui traversent le ligament interosseux, et vont se jeter dans les muscles postérieurs profonds de la jambe. Aucun de ces rameaux ne mérite d'être décrit en particulier.

Vers la partie inférieure de la jambe, la tibiale donne ordinairement deux rameaux plus constans dans leur disposition. L'un interne passe transversalement derrière le tendon du jambier antérieur, gagne la malléole interne, et descend sur la partie voisine du tarse et de l'articulation du pied où il se divise en ramuscules ténus qui communiquent avec ceux de la tibiale postérieure. L'autre externe passe derrière le tendon commun à l'extenseur des orteils et au petit

péronier, descend le long de la malléole externe, et se divise en rameaux plus ou moins ténus qui se perdent sur l'articulation du pied et sur le tarse, en communiquant avec la péronière et avec la plantaire externe.

Artère pédieuse.

Cette artère qui n'est que la continuation de la tibiale antérieure commence au niveau de l'articulation du pied, se porte horizontalement en avant sur la partie supérieure et interne du tarse, couverte d'abord par l'extenseur du gros orteil, puis placée en dehors de son tendon, en dedans du muscle petit extenseur commun ou pédieux jusqu'à l'intervalle des deux premiers os du métatarse. Là elle s'engage sous le premier tendon du muscle pédieux, puis traverse verticalement le muscle interosseux correspondant et gagne la plante du pied où elle se divise en deux branches.

Dans son trajet la pédieuse donne des branches internes et externes.

Les internes assez nombreuses, mais peu remarquables, se répandent sur le bord interne du pied et s'y ramifient en s'anastomosant avec la plantaire interne.

Les externes plus multipliées se répandent sur la face supérieure du pied et se distribuent principalement au muscle pédieux. Deux d'entre elles, nommées *tarsienne* et *métatarsienne*, méritent une description particulière.

Branche tarsienne. Elle naît de la pédieuse, près de son origine, au niveau de la tête du scaphoïde,

se dirige obliquement en avant et en dehors, s'engage bientôt sous le muscle pédieux, et couverte par lui se recourbe sur le tarse pour se porter directement vers le bord externe du pied où elle passe sous le tendon du grand péronier, et finit par quelques rameaux anastomosés avec la plantaire externe. Elle donne dans ce trajet beaucoup de rameaux soit au pédieux qui la recouvre, soit aux ligamens du tarse. Un d'eux plus volumineux s'enfonce dans l'espace qui sépare les os scaphoïde et calcanéum, et se distribue aux portions ligamenteuses qui remplissent cet espace.

Branche métatarsienne. Elle naît de la pédieuse, près de l'endroit où cette artère s'enfonce dans l'espace interosseux. Inférieure en volume à la tarsienne, elle fournit des rameaux plus remarquables. Dirigée obliquement en avant et en dehors, elle s'engage tout de suite sous le premier tendon du muscle pédieux dont elle croise la direction, puis se recourbe en dehors et suit transversalement l'articulation du métatarse avec le tarse jusqu'au bord interne du pied. Dans ce trajet elle donne des rameaux postérieurs et antérieurs.

Les rameaux postérieurs, peu importans, et en nombre incertain, se répandent sur le tarse et s'y perdent en se distribuant principalement au muscle pédieux.

Les rameaux antérieurs, au nombre de trois, se portent dans les second, troisième et quatrième espaces interosseux, communiquent avec quelques rameaux perforans de l'arcade plantaire, puis suivent en devant les espaces interosseux où ils se trouvent, appliqués sur les muscles interosseux dorsaux jus-

qu'aux articulations des orteils. Là ils communiquent avec les rameaux perforans antérieurs de l'arcade plantaire et se divisent ensuite chacun en deux rameaux qui suivent les bords correspondans des orteils depuis le bord externe du second jusqu'au bord interne du dernier, et se perdent enfin dans la peau.

Immédiatement avant de s'enfoncer dans le premier espace interosseux, la pédieuse donne une branche assez grosse qui côtoie en dehors le premier os du métatarse jusqu'à son articulation avec le gros orteil. Là elle se divise en deux rameaux dont l'un suit le bord externe du premier orteil, l'autre le bord interne du second. L'un et l'autre finissent dans les tégumens.

Parvenue à la plante du pied, la pédieuse se détourne en dehors, s'engage entre l'accessoir du grand fléchisseur et les interosseux plantaires, et se divise aussitôt en deux branches d'égal volume.

L'une suit en avant l'intervalle des deux premiers os du métatarse, placée entre les muscles adducteur oblique et petit fléchisseur du gros orteil auxquels elle donne des rameaux dont un plus volumineux contourne le gros orteil et gagne son bord interne qu'elle suit jusqu'à l'extrémité de ce doigt ; puis elle traverse le petit fléchisseur et se divise en deux rameaux dont l'un suit le bord externe du gros orteil, l'autre le bord interne du second.

La seconde branche continue à se porter en dehors en suivant le trajet primitif de la pédieuse, et s'anastomose bientôt avec la plantaire externe en concourant ainsi à former l'arcade plantaire.

J'ai vu la première de ces deux branches se comporter différemment et aller gagner l'intervalle des

troisième et quatrième os du métatarse pour se distribuer par deux rameaux aux côtés externe du troisième orteil et interne du quatrième. Dans ce sujet les deux premiers orteils et le bord interne du troisième ne recevoient que les rameaux collatéraux fournis sur le dos du pied par la pédieuse.

Tronc tibial postérieur.

Il descend derrière le ligament interosseux au-devant du nerf tibial postérieur, et après quelques lignes de trajet se divise en deux artères nommées *péronière* et *tibiale postérieure*.

1°. *Artère péronière.*

C'est la moins volumineuse. Née du tronc tibial elle se dirige un peu obliquement en dehors, se place sur le bord interne du péroné qu'elle suit verticalement jusqu'au tiers inférieur de la jambe, placée d'abord sur le muscle jambier postérieur, puis renfermée entre ses fibres, et recouverte en arrière en partie par le fléchisseur du gros orteil et dans toute son étendue par les muscles soléaire et jumeaux.

Dans tout ce trajet la péronière fournit un grand nombre de rameaux soit externes et postérieurs, soit internes.

Les externes et postérieurs sont les plus volumineux. Dirigés obliquement en bas ils se jettent tous dans les soleaire et jumeaux; quelques-uns même sortent en dehors entre ces muscles et le péroné pour se perdre dans les tégumens.

Les rameaux internes plus petits se répandent dans

les muscles jambier postérieur, grand fléchisseur des orteils et grand fléchisseur du gros orteil. Un d'eux né tout-à-fait en bas de la péronière, se porte transversalement au-devant des muscles fléchisseurs pour aller s'anastomoser avec la tibiale postérieure.

Parvenue au tiers inférieur de la jambe la péronière se divise en deux branches, l'une postérieure, l'autre antérieure.

Branche postérieure. Elle suit le trajet primitif de l'artère en se portant sur la face postérieure du péroné, puis sur l'articulation du pied jusqu'au côté externe du calcanéum et en distribuant de nombreux rameaux aux muscles jambier postérieur et fléchisseurs, aux grand et moyen péroniers, à l'articulation. Parvenue sur le côté du calcanéum elle se divise en plusieurs rameaux qui se répandent dans le tissu cellulaire graisseux abondant de cette partie et aux tégumens en se prolongeant plus ou moins sur le bord externe du pied. Un d'entre eux s'engage transversalement sous la malléole externe et va en devant s'anastomoser avec le rameau externe inférieur de la tibiale antérieure.

Branche antérieure. Elle traverse le ligament interosseux, donne aussitôt quelques rameaux au muscle petit péronier sous lequel elle se trouve, descend ensuite au-devant du ligament, puis sur l'articulation péronéo-tibiale, là se recourbe en avant et en dedans et va s'anastomoser avec l'artère tibiale antérieure. La petite arcade qu'elle forme donne des rameaux plus ou moins nombreux qui descendent sur l'articulation du pied et sur sa région dorsale, s'y ramifient et se perdent dans le muscle pédieux.

Cette branche antérieure manque quelquefois ; ailleurs elle est très-volumineuse. J'ai vu sur un sujet la péronière elle-même traverser le ligament interosseux et aller former l'artère pédieuse, la tibiale antérieure finissant entre les muscles antérieurs de la jambe : ce cas est assez rare.

2°. *Artère tibiale postérieure.*

C'est la plus volumineuse et la moins profonde des deux. Née du tronc tibial postérieur elle se dirige un peu obliquement en dedans, se place au côté interne du nerf tibial postérieur et se recourbe légèrement sur elle-même pour descendre ensuite verticalement entre les deux couches musculaires postérieures de la jambe jusque sous la voûte du calcanéum où elle se divise en deux branches. En devant, elle répond supérieurement à l'intervalle des deux os de la jambe et au jambier postérieur, plus bas au grand fléchisseur des orteils et au tibia seulement. En arrière, recouverte dans ses deux tiers supérieurs par les muscles jumeaux et soléaire elle côtoie par son tiers inferieur le bord interne du tendon d'Achille et tout-à-fait en bas n'est plus recouverte que par l'aponévrose tibiale et par la peau.

Dans son trajet la tibiale postérieure fournit des rameaux peu nombreux et peu considérables. Les muscles soléaire et jumeaux sont ceux qui en reçoivent le moins, souvent même elle ne leur en donne aucun. Presque tous se distribuent latéralement aux muscles jambier postérieur et fléchisseurs, au périoste du tibia et à la peau. C'est elle qui fournit au tibia son rameau

nourricier, un des plus volumineux de cette espèce. Souvent il vient de la poplitée ou du tronc tibial postérieur.

Parvenue sous la voûte du calcanéum, la tibiale postérieure donne quelques rameaux aux muscles adducteur du gros orteil, petit fléchisseur des orteils et à la peau. Puis elle se divise en deux branches volumineuses qui sont les artères plantaires interne et externe.

Artère plantaire interne.

C'est la moins volumineuse. Cachée dans son origine par le ligament annulaire interne elle se porte horizontalement en avant sous le muscle adducteur du gros orteil contre lequel elle est immédiatement appliquée, se détourne ensuite un peu en dedans, continue à se porter en avant sous le petit fléchisseur du même orteil et finit en s'anastomosant par plusieurs divisions avec les premiers rameaux collatéraux.

Dès son origine la plantaire interne fournit des rameaux nombreux soit à l'articulation du pied avec la jambe, soit aux muscles superficiels de la plante du pied. Quelques-uns de ces rameaux plus considérables que les autres s'engagent au-dessus des muscles profonds et vont se répandre sur les ligamens nombreux qui unissent inférieurement entre eux les os du tarse.

Dans le reste de son trajet la plantaire interne distribue principalement ses rameaux au muscle adducteur du gros orteil. Plusieurs cependant se portent en dehors, donnent au petit fléchisseur commun et traversent l'aponévrose plantaire pour se perdre dans

le tissu graisseux abondant et dans les tégumens de la plante du pied.

2°. *Artère plantaire externe.*

Son volume et son étendue la font regarder comme la principale continuation de la tibiale postérieure. Née au même endroit que la précédente, elle se porte obliquement en bas et en dehors en suivant la face interne concave du calcanéum, passe entre le petit fléchisseur commun et l'accessoire du grand fléchisseur. Parvenue à la plante du pied elle se recourbe légèrement sur elle-même pour se porter horizontalement en avant, toujours placée entre les muscles petit fléchisseur et accessoire jusqu'à l'extrémité antérieure du tarse et au niveau de l'origine du court fléchisseur du petit orteil. Là elle se recourbe beaucoup plus en dedans et en haut en s'enfonçant entre le grand fléchisseur commun et les interosseux, se rapproche de l'extrémité postérieure du premier os du métatarse et forme ainsi en s'anastomosant avec la pédieuse l'arcade plantaire, arcade dirigée obliquement en haut et en avant, répondant au métatarse par sa convexité, et au tarse par sa concavité.

Ainsi l'artère plantaire externe dirigée d'abord obliquement en dehors et en bas, puis horizontalement en devant, puis très-obliquement en dedans, en avant et en haut, présente dans son ensemble une grande courbure dont la convexité répond à la partie externe de la plante du pied, la concavité à sa partie moyenne interne, en sorte que les points d'origine et de terminaison de ce vaisseau se trouvent à-peu-près sur la même ligne.

Peu après son origine la plantaire externe donne une branche assez grosse qui descend verticalement sur la partie interne du calcanéum jusqu'à la partie inférieure de cet os, en se distribuant aux attaches des muscles adducteur du gros orteil et petit fléchisseur commun des orteils.

Depuis cet endroit jusqu'à celui où la plantaire externe s'enfonce sous les interosseux pour former l'arcade plantaire, cette artère donne beaucoup de rameaux, dont les uns se répandent dans les muscles fléchisseurs communs, accessoire, abducteur du petit orteil; les autres traversent l'aponévrose plantaire, et vont se perdre aux tégumens.

L'arcade plantaire fournit un grand nombre de branches qu'on peut distinguer en supérieures, inférieures, postérieures et antérieures.

Les supérieures, au nombre de trois, traversent verticalement les espaces interosseux, et donnant des rameaux aux muscles qui les remplissent, vont sur le dos du pied s'anastomoser avec les rameaux de la branche métatarsienne fournie par la pédieuse. On les nomme ordinairement *perforantes postérieures*.

Les inférieures et les postérieures, peu remarquables, se répandent soit dans les muscles superficiels de la plante du pied, soit au muscle accessoire et aux ligamens inférieurs du tarse.

Les antérieures, très-volumineuses, sont pour l'ordinaire au nombre de quatre. La première, dirigée obliquement en dehors, se porte sous le court fléchisseur du petit orteil, lui donne de nombreux rameaux, et finit sur le bord externe de ce même orteil dont

elle forme le rameau collatéral externe. Les trois autres suivent horizontalement en avant les trois derniers espaces interosseux en donnant des rameaux soit aux muscles qui les remplissent, soit aux lombricaux. Parvenues vers l'extrémité antérieure du metatarse, ces branches s'engagent au-dessus du muscle abducteur transverse du gros orteil, donnent chacune deux petits rameaux qu'on a nommés *perforans antérieurs*, parce qu'ils traversent verticalement les espaces interosseux pour s'anastomoser avec les rameaux interosseux de la branche métatarsienne. Enfin les trois branches après avoir franchi le muscle abducteur transverse se divisent chacune en deux gros rameaux qui suivent les bords correspondans des orteils, depuis le bord interne du petit jusqu'au bord externe du second. Ces rameaux s'anastomosent ensemble par arcades aux extremités des orteils en donnant des ramuscules plus ou moins nombreux aux gaines tendineuses et à la peau.

Remarques sur la disposition générale des artères du bassin et des membres inférieurs.

L'iliaque primitive fournie par l'aorte se divise presque aussitôt en deux troncs secondaires fort inégaux en volume et surtout en longueur.

L'un de ces troncs s'enfonce dans le bassin et se divise sur-le-champ en une multitude de branches qui s'écartent sous diverses directions. Ces branches peuvent être rapportées à deux classes. Les unes appartiennent spécialement aux organes contenus dans le bassin, comme l'hemorroïdale, les vesicales, la honteuse, et chez la femme l'utérine et la vaginale.

Les autres appartiennent aux parois même du bassin et aux muscles qui le recouvrent, soit en dedans, soit en dehors; ce sont les iléo lombaires, sacrées latérales, fessière, ischiatique et obturatrice. Les sacrées latérales fournissent en outre les rameaux de la partie inférieure de la moelle, et continuent ainsi le système artériel spinal formé plus haut par les vertébrales, intercostales et lombaires.

De toutes ces branches, la seule sur laquelle je crois devoir fixer ici l'attention, c'est l'ischiatique. Prolongée à la partie postérieure de la cuisse en suivant le trajet du nerf sciatique, elle établit par ses anastomoses avec les circonflexes la communication la plus directe entre le tronc hypogastrique et le tronc fémoral, et peut concourir à entretenir la circulation dans le membre inférieur, lorsque l'artère fémorale a été liée vers le milieu de son trajet.

L'autre tronc fourni par l'iliaque primitive est beaucoup plus considérable. Il suit le psoas, sort du bassin et se continue sans se diviser jusqu'à la partie supérieure et postérieure de la jambe. Avant de quitter le bassin il communique directement avec la sous-clavière par l'artère épigastrique qui fournit en même temps aux muscles abdominaux une grande partie de leurs branches artérielles conjointement avec la circonflexe iliaque née à-peu-près au même endroit.

Le même tronc artériel dans sa portion fémorale nous offre des traits de ressemblance très-marqués avec l'artère brachiale. Ses branches principales naissent de sa partie supérieure et il en fournit peu dans le reste de son trajet. Parmi ces branches on en

trouve trois très-considérables. Deux nommées *circonflexes* embrassent le fémur, comme les circonflexes brachiales embrassent l'humérus. La troisième, sous le nom d'*artère profonde*, descend le long des adducteurs et appartient toute entière par ses rameaux aux muscles postérieurs du membre, comme la branche interne profonde de la brachiale appartient toute entière au brachial postérieur.

Cette disposition analogue des artères brachiale et fémorale permet d'appliquer à l'une les mêmes considérations pratiques qu'on a faites sur l'autre. Ainsi la connoissance du point d'origine de la profonde et des circonflexes prouve la possibilité de lier l'artère fémorale dans la plus grande partie de son trajet sans que la circulation soit interrompue dans le membre inférieur.

On pourroit comparer aussi, quoiqu'avec moins d'exactitude, la disposition des branches articulaires de la poplitée avec celle des récurrentes fournies à l'articulation du coude par les radiale et cubitale.

Trois artères principales terminent inférieurement le tronc fémoral devenu poplité et se portent à la jambe. Une seule occupe la partie antérieure garnie de moins de muscles, et les deux autres occupent la partie postérieure où les muscles les plus forts sont réunis. Ces trois artères ne se ressemblent point dans leur mode de distribution. La tibiale antérieure répand bien ses rameaux aux muscles dans l'intervalle desquels elle descend, comme la péronière les distribue aux muscles postérieurs et profonds qu'elle traverse; mais la tibiale postérieure fournit très-peu de branches aux deux couches musculaires entre lesquelles

elle est interposée. Destinée presque exclusivement au pied, elle s'y rend directement et ne commence à se diviser que quand elle y est arrivée. C'est de la poplitée que les muscles jumeaux et soléaire reçoivent immédiatement les branches artérielles principales qui leur appartiennent.

Au pied comme à la main les rameaux artériels peu volumineux et peu multipliés sur la région dorsale, se réunissent presque tous du côté des muscles fléchisseurs. Mais une seule arcade artérielle occupe la plante du pied, tandis que la main en présente deux, quoique le pied présente ici le même nombre proportionnel de muscles que la main. Il y a donc au pied une impulsion circulatoire moins considérable et moins énergique, et il est difficile de ne pas trouver ici un rapport sensible entre le nombre des vaisseaux et la quantité des mouvemens musculaires. Le pied, en effet, n'est susceptible que de mouvemens très-bornés, tandis que ceux de la main sont très-nombreux, très-étendus et très-variés.

SYSTÈME VEINEUX.

Considérations générales.

Les veines, conduits naturels du sang noir, forment dans l'économie deux systèmes tout-à-fait distincts. L'un général commence dans tous les organes par des ramuscules fort ténus et finit dans le cœur par deux troncs volumineux. L'autre borné à l'abdomen naît de même par une infinité de rameaux sur les

organes digestifs et dans la rate. Ces rameaux successivement diminués en nombre et accrus en volume se réduisent enfin à un seul tronc qui gagne le foie et s'y termine en se divisant de nouveau.

Le système veineux général, destiné à rapporter de tous les organes au cœur le sang que le cœur a transmis à tous les organes par le système artériel, doit être regardé comme la seconde partie du grand appareil circulatoire. Le système veineux abdominal au contraire destiné à porter au foie le sang des organes digestifs et de la rate, doit être considéré comme un appareil circulatoire particulier, et de même que le cœur est l'organe central et le terme du système veineux général, le foie est l'organe central et le terme du système veineux abdominal.

C'est d'après cette considération purement anatomique, et abstraction faite de toute opinion physiologique sur les usages encore douteux du sang de la veine porte, que nous nous sommes décidés à renvoyer la description du système veineux abdominal à l'article du foie. Il ne sera donc question dans ce moment que du système veineux général.

J'ai dit que les veines formoient par leur ensemble comme par leurs fonctions, la seconde partie du grand appareil circulatoire. Sous ce point de vue on peut les comparer aux artères qui forment la première partie du même appareil. Mais les veines diffèrent des artères sous trois rapports essentiels; 1°. par leur nombre, 2°. par leur disposition, 3°. par leur organisation.

1°. Par leur nombre. Chaque artère est accompagnée au moins par une veine qui se divise comme

elle et fournit une égale quantité de rameaux. Il y a donc autant de veines que d'artères. Mais, 1°. souvent une artère est accompagnée soit dans son tronc, soit dans ses divisions par deux veines d'égal volume. Ainsi on trouve deux veines brachiales, deux radiales, deux cubitales. 2°. Presque toujours les veines presentent un nombre de divisions fort supérieur à celui des divisions artérielles : les veines spermatiques, les vésicales en offrent des exemples frappans. 3°. Il y a plusieurs ordres de veines qui ne correspondent à aucune artère; telles sont au membre supérieur les céphalique, basilique, cubitales superficielles; au membre inférieur les saphènes. Il y a donc beaucoup plus de veines que d'artères.

2°. Par leur disposition. En général les veines qui accompagnent les artères leur sont immédiatement contiguës, se divisent aux mêmes endroits, se distribuent de la même manière quel que soit le nombre de leurs rameaux. On ne décrit point alors ces veines dont le trajet est suffisamment indiqué par celui des artères déjà décrites. Mais 1°. souvent les artères sont très-flexueuses tandis que les veines sont presque toujours droites. La veine alors s'éloigne de l'artère en plusieurs endroits, et cet éloignement est quelquefois considérable. On en trouvera un exemple sensible dans la veine faciale comparée à l'artère de même nom. Dans ces cas les divisions veineuses plus multipliées, leurs anastomoses plus fréquentes suppléent à ce défaut de flexuosités. 2°. Quelquefois les troncs veineux diffèrent absolument des troncs artériels pour la disposition,

quoique les branches qu'ils fournissent correspondent exactement à celles que les troncs artériels ont fournies. Ainsi dans le thorax, à l'origine même du système veineux, les veines caves n'ont aucun rapport de disposition avec l'aorte, et c'est de l'intercostale supérieure gauche, de l'azygos et de la demi-azygos que naissent les veines destinées à accompagner immédiatement les artères intercostales aortiques. 3°. Quelquefois sur un même organe les veines principales se trouvent du côté opposé aux artères, quoiqu'elles leur correspondent immédiatement pour les fonctions. Ainsi au cerveau les troncs artériels occupent la base de l'organe, et les troncs veineux les plus considérables et les plus gros en occupent la surface convexe. Ainsi au foie l'artère hépatique pénètre en bas, les veines hépatiques sortent en arrière. 4°. Enfin les veines superficielles qui, comme la céphalique, les saphènes ne correspondent à aucune artère ont évidemment une disposition qui leur est propre et doivent être décrites en particulier.

3°. Par leur organisation. Les veines sont formées à l'extérieur par un tissu propre, lâche, extensible, formé de fibres longitudinales plus ou moins apparentes, plus ou moins rapprochées. C'est au peu de consistance de ce tissu qu'est due la flaccidité ordinaire des veines lorsque le sang cesse de les remplir. C'est à son extensibilité qu'est dû le volume énorme que les veines acquièrent par les injections, moyen très-infidele que cette seule raison devroit faire proscrire dans l'étude du système veineux, tandis qu'il est si avantageux dans celle du système artériel. Comment en effet reconnoître les rapports des

veines avec les organes environnans, lorsque distendues trois fois au-delà de leur calibre naturel elles occupent beaucoup plus d'espace qu'elles n'en occupoient dans l'état de vie? Ajoutons que les injections sont ici presque toujours inutiles. Le sang qui stagne après la mort dans les veines, et dont la couleur s'aperçoit au travers de leurs parois, permet facilement de les reconnoître, même dans leurs divisions les plus ténues. Lorsqu'une veine est vide, on s'assure sans peine de son existence et de son trajet en y faisant passer avec le doigt le sang des veines les plus voisines, et cette injection naturelle est la meilleure qu'on puisse employer, à moins qu'on ne veuille poursuivre les veines jusque dans le tissu des os.

A l'intérieur, les veines sont formées par une membrane mince, extensible, jamais ossifiée. Cette membrane n'appartient pas seulement aux veines proprement dites. C'est elle qui tapisse les cavités droites du cœur et l'artère pulmonaire; c'est elle qui, prolongée dans les sinus cérébraux, s'y trouve interposée entre le sang et la dure-mère. Elle seule par conséquent s'étend à toutes les parties du système à sang noir, et selon que divers tissus lui sont ajoutés en dehors, il résulte de cette union un organe musculeux, une artère, une veine ou un sinus. C'est là l'idée qu'on doit se faire de cette membrane. Considérée dans les veines, elle y forme de temps en temps sur elle-même des replis semi-lunaires connus sous le nom de *valvules*. Ces valvules, quelquefois isolées, souvent disposées deux à deux, rarement trois à trois, sont surtout nombreuses dans les divisions de la veine cave inférieure, un peu moins dans

la supérieure; elles sont nulles dans les sinus cérébraux et dans quelques veines particulières. Elles empêchent le sang de rétrograder pendant son trajet vers le cœur, et favorisent ainsi la circulation. Mais par la même raison elles empêchent les fluides injectés dans les veines de se porter librement des troncs vers les rameaux; ce qui augmente les difficultés et les inconvéniens de ce genre de préparation anatomique.

Je ne m'arrêterai pas davantage sur la disposition et sur l'organisation des veines. Tout ceci a été traité avec le plus grand détail dans l'*Anatomie générale*, et le lecteur me saura gré sans doute de l'y renvoyer.

Pour se conformer dans la description à l'ordre circulatoire, le seul naturel, il faudroit prendre les veines à leurs origines multipliées et ténues dans le système capillaire, suivre leurs rameaux à mesure qu'ils se réunissent en branches plus volumineuses, et finir par les veines caves et cardiaques. Cette méthode n'est pas impraticable, mais on conçoit qu'en portant l'attention sur une multitude d'objets à la fois pour la ramener ensuite du plus composé au plus simple, elle jetteroit beaucoup de confusion dans l'esprit de ceux qui commencent, et leur rendroit fastidieuse une étude que la méthode inverse rend extrêmement facile. Nous nous conformerons donc à l'usage reçu, et nous supposerons que les troncs veineux partent du cœur pour se diviser en avançant vers les organes. La moindre réflexion suffit pour empêcher que cette supposition ne donne lieu à de fausses idées physiologiques.

Tout le sytème veineux général est compris sous les divisions suivantes :

1°. Les veines cardiaques.

2°. La veine cave supérieure.

3°. La veine cave inférieure.

4°. Les veines iliaques primitives, suite de la veine cave inférieure.

Nous ne comprenons point dans notre description les veines pulmonaires, parce qu'elles appartiennent au système à sang rouge, et qu'elles ont été examinées en détail à l'occasion du poumon. Nous n'y comprendrons pas non plus la veine ombilicale qui appartient entièrement à l'histoire du fœtus.

I. DES VEINES CARDIAQUES.

On les distingue en postérieures et antérieures. Les premières, ordinairement au nombre de deux, sont les plus considérables et les plus importantes. Toutes naissent de l'oreillette droite.

1°. *Veines cardiaques postérieures.*

Elles naissent ensemble de la partie postérieure et inférieure de l'oreillette droite au-dessous de l'embouchure de la veine cave inférieure, près de la cloison commune des oreillettes. On peut distinguer ces veines en grande et petite.

La grande veine cardiaque postérieure se dirige aussitôt obliquement à gauche et en bas entre les parois des oreillettes et la membrane séreuse du péricarde, et après un trajet d'un pouce à-peu-près parvient à la base du ventricule aortique. Là elle change

de direction, devient horizontale, s'engage dans le sillon qui sépare les oreillettes d'avec les ventricules, suit ce sillon à gauche jusqu'au bord obtus du cœur, plongée dans une grande quantité de graisse, et répandant sur la face plane du cœur des rameaux plus ou moins nombreux. Elle contourne ensuite le bord obtus du cœur en se dirigeant obliquement en bas et descend dans le sillon graisseux qui se trouve près de ce bord sur la face convexe, en accompagnant la branche correspondante de l'artère cardiaque postérieure dont elle est séparée par un peu de graisse. Elle finit vers le sommet du cœur en s'anastomosant par plusieurs rameaux avec la seconde cardiaque postérieure et avec les cardiaques antérieures.

La petite veine cardiaque postérieure née au même endroit que la précédente, descend verticalement sur la paroi de l'oreillette jusqu'à la base des ventricules, en donnant de nombreux rameaux soit à l'oreillette, soit au ventricule droit. Elle s'engage ensuite dans le sillon qui sur la face plane du cœur répond à la cloison commune des ventricules, parcourt ce sillon dans toute son étendue en donnant beaucoup de rameaux soit aux deux ventricules, soit à leur cloison, et sur le sommet du cœur s'anastomose par plusieurs branches avec la veine précédente et avec les cardiaques antérieures.

Je reviens un moment sur la disposition des veines cardiaques postérieures à leur ouverture dans l'oreillette droite, et je considère ces vaisseaux, non plus du tronc aux rameaux, comme la description l'exigeoit, mais des rameaux au tronc, comme l'ordre de la circulation le demande.

J'ai dit que ces deux veines naissoient ou plutôt aboutissoient au même endroit. Cependant pour l'ordinaire elles ont chacune une embouchure distincte et isolée. La petite remonte verticalement depuis la face plane du cœur jusqu'à l'oreillette où elle s'ouvre dans la même direction. La grande se porte *obliquement de gauche à droite*, depuis sa distribution aux ventricules jusqu'à l'oreillette où elle s'ouvre dans le même sens oblique au-dessus de la précédente.

Mais dans l'oreillette une valvule commune formée par un repli de la membrane interne, recouvre ces deux ouvertures. Cette valvule verticale suivant sa longueur, *obliquement* dirigée *de droite à gauche* suivant sa largeur, regarde par son bord libre concave la cloison des oreillettes, et se perd en dehors sur les parois de l'oreillette droite par son bord adhérent. Un stylet introduit sous cette valvule, se dirige de gauche à droite, mais ne pénètre ni dans l'une ni dans l'autre veine, et se trouve bientôt arrêté. Pour l'introduire dans la grosse veine cardiaque, il faut le porter le plus haut possible sous la valvule, et le renverser ensuite de droite à gauche en repliant fortement la valvule sur elle-même; il pénètre alors avec facilité. Pour l'introduire dans la petite veine cardiaque, il faut le porter à la partie inférieure de la valvule, et le diriger ensuite verticalement de haut en bas.

On voit donc 1°. que la valvule des veines cardiaques ne se trouve disposée dans le sens ni de l'une ni de l'autre ouverture veineuse; 2°. qu'elle a même une direction tout-à-fait opposée à celle de la grande

veine cardiaque. Cette disposition très-évidente lorsque la valvule des veines cardiaques est bien développée, l'est beaucoup moins quand cette valvule a peu de largeur, ce qui arrive assez fréquemment.

2°. *Veines cardiaques antérieures.*

Elles sont beaucoup plus petites et variables en nombre. Souvent cependant un seul tronc les fournit. Ce tronc naît de la partie antérieure et inférieure de l'oreillette droite. Son ouverture dans cette cavité est couverte en partie par une espèce de valvule épaisse, ou plutôt par un petit faisceau charnu analogue aux valvules par sa forme et présentant en haut son bord libre et concave. Dirigé verticalement en bas, ce petit tronc veineux franchit le sillon qui sépare les oreillettes des ventricules, en passant au-devant de l'artère cardiaque postérieure qui occupe ce sillon; et parvenu sur le ventricule droit, il se divise en deux ou trois branches qui descendent en se ramifiant sur la face convexe du cœur pour se terminer près du sommet de cet organe, en s'anastomosant avec les veines cardiaques postérieures.

Des veines plus petites encore appartenant soit aux oreillettes soit aux parois des artères aorte et pulmonaire, viennent s'ouvrir isolément dans différens points de l'oreillette droite.

II. DE LA VEINE CAVE SUPÉRIEURE.

La veine cave supérieure naît de l'oreillette droite en haut et en dehors, cachée en partie antérieure-

ment par l'appendice flottante de cette cavité. Elle est continue de toutes parts avec les parois de l'oreillette, et principalement à droite avec la veine cave inférieure dont l'origine a lieu au même endroit. Renfermée dans le péricarde dont la membrane séreuse l'enveloppe, elle remonte verticalement, placée à droite de l'aorte de laquelle un petit espace la sépare, et après deux pouces à-peu-près de trajet, sort de cette cavité dont la portion fibreuse l'enveloppe et l'accompagne pendant quelque temps, en lui formant une espèce de gaîne plus ou moins prolongée et identifiée avec ses parois. Elle continue à se porter en haut, légèrement inclinée à droite et en arrière jusqu'au niveau du cartilage de la première côte, un peu au-dessus de la grande courbure aortique, et là se divise en deux gros troncs nommés *veines sous clavières*.

Depuis sa sortie du péricarde jusqu'à sa division, la veine cave supérieure répond, en devant au thymus et au tissu cellulaire qui remplit l'écartement supérieur du médiastin, en arrière à la veine pulmonaire droite supérieure et en partie à l'aorte, à droite au poumon dont elle n'est séparée que par la portion médiastine de la plèvre, à gauche à la portion de péricarde prolongée sur l'aorte. On voit donc que la veine cave supérieure se trouve tout-à-fait à droite et ne correspond point du tout à la ligne médiane.

Tant que la veine cave supérieure est renfermée dans le péricarde, elle ne fournit aucune branche. Depuis sa sortie du péricarde jusqu'à sa terminaison elle donne en devant la veine thorachique interne droite, la thyroïdienne inférieure droite, et plusieurs

veines plus petites nommées *thymique*, *médiastine*, *péricardine*, *diaphragmatique supérieure droite*; en arrière elle fournit une veine beaucoup plus considérable nommée *azygos*.

1°. *Veine thorachique interne droite.*

Elle naît antérieurement de la veine cave un peu avant sa division, quelquefois au niveau même de cette division, tantôt isolément, tantôt par un tronc commun à elle et à la thyroïdienne inférieure. Dirigée obliquement en avant, en dehors et en bas, elle se porte à la partie postérieure des cartilages costaux près du sternum, immédiatement appliquée sur l'artère de même nom qu'elle, suit exactement cette artère soit par son tronc, soit par le nombre et par la disposition de ses rameaux, et finit près de l'ombilic en s'anastomosant avec la veine épigastrique.

2°. *Veine thyroïdienne inférieure droite.*

Elle naît tantôt de la veine cave au niveau de sa division, tantôt du commencement de la veine sous-clavière droite. Dirigée obliquement en haut et en dedans, derrière les muscles sterno-thyroïdiens et sterno-hyoïdiens, au-devant de l'artère innominée et du nerf vague, elle gagne la partie inférieure de la glande thyroïde, et se recourbant à gauche s'anastomose par arcade avec la veine thyroïdienne inférieure gauche. Dans ce trajet elle donne un grand nombre de rameaux au thymus, au médiastin et aux muscles qui la recouvrent. Nous reviendrons sur son

mode de terminaison en décrivant la thyroïdienne inférieure gauche.

Je ne parle point des veines thymique, médiastine, diaphragmatique supérieure droite fournies par la veine cave; leur distribution absolument semblable à celle des artères qu'elles suivent est suffisamment indiquée par leur nom.

3°. *Veine azygos.*

Elle naît de la veine cave immédiatement au-dessus de la bronche droite, se porte en arrière et à droite entre l'œsophage dont elle croise la direction et le feuillet correspondant du médiastin postérieur. Dans ce trajet elle se recourbe inférieurement, et parvenue sur la partie latérale antérieure de la colonne vertébrale, elle prend une direction verticale. Parallèle alors à l'aorte et à l'œsophage, placée un peu en dehors de celui-ci et toujours subjacente à la plèvre droite, elle descend sur la colonne vertébrale jusqu'à la partie inférieure du thorax, sort de cette cavité tantôt par l'ouverture aortique du diaphragme, tantôt en dehors de cette ouverture en traversant les attaches du diaphragme à la première vertèbre lombaire. Arrivée dans l'abdomen, elle finit tantôt en s'anastomosant toute entière avec la veine cave inférieure, tantôt en se divisant en deux branches qui s'écartent à angle aigu, se portent sur les côtés de la colonne vertébrale en se recourbant un peu en haut, et s'anastomosent avec les premières veines lombaires.

Près de son origine, l'azygos donne par la convexité de sa courbure *la veine bronchique droite*,

toujours peu volumineuse. Cette veine donne des ramuscules à l'œsophage, et se porte ensuite sur la bronche dont elle suit les divisions dans le poumon. Quelquefois elle naît de la veine cave supérieure.

D'autres petites veines, nées au même endroit de l'azygos, vont se distribuer à la trachée, aux glandes bronchiques et au péricarde.

L'azygos, depuis qu'elle est parvenue sur le corps des vertèbres jusqu'à sa sortie du thorax, donne *en devant* plusieurs rameaux à l'aorte et à l'œsophage. Quelques-unes de ces veines œsophagiennes sont assez volumineuses, surtout inférieurement.

A droite l'azygos donne des branches beaucoup plus considérables : ce sont les *veines intercostales inférieures droites*. La première naît encore de la courbure de l'azygos près de sa fin. Elle remonte obliquement en arrière jusqu'au troisième espace intercostal auquel elle appartient et où elle se comporte comme les suivantes. Lorsque la veine intercostale supérieure droite ordinairement fournie par la sous-clavière n'existe pas, celle dont nous parlons la supplée en fournissant une branche plus ou moins volumineuse qui remonte sur les second et premier espaces, et leur distribue ses rameaux.

Les autres intercostales suivent exactement le trajet et la distribution des artères qu'elles égalent en nombre. Leurs branches postérieures introduites dans le canal vertébral par les trous de conjugaison vont se jeter dans les sinus vertébraux.

A gauche l'azygos donne à-peu-près vers le milieu de son trajet, c'est-à-dire vers la sixième ou septième côte, une veine considérable nommée *demi-*

azygos. Cette veine passe derrière l'œsophage et l'aorte, se recourbe inférieurement et descend ensuite parallèlement à l'azygos sur la partie latérale gauche du corps des vertèbres. Elle sort du thorax ou avec l'aorte, ou par une ouverture particulière, et finit en s'anastomosant tantôt avec la première veine lombaire, tantôt avec la rénale, quelquefois avec la veine cave inférieure, ailleurs enfin avec l'azygos elle-même.

La demi-azygos fournit toutes les veines intercostales inférieures gauches des espaces auxquels elle correspond. Elle donne aussi des rameaux à l'œsophage, à l'aorte, au diaphragme.

Telle est la distribution la plus ordinaire de l'azygos. Cette grande veine présente plusieurs variétés selon les individus. Quelquefois elle fournit elle-même une partie des veines intercostales gauches : ailleurs elle donne deux demi-azygos, l'intercostale supérieure gauche se prolongeant alors beaucoup moins bas qu'à l'ordinaire.

§ I. *Des Veines sous-clavières.*

Ces deux veines, nées ensemble de la veine cave supérieure, se dirigent obliquement en haut et en dehors, sortent du thorax, et parvenues au-dessus de la première côte et de la clavicule, au niveau de l'attache du scalène antérieur, se recourbent chacune en dehors pour se porter transversalement au-devant de ce muscle au-delà duquel elles prennent le nom d'*axillaires*.

Mais la veine cave supérieure se trouvant à droite, et fournissant elle-même plusieurs veines à la partie

droite du thorax et du cou, les deux sous-clavières diffèrent nécessairement entre elles en longueur, en direction, en rapports, et enfin en volume.

1°. En longueur et en direction. La sous-clavière droite fort courte se rapproche plus de la direction verticale, tandis que la gauche beaucoup plus longue est aussi plus oblique et plus rapprochée de la position horizontale. Leur direction devient la même lorsqu'elles se recourbent pour passer au-devant des scalènes.

2°. En rapports. La sous-clavière droite correspond en devant à une petite portion du sternum, au cartilage de la première côte, à l'articulation sterno-claviculaire, et à l'attache inférieure du sterno-mastoïdien; en arrière et en dehors, à la portion médiastine de la plèvre droite, au nerf vague, à l'artère sous-clavière droite et au scalène antérieur, en dedans à l'aorte.

La sous-clavière gauche correspond en devant à presque toute la largeur du sternum et aux muscles qui s'y emplantent, puis comme la droite, à la première côte, à l'articulation sterno-claviculaire et à l'attache du sterno-mastoïdien. En arrière elle recouvre l'artère innominée, la courbure aortique, le nerf vague, puis la portion médiastine de la plèvre gauche, l'artère sous-clavière gauche, et le scalène antérieur.

3°. En volume. Le calibre de la sous-clavière gauche est presque toujours supérieur à celui de la droite.

Les sous-clavières donnent naissance, chacune de son côté, en bas à l'intercostale supérieure, en haut à la vertébrale et aux veines jugulaires externe et interne. La gauche fournit en outre les veines thoracique interne et thyroïdienne inférieure gauches.

Elle donne aussi les veines thymique, médiastine et diaphragmatique supérieure, qui à droite naissent de la veine cave.

Veines fournies par la seule sous-clavière gauche.

1°. *Veine thorachique interne gauche.*

Elle naît en devant et un peu en bas de la sous-clavière, tantôt isolément, tantôt et souvent au même endroit que la veine intercostale supérieure. Dirigée obliquement en avant, en bas et en dedans, elle gagne la partie postérieure des cartilages costaux près du sternum, et descend ensuite immédiatement contiguë à l'artère dont elle suit toutes les divisions.

2°. *Veine thyroïdienne inférieure gauche.*

Elle naît de la partie postérieure et inférieure de la sous-clavière, confondue dans son origine avec l'intercostale supérieure, remonte obliquement en dedans, couverte par le tronc même de la sous-clavière, appliquée sur l'artère carotide primitive, sur le nerf vague et enfin sur la trachée dont une grande quantité de graisse la sépare. Parvenue à la partie inférieure de la glande thyroïde elle se recourbe en dedans, devient transversale et s'anastomose avec la thyroïdienne inférieure droite.

Cette anastomose des deux veines thyroïdiennes inférieures forme au-devant de la trachée une arcade de laquelle partent supérieurement de nombreux

rameaux. Les plus considérables paroissent appartenir à la thyroïdienne gauche. Tous remontent presque verticalement au-devant de la glande thyroïde, formant entre eux des anastomoses plus ou moins fréquentes, et vont se répandre soit dans cette glande, soit dans les muscles qui la recouvrent et sur les côtés de la trachée, en communiquant avec les veines thyroïdiennes supérieures fournies par la jugulaire interne. L'ensemble de ces rameaux est nommé par quelques anatomistes *plexus thyroïdien.*

Les veines thymique, médiastine, diaphragmatique supérieure gauches n'ont rien de plus remarquable que les droites.

Veines fournies par les deux sous-clavières.

1°. *Veines intercostales supérieures.*

La droite manque assez souvent et a toujours peu de volume et d'étendue. Née en arrière et en bas de la sous-clavière au même endroit que la vertébrale, elle s'enfonce dans le thorax et se porte sur les deux premiers espaces intercostaux, rarement elle va jusqu'au troisième. Ses branches distribuées à ces deux espaces s'y comportent comme les intercostales inférieures, branches de l'azygos.

La gauche, constante, est toujours considérable, égale même à-peu-près pour l'ordinaire le volume de la veine azygos. Née comme la droite de la sous-clavière au niveau de la vertébrale et souvent par un tronc commun avec celle-ci, elle s'enfonce dans le thorax, derrière le poumon, derrière et en dehors de l'aorte,

et prenant bientôt une direction verticale, descend, subjacente à la plèvre, sur le côté du corps des vertèbres jusqu'au sixième ou septième espace intercostal, quelquefois jusqu'au huitième. Là, elle finit par la dernière des branches intercostales qu'elle-même fournit, et par quelques rameaux anastomosés soit avec l'azygos, soit avec la demi-azygos.

Depuis son origine jusque vers la troisième vertèbre dorsale, l'intercostale supérieure gauche donne *la veine bronchique gauche* distribuée comme la droite. Elle donne aussi quelques rameaux à l'œsophage, à l'aorte, aux glandes bronchiques, au péricarde et quelquefois au thymus.

Vers la troisième vertèbre dorsale, l'intercostale supérieure gauche fournit par la convexité de la petite courbure qu'elle présente, trois ou quatre branches assez grosses qui remontent presque verticalement au second et premier espaces intercostaux, et s'y distribuent.

Dans le reste de son trajet elle donne toutes les veines intercostales des espaces auxquels elle répond. Ces veines, aussi-bien que celles du côté droit, suivent exactement le trajet des artères.

On voit que le côté gauche des parois du thorax reçoit toutes ses veines soit de l'intercostale supérieure, soit de la demi-azygos. Plus la première se prolonge en bas, plus l'origine de la seconde est inférieure. L'une et l'autre réunies remplacent exactement l'azygos.

2°. *Veine vertébrale.*

Elle naît en arrière de la sous-clavière un peu au-dessous de l'origine de la jugulaire interne, se dirige aussitôt un peu obliquement en arrière et en haut. Son volume est assez considérable. La droite passe derrière l'artère sous-clavière droite et le nerf récurrent; la gauche au-devant de l'artère sous-clavière gauche; chacune ensuite remonte entre le scalène et le grand droit antérieur, contigüe à l'artère vertébrale et parvenue au niveau de la septième vertèbre cervicale, se divise en deux branches, l'une externe, l'autre interne.

La branche externe remonte au-devant des apophyses transverses cervicales jusqu'à l'occiput. De ces rameaux les uns se distribuent aux muscles et aux tégumens voisins, les autres communiquent avec la branche interne par les intervalles des apophyses transverses. C'est elle qui communique avec le sinus latéral par un rameau que le trou mastoïdien postérieur transmet dans le crâne. Quelquefois cette branche externe manque absolument.

La branche interne beaucoup plus volumineuse donne un rameau qui accompagne en arrière l'artère cervicale profonde; ce rameau naît quelquefois de la sous-clavière ou de l'axillaire, puis elle s'engage avec l'artère vertébrale dans le canal des apophyses transverses et le parcourt dans toute son étendue. Au niveau de chaque intervalle des vertèbres elle donne en dehors un rameau qui va se perdre dans les muscles du cou; en dedans elle en donne un autre qui communique avec les sinus vertébraux.

Près du grand trou occipital cette branche sort en arrière de son canal au-dessus de l'atlas et se jette dans les muscles voisins où elle finit. Un de ses rameaux entre dans le crâne par le trou condyloïdien postérieur et se jette dans le sinus latéral. Ce rameau n'est point constant.

3°. *Veine jugulaire externe.*

Elle naît ordinairement par un seul tronc, quelquefois par deux branches bientôt réunies, de la partie supérieure de la sous-clavière, plus en dehors que la jugulaire interne à laquelle elle est fort inférieure en volume. A son origine elle se trouve en dehors du sterno-mastoïdien près du bord externe de ce muscle. Dirigée presque verticalement, elle remonte sous le muscle peaucier dont une assez grande quantité de graisse la sépare d'abord, puis s'engage sous l'omoplat-hyoïdien dont elle croise la direction, et après l'avoir dépassé, devient plus superficielle, continue à remonter sous le peaucier en se rapprochant toujours plus du bord externe du sterno-mastoïdien sur lequel elle se trouve enfin placée et qu'elle croise obliquement vers son tiers supérieur, vu la direction verticale qu'elle conserve, tandis que ce muscle est oblique en arrière et en haut. Parvenue au-dessus et en dedans du sterno-mastoïdien, elle s'enfonce sous la glande parotide pour finir comme nous le dirons tout-à-l'heure.

Ainsi la jugulaire externe assez profondément cachée dans la moitié inférieure de son trajet, devient beaucoup plus superficielle dans la moitié supérieure où elle se trouve entre le sterno-mastoïdien

et le peaucier qui seul la sépare des tégumens. Sa direction opposée à celle du premier de ces deux muscles, correspond assez exactement à celle des fibres du second. Ces détails sont utiles à connoître dans la pratique chirurgicale pour déterminer soit l'endroit où il est le plus facile d'ouvrir la veine jugulaire, soit la direction la plus convenable à donner à l'incision (1).

Près de son origine, la veine jugulaire externe fournit en dehors plusieurs branches assez volumineuses qui se plongent dans le grand espace triangulaire graisseux borné par le sterno - mastoïdien, le trapèze et la clavicule. Ces branches suivent les divisions des artères scapulaires postérieure et supérieure, se répandent par conséquent aux muscles de l'épaule et n'offrent rien de remarquable. Souvent une de ces branches se porte dans un sens rétrograde en dehors et en bas, passe sous la clavicule et va s'anastomoser avec la veine céphalique.

Au même endroit la jugulaire externe fournit souvent en dedans plusieurs veines plus ou moins considérables qui se portent transversalement sous la peau en suivant la clavicule jusqu'à l'échancrure supérieure du sternum. Là elles s'anastomosent ensemble par un grand nombre de rameaux irrégulièrement disposés, et forment ainsi au-devant des muscles

(1) Plusieurs praticiens recommandent d'ouvrir la veine jugulaire dans la direction des fibres du sterno-mastoïdien, afin de couper transversalement celles du peaucier dont la rétraction laisse l'ouverture plus libre et favorise la sortie du sang.

sterno-hyoïdiens un plexus remarquable. De ce plexus naissent quatre ou cinq veines assez grosses qui remontent verticalement à la partie moyenne antérieure du cou, sur les muscles sterno-hyoïdiens, en communiquant plus ou moins fréquemment ensemble, et en répandant en dehors sur la région superficielle du cou plusieurs rameaux qui se jettent dans le tronc même de la jugulaire externe. Au-dessus de l'os hyoïde, ces veines se ramifient et finissent soit en se distribuant aux muscles de cette partie, soit en s'anastomosant avec les veines faciales.

Dans le reste de son trajet jusqu'à la glande parotide, la jugulaire externe donne peu de branches. Presque toutes gagnent la partie postérieure du cou et se perdent aux muscles de cette région. Avant de s'engager sous la glande parotide, elle fournit en dehors la *veine auriculaire postérieure* qui se porte derrière le pavillon de l'oreille, et s'y divise en plusieurs rameaux distribués comme ceux de l'artère de même nom.

Enfin la jugulaire externe s'enfonce sous la glande parotide et presque aussitôt donne une branche grosse et courte qui se porte profondément en dedans, au-dessus du muscle digastrique, et va s'anastomoser avec la veine jugulaire interne. La jugulaire externe continue ensuite son trajet vertical en accompagnant l'artère carotide externe et donnant de nombreux rameaux à la glande parotide au milieu de laquelle elle se trouve. Près du col du condyle elle se divise en veine maxillaire interne et temporale.

Très-souvent la veine jugulaire externe paroît finir par la grosse branche anastomotique qu'elle envoie

à l'interne. C'est alors du milieu de cette branche horizontale que naît un tronc veineux nouveau destiné à accompagner l'artère carotide et à fournir les veines maxillaire interne et temporale par sa division.

Veine maxillaire interne.

Née du tronc veineux qui suit l'artère carotide externe, elle s'engage sous le col du condyle, suit exactement par ses divisions celles de l'artère, excepté la méningée qui n'a point de veine satellite. Elle donne aussi plusieurs petites branches qui réunies à celles des veines faciale et pharyngienne, forment vers les côtés du pharynx, un plexus veineux plus ou moins considérable, auquel viennent se rendre plusieurs rameaux anastomotiques sortis du crâne par les trous de sa base et connus sous le nom de *veines émissaires*.

Veine temporale.

Elle remonte au-devant de l'oreille avec l'artère dont elle suit exactement la disposition. Ainsi elle donne en devant une branche faciale transverse, en arrière des auriculaires antérieures, plus haut une temporale moyenne; enfin sur le crâne elle se divise en branche antérieure et branche postérieure anastomosées soit avec les branches semblables opposées, soit avec les veines frontales et occipitales.

§ II. *De la Veine jugulaire interne.*

Cette veine de laquelle dépendent presque toutes celles du crâne et de la face, offre un volume très-considérable. Elle naît de la sous-clavière au moment où celle-ci se recourbe en sortant du thorax pour devenir transversale. Puis elle remonte presque verticalement à la partie antérieure et latérale du cou jusqu'au niveau de la partie supérieure du larynx, donne en cet endroit plusieurs branches importantes, et se comporte ensuite comme nous le dirons plus tard.

Dans ce trajet la jugulaire interne recouverte en devant et en dehors par le sterno-mastoïdien et l'omoplat-hyoïdien, plus immédiatement par un tissu cellulaire abondant, par des glandes lymphatiques et par l'anse du nerf hypoglosse, répond en arrière d'abord au scalène antérieur et à l'origine de l'artère sous-clavière, plus haut au muscle grand droit antérieur de la tête et à la colonne vertébrale. En dedans elle côtoie l'artère carotide primitive qu'elle recouvre en partie ainsi que le nerf vague. Elle donne à ces diverses parties et même à la peau de petits rameaux plus ou moins nombreux. Elle donne aussi à la glande thyroïde quelques branches qu'on nomme *veines thyroïdiennes moyennes*.

Les veines que donne la jugulaire interne au niveau du larynx sont la thyroïdienne supérieure, la faciale, la linguale, la pharyngienne et l'occipitale.

1°. *Veine thyroïdienne supérieure.*

Elle naît de la jugulaire interne au niveau du bord supérieur du larynx, tantôt isolément, et quelquefois alors par deux branches distinctes bientôt réunies, tantôt par un tronc commun avec la linguale et la faciale. Dirigée obliquement en bas, en dedans et en avant, elle fournit presque aussitôt une branche laryngée qui s'enfonce dans le larynx en suivant le rameau artériel de même nom. Elle passe ensuite tantôt derrière le sterno-thyroïdien, tantôt entre lui et le sterno-hyoïdien, suit le bord supérieur de la glande thyroïde et se recourbe pour s'anastomoser par arcade avec la veine semblable opposée. Leurs rameaux communs se perdent dans la glande et communiquent avec les thyroïdiennes inférieures. Plusieurs se répandent dans les muscles voisins et sur la partie correspondante du larynx et de la trachée.

Assez souvent c'est la veine thyroïdienne supérieure qui fournit la *ranine* destinée à la langue.

2°. *Veine faciale.*

Elle naît un peu au-dessus de la précédente, se dirige obliquement en haut, en avant et en dedans, entre le peaucier et la glande sous-maxillaire jusqu'au bord inférieur de la mâchoire sur lequel elle se réfléchit entre le masseter et le triangulaire. Continue à l'artère faciale dans cet endroit elle remonte obliquement aussi sur la face, mais sans former de flexuosités sensibles comme cette artère dont elle s'éloigne par là même dans la plus grande partie de son

trajet. Elle passe sous le grand zygomatique, assez éloignée de la commissure, arrive sur le côté de la racine du nez où elle prend le nom d'*angulaire*, et se trouve tantôt sous-cutanée, tantôt couverte par les muscles élévateur commun et palpébral ; enfin elle remonte plus ou moins verticalement entre le muscle frontal et la peau en prenant le nom de veine *frontale*.

Depuis son origine jusqu'à sa réflexion sur le bord maxillaire, la veine faciale fournit les veines palatine inférieure, sous mentale, ranine. Ces branches ne diffèrent presque point des branches artérielles dont elles portent le nom et auxquelles elles correspondent. *La palatine inférieure* remonte verticalement sur les côtés du pharynx et se distribue principalement aux amygdales et au voile du palais. *La sous-mentale* souvent produite par la thyroïdienne supérieure ou par la linguale, côtoie horizontalement en devant le bord maxillaire, placée entre le milo-hyoïdien, le digastrique et la glande sous-maxillaire, et distribuée à toutes ces parties par de nombreux rameaux dont un accompagne le conduit excréteur de la glande et va se perdre à la langue. *La ranine* souvent produite par la thyroïdienne supérieure, quelquefois née isolément de la jugulaire interne, remonte entre le milo-hyoïdien et l'hyoglosse en suivant le nerf hypoglosse, et va se répandre à la partie inférieure de la langue jusqu'à son sommet : quelquefois elle s'anastomose toute entière sous le milo-hyoïdien avec la veine linguale.

Dans son trajet à la face la veine faciale donne de toutes parts, et surtout en dedans, de nombreux rameaux qui répondent à ceux de l'artère, mais qui

sont ordinairement plus petits, plus multipliés et plus irrégulièrement disposés.

Devenue *angulaire* la même veine communique avec la veine ophtalmique par une grosse branche et quelquefois par plusieurs autres plus petites, au-dessus du tendon direct du palpebral; ensuite devenue *frontale* elle remonte sur le front, ordinairement sous-cutanée, et se porte jusqu'au sommet de la tête en s'anastomosant avec la frontale opposée et avec les temporales.

Quelquefois la veine angulaire au lieu de se porter elle-même sur le front y envoie seulement deux ou trois branches, puis se recourbe en dehors, s'engage entre l'arcade orbitaire et le muscle sourcilier, et traverse la couche fibreuse de la paupière pour s'anastomoser elle-même avec les divisions de l'ophtalmique.

3°. *Veine linguale.*

Elle varie beaucoup en volume. Née de la jugulaire interne tantôt isolément, tantôt par un tronc commun avec la pharyngienne, elle se porte horizontalement le long du bord supérieur de l'os hyoïde au-devant du muscle hyoglosse remonte ensuite entre lui et le milo-hyoïdien, puis entre le génio-glosse et la glande sublinguale. Là elle s'anastomose avec la ranine et continue à se porter en devant jusqu'au sommet de la langue. Elle fournit des rameaux très-multipliés dont les uns se distribuent à la glande sublinguale, les autres couverts par les rameaux du nerf hypoglosse remontent verticalement sur le génio-glosse et se perdent dans le tissu propre de la langue. Plu-

sieurs vont à la base de cet organe former par leurs fréquentes anastomoses un réseau très-dense, apparent sous la membrane muqueuse et prolongé jusque sur l'épiglotte.

4°. *Veine pharyngienne.*

Elle naît de la jugulaire interne au même endroit que la linguale; quelquefois c'est la thyroïdienne qui la fournit. Son volume est assez considérable. Elle remonte verticalement sur la partie latérale du pharynx et lui donne de nombreux rameaux dont les uns transverses, les autres obliques en bas, se répandent sur sa paroi postérieure et s'anastomosent avec ceux de la pharyngienne opposée, en formant un plexus plus ou moins compliqué.

Quelquefois il y a deux pharyngiennes du même côté; l'une naît de la jugulaire interne, l'autre de la thyroïdienne supérieure. Elles se comportent à-peu-près de même et s'anastomosent fréquemment ensemble de manière à former un plexus sur les côtés du pharynx, au-devant de la colonne vertébrale.

5°. *Veine occipitale.*

Elle vient tantôt de la jugulaire interne, tantôt de l'externe, quelquefois de la vertébrale. Son trajet est absolument semblable à celui de l'artère qu'elle accompagne au-dessous du splénius, et avec laquelle elle devient sous-cutanée en arrière pour se répandre par un grand nombre de rameaux à la partie postérieure du crâne en s'anastomosant avec l'occipitale

opposée, avec les temporales et même avec les frontales.

Lorsque la veine jugulaire interne a fourni les branches dont nous venons de parler, elle se détourne un peu en arrière, remonte avec l'artère carotide interne derrière l'apophyse styloïde et ses muscles jusqu'au trou déchiré postérieur par lequel elle pénètre dans le crâne.

Souvent la jugulaire interne, parvenue au niveau du larynx, se divise comme l'artère carotide primitive en deux grosses branches. L'une externe est le tronc commun d'où partent toutes celles que nous venons de décrire. L'autre interne remonte et se porte dans le crâne.

En entrant dans le crâne par le trou déchiré postérieur, la veine jugulaire interne se dilate en tout sens, et cette portion dilatée répond à une cavité creusée en cet endroit sur les os temporal et occipital réunis. C'est ce renflement plus considérable ordinairement à droite qu'à gauche qu'on nomme *golfe de la veine jugulaire*.

§ III. *Du Système veineux cérébral, suite de la veine jugulaire interne.*

La veine jugulaire interne se dépouille de son tissu propre au niveau du trou déchiré aux bords duquel ce tissu adhère, et la membrane interne seule pénètre dans le crâne par cette ouverture, en sorte que dans la fosse nommée *golfe de la jugulaire* la membrane veineuse est déjà immédiatement appliquée sur la dure-mère. Cette locution commune que nous avons

employée nous-mêmes : *la jugulaire entre dans le crâne*, ne doit donc point se prendre dans un sens rigoureux; elle est exacte si l'on considère la membrane commune du système à sang noir, elle seroit fausse si on l'entendoit du tissu extérieur qui constitue les veines proprement dites.

C'est donc au golfe de la jugulaire que commence un nouveau système à sang noir, véritable continuation de celui qui est au dehors du crâne, mais différent de lui sous plusieurs rapports. C'est toujours la membrane interne des veines qui le constitue immédiatement, mais la membrane externe ne s'y trouve plus; elle est remplacée par les lames de la dure-mère écartées entre elles et formant des conduits de diverse figure suivant la disposition des os auxquels ces lames sont fixées. Ces conduits nommés *sinus* sont disposés d'une manière symétrique et régulière, puisqu'ils dépendent nécessairement de la disposition symétrique du crâne, de la dure-mère et du cerveau. Les plus larges occupent les fosses occipitales et la voûte du crâne; les plus étroits occupent les bords du rocher et le milieu du sphénoïde.

Les lames fibreuses épaisses qui constituent les parois des sinus étant fixées de toutes parts plus ou moins immédiatement à des parties osseuses, et se trouvant dans un état continuel et nécessaire de tension sur tous leurs points, on conçoit que les sinus sont également incapables et de changer de place et de se resserrer sur eux-mêmes de manière à diminuer de calibre. L'inspection anatomique suffit donc pour démontrer l'impossibilité de la contraction des sinus, admise par quelques auteurs anciens; et sans pro-

noncer absolument sur l'inertie de ces conduits, on est forcé de convenir que du moins ils ne peuvent exécuter aucun mouvement sensible.

Presque tous les sinus considérés dans leur intérieur offrent des brides irrégulièrement disposées et tendues en différens sens d'une paroi à l'autre. Ces brides sont ordinairement formées par des faisceaux fibreux de la dure-mère. Mais la cavité n'en offre pas moins dans toute son étendue un aspect lisse et poli dû à la membrane veineuse, et cet aspect lisse s'observe même sur les brides dont nous parlons, la membrane veineuse se repliant sur elle pour les envelopper chacune en particulier. Au reste, quoique ces brides intérieures soient très-ordinaires, elles ne sont point constantes; plusieurs sinus n'en présentent aucune, comme nous le verrons dans les détails.

C'est aux sinus que viennent se rendre toutes les veines de la dure-mère et toutes celles du cerveau. Ces dernières sont les plus considérables. Nous examinerons avec soin leur disposition et surtout la manière dont elles s'ouvrent dans les sinus, spécialement dans le longitudinal, celui de tous qui en reçoit le plus.

Dans la description des sinus nous suivrons encore l'ordre accoutumé, et nous supposerons que ces conduits partent du golfe de la jugulaire pour se répandre dans l'intérieur du crâne. Dans la description des veines cérébrales, nous suivrons au contraire l'ordre naturel de la circulation. Cette différence de méthode est fondée, 1°. sur l'avantage d'indiquer par l'uniformité de la marche descriptive la continuité des sinus avec la veine jugulaire interne; 2°. sur ce que les

veines cérébrales peu remarquables en général dans leurs distributions particulières, si on en excepte les veines des ventricules, sont au contraire très-intéressantes à considérer quant à leur mode d'ouverture dans les sinus, ce qui ne pourroit se faire commodément si l'on commençoit par les troncs pour finir par les rameaux. En supposant au reste qu'il pût résulter quelque légère confusion de cette diversité de méthodes, elle sera entièrement dissipée par la récapitulation abrégée que nous ferons ensuite de tout le système veineux cérébral considéré suivant l'ordre circulatoire.

Il y a dans le crâne quatre grands sinus dont les autres paroissent n'être que des dépendances; on peut du moins les envisager ainsi pour faciliter la description.

1°. et 2°. Les deux sinus latéraux qui commencent au golfe de la jugulaire et finissent sur la protubérance occipitale interne dans une cavité de la dure-mère que je nommerai *confluent des sinus.*

3°. Le sinus droit qui commence au confluent des sinus et règne entre la base de la faux et la tente du cervelet.

4°. Le sinus longitudinal qui naît du confluent des sinus et règne tout le long du bord convexe de la faux.

Les sinus latéraux donnent naissance en devant aux sinus pétreux qui se terminent eux-mêmes par le sinus transverse, et par les deux sinus caverneux desquels dépend le sinus coronaire. En arrière les sinus latéraux donnent naissance aux sinus occipitaux qui remontent dans la faux cérébelleuse et

aboutissent au confluent des sinus. Dans leur trajet les sinus latéraux reçoivent les veines latérales et inférieures du cerveau et les veines inférieures du cervelet.

Le sinus droit reçoit la veine inférieure de la faux nommée ordinairement *sinus longitudinal inférieur*. Il reçoit aussi les veines des cavités cérébrales ou *veines de Galien*, et les veines supérieures du cervelet.

Le sinus longitudinal reçoit les veines supérieures du cerveau.

Telle est l'exposition générale du système veineux cérébral et de la marche que nous suivrons pour le décrire. Nous y ajouterons les sinus vertébraux qui règnent le long du canal de l'épine, et qui présentent plusieurs caractères d'analogie avec les sinus du crâne, quoiqu'ils en diffèrent sous des rapports essentiels et qu'ils n'aient avec eux nulle communication.

I. *Sinus latéraux.*

Chacun d'eux commence au golfe de la veine jugulaire, se dirige ensuite obliquement en haut et en dehors le long de la base du rocher sur la région mastoïdienne du temporal. Au niveau du bord supérieur du rocher il se recourbe, devient horizontal et se porte en arrière et en dedans sur la partie moyenne de l'occipital pour finir au niveau de la protubérance interne de cet os par une ouverture fort dilatée, vis-à-vis du sinus latéral opposé, dans le confluent des sinus.

Ce trajet et cette direction du sinus latéral sont

suffisamment indiqués, comme l'on sait, sur une tête sèche par la gouttière à laquelle il correspond. On reconnoît par le même moyen la différence assez ordinaire de largeur des deux sinus : le droit l'emporte presque toujours sur le gauche.

Depuis le golfe de la jugulaire jusqu'au bord supérieur du rocher le sinus latéral n'est formé que par deux lames de la dure-mère, dont l'une tapisse le crâne et par conséquent la gouttière, l'autre passe au-devant de cette même gouttière qu'elle cache entièrement. Il résulte de là que dans toute cette partie la largeur et la forme de la gouttière latérale déterminent la largeur et la forme du sinus. Au contraire, depuis le bord supérieur du rocher jusqu'à la protubérance occipitale interne, le sinus, correspondant à la circonférence externe de la tente du cervelet, est formé par trois lames membraneuses dont une tapisse le crâne, les deux autres écartées appartiennent à la tente. Ici la largeur du sinus dépend moins de celle de sa gouttière : il est nécessairement triangulaire dans sa forme. Mais les lames qui le constituent deviennent fort épaisses près de son embouchure ; sa forme en est changée en cet endroit, et il s'ouvre dans le confluent par un orifice très-large et transversalement ovale.

Considéré dans son intérieur, le sinus latéral offre un aspect lisse et poli dû à la membrane veineuse qui le revêt et qui est la continuation de celle de la jugulaire. Ordinairement on n'y trouve aucune des brides dont nous avons parlé.

Dans la première partie de son trajet le sinus latéral donne naissance en devant à deux sinus beaucoup plus petits desquels dépendent tous ceux de la

partie antérieure du crâne. Ce sont les sinus pétreux distingués de chaque côté en inférieur et supérieur. En arrière il donne naissance aux sinus occipitaux.

1°. *Sinus pétreux nés en devant du sinus latéral.*

Les sinus pétreux inférieurs naissent des sinus latéraux à leur origine et au niveau du golfe de la jugulaire. Ils remontent obliquement en avant et en dedans le long du bord inférieur du rocher, entre ce bord et celui de l'occipital. Vers le sommet du rocher ils communiquent en dedans entre eux par le sinus transverse, en dehors et en haut avec les sinus pétreux supérieur et caverneux. Assez larges à leur origine, rétrécis dans le milieu de leur trajet, ils s'élargissent considérablement à leur terminaison antérieure où ils paroissent non se diviser, mais former une cavité commune avec le sinus que nous venons de désigner.

La gouttière que présentent les bords réunis du rocher et de l'occipital détermine seule la largeur des sinus pétreux inférieurs. La dure-mère passe sur cette gouttière et la convertit en canal, mais ne paroît point la tapisser immédiatement; du moins lorsqu'on ouvre le sinus et qu'on examine avec soin le fond de la gouttière, on n'y trouve que la membrane veineuse qui paroît immédiatement appliquée sur l'os. Cette membrane est-elle fortifiée par une lame méningée? on est assez porté à le croire, mais au moins cette lame est excessivement mince.

Les sinus pétreux supérieurs moins larges, mais

plus longs que les inférieurs, naissent des sinus latéraux à l'endroit où ceux-ci se recourbent pour se porter horizontalement en arrière. Ils règnent obliquement en avant et en dedans tout le long du bord supérieur du rocher, et parvenus au sommet de cette éminence s'unissent, en s'élargissant, avec les sinus caverneux et pétreux inférieurs. Une gouttière très-superficielle pratiquée sur l'os indique leur trajet, mais ne détermine ni leur largeur ni leur forme. Ces sinus en effet correspondent à l'attache de la tente du cervelet, et sont formés par l'écartement des deux lames de cette tente, fixées aux bords de la gouttière qu'elles tapissent en même temps d'une manière très-sensible. Ils sont donc triangulaires, et semblent par leur disposition continuer antérieurement la portion horizontale des sinus latéraux.

Les sinus pétreux supérieurs et inférieurs offrent dans leur cavité l'aspect lisse dû à la membrane veineuse qui les revêt. Quelques brides fibreuses les traversent en différentes directions, mais elles sont peu multipliées.

Il ne paroît pas que ces sinus reçoivent aucune veine remarquable de l'organe cérébral. Destinés principalement à établir une communication libre entre les sinus caverneux et les latéraux, ils reçoivent seulement dans leur trajet les veines méningées voisines.

Sinus transverse, réunion des sinus pétreux.

Il occupe la partie supérieure de l'apophyse basilaire de l'occipital, et s'étend depuis la réunion des sinus pétreux et caverneux d'un côté jusqu'à la réunion des mêmes sinus du côté opposé. Sa largeur toujours considérable est sujette à varier. Il résulte d'une dépression plus ou moins profonde de l'apophyse basilaire, dépression que recouvre la dure-mère écartée en cet endroit de l'apophyse à laquelle elle adhère plus bas. Lorsqu'on ouvre ce sinus suivant sa longueur en fendant transversalement la dure-mère, on ne voit point que cette membrane se divise sensiblement en deux lames pour tapisser immédiatement le fond du sinus en même temps qu'elle le ferme à l'extérieur. Il est probable cependant qu'une lame méningée très-mince recouvre la portion osseuse de cette cavité et fortifie la membrane veineuse en s'identifiant avec elle.

On voit que le sinus transverse n'est autre chose que la réunion des sinus pétreux et caverneux. Comme ces derniers il offre dans son intérieur un tissu filamenteux, réticulaire, rougeâtre, sur lequel nous allons bientôt revenir.

Sinus caverneux nés de chaque côté de la réunion des sinus pétreux et transverse.

Ces sinus, les plus compliqués de tous ceux du crâne quant à leur organisation, commencent dans l'espace qui sépare le sommet du rocher d'avec la

lame quarrée du sphénoïde, se portent horizontalement en devant sur les côtés de la fosse pituitaire, et finissent au-dessous des apophyses clinoïdes antérieures en s'étendant obliquement en dehors, derrière le tiers interne de la fente sphénoïdale. Leur largeur est considérable ; leur figure irrégulière ne permet aucune comparaison exacte. Formés en bas, dans presque toute leur longueur, par les gouttières latérales du corps du sphénoïde qui les borne en dedans, ils dépendent essentiellement chacun de la dure-mère qui, après avoir tapissé la fosse temporale interne se divise en deux lames en approchant du corps du sphénoïde.

De ces deux lames, l'une intérieure tapisse immédiatement la gouttière sphénoïdale, puis en dedans se continue dans la fosse pituitaire, en devant se réfléchit de bas en haut derrière la fente sphénoïdale et constitue la paroi antérieure du sinus, en arrière se prolonge dans les sinus pétreux et transverse où elle devient extrêmement mince, et enfin dans le canal carotidien où elle se continue avec le périoste extérieur.

L'autre lame, extérieure, beaucoup plus épaisse, remonte verticalement sur le côté du sinus dont elle constitue la paroi externe en se continuant en devant avec la portion de dure-mère qui bouche les deux tiers externes de la fente sphénoïdale, en arrière avec la tente du cervelet, ce qui la met dans un état habituel de tension. Cette paroi contient dans son épaisseur les nerfs moteur commun, pathétique et ophtalmique, disposés comme il a été dit dans le temps.

Devenue plus épaisse supérieurement, la lame

extérieure se confond avec les deux prolongemens de la tente du cervelet fixés aux apophyses clinoïdes antérieure et postérieure, prolongemens qui seuls constituent la paroi supérieure du sinus. Enfin la lame extérieure se continue sur la fosse pituitaire avec la lame profonde, et présente en cet endroit, en dedans de l'apophyse clinoïde antérieure, une ouverture par laquelle l'artère carotide interne sort du sinus pour se porter dans le crâne.

Telle est l'organisation extérieure du sinus caverneux. Sa cavité présente ordinairement des filamens rougeâtres, peu résistans, entrecroisés en différens sens d'une paroi à l'autre en forme de réseau. On les a comparés au tissu spongieux qui remplit les corps caverneux de la verge; de là même le nom qu'on a donné au sinus. Ces filamens sont-ils des fibres ténues de la dure-mère? ont-ils une nature propre et indépendante, ou sont-ils formés par la membrane veineuse, comme le pensoit Bichat? c'est ce qui me paroît assez difficile à décider.

On trouve sur les parois du sinus, et spécialement sur l'externe, une foule de faisceaux réellement fibreux, saillans, irrégulièrement disposés, analogues à ceux qu'on voit dans les autres sinus, et surtout dans le longitudinal.

Mais les objets les plus remarquables que présente le sinus caverneux sont l'artère carotide interne et le nerf moteur externe qui le traversent. L'artère s'y introduit de bas en haut en sortant du canal du rocher; le nerf y entre par un petit canal particulier de la dure-mère, à côté et en dehors du sinus pétreux inférieur, un peu au-dessous du sinus transverse.

L'un et l'autre placés contre la paroi interne du sinus se portent ensuite en devant, l'artère en formant plusieurs flexuosités, le nerf en suivant un trajet horizontal au-dessous et en dehors de l'artère à laquelle il est contigu. L'artère sort enfin par l'ouverture supérieure dont nous avons parlé tout-à-l'heure, et se porte dans le crâne; le nerf traverse la paroi antérieure du sinus pour entrer dans l'orbite.

Pendant leur trajet, l'artère et le nerf baignent-ils dans le sang du sinus, comme les anatomistes le supposent ? Au premier aspect on est porté à le croire, car le sinus présente une seule et unique cavité dans laquelle l'artère et le nerf ne paroissent séparés du sang par aucune cloison.

Mais, 1°. peut-on penser que le sang veineux qui par-tout ailleurs n'est en contact qu'avec une seule espèce de membrane exclusivement destinée à le contenir, soit ici, par une exception unique, en contact immédiat avec la dure-mère ? 2°. La membrane veineuse qui bien évidemment tapisse les autres sinus et spécialement les pétreux et transverse, ne paroît point interrompue à l'entrée du caverneux et se retrouve au-delà de ce sinus soit dans la veine ophtalmique, soit dans le sinus coronaire. 3°. Si l'on examine en détail les parois du sinus caverneux, on trouve à toutes leurs parties cet aspect lisse qui ailleurs est certainement dû à la membrane veineuse. 4°. Si la membrane veineuse existe dans le sinus caverneux, comme les raisons précédentes le prouvent, il est impossible que l'artère et le nerf soient contenus dans la cavité de cette membrane, puisque les ouvertures qui transmettent dans le sinus l'artère

et le nerf sont tout-à-fait différentes de celles par lesquelles la membrane veineuse s'y introduit. 5°. Enfin une inspection exacte démontre complètement que l'artère et le nerf sont tout-à-fait séparés du sang. En examinant en effet l'artère au moment où elle passe du canal carotidien dans le sinus, on voit dans le contour de l'ouverture du rocher une membrane fine se réfléchir de l'intérieur du sinus sur l'artère et intercepter toute communication entre le sinus et le canal carotidien. Cette membrane très-délicate, immédiatement appliquée ensuite soit sur le vaisseau, soit sur le nerf, semble confondue avec les parois de l'une et avec le névrilème de l'autre, d'autant plus qu'elle s'enfonce ordinairement dans leurs intervalles et se replie plusieurs fois pour les revêtir. Mais quelquefois, surtout quand l'artère est très-flexueuse, la membrane, au lieu de se replier ainsi, passe directement d'une courbure sur l'autre, et se montre alors tendue et transparente dans l'intervalle. J'ai observé ceci d'une manière sensible.

La membrane veineuse recouvre donc l'artère carotide et le nerf moteur externe, soit en passant sur eux, soit en leur formant une espèce de gaîne jusqu'à leur sortie du sinus. Là elle se réfléchit de toutes parts dans l'intérieur du sinus où elle est seule en contact immédiat avec le sang.

Outre un grand nombre de veines méningées, le sinus caverneux reçoit en devant la veine ophtalmique ; en dedans et en haut il communique avec le sinus coronaire.

La veine ophtalmique dont les rameaux distribués dans l'intérieur de l'orbite et de l'œil absolu-

ment comme ceux de l'artère, ne méritent point d'être décrits en particulier, sort en arrière de l'orbite par la partie interne élargie de la fente sphénoïdale, traverse la paroi antérieure du sinus caverneux et s'ouvre dans son intérieur.

Sinus coronaire placé entre les caverneux.

On en distingue ordinairement deux, dont l'un antérieur, l'autre postérieur, et on pourroit en ajouter deux latéraux; mais il n'y en a réellement qu'un formé de quatre portions réunies entre elles à angles plus ou moins marqués, et environnant de toutes parts la fosse pituitaire. La portion antérieure transversale occupe une saillie osseuse du sphénoïde placée derrière la gouttière commune des nerfs optiques. Cette portion aboutit par ses extrémités dans deux autres placées sur les côtés de la glande pituitaire et dirigées en arrière où elles finissent dans la quatrième disposée transversalement comme la première, tantôt au-devant de la lame quarrée du sphénoïde, tantôt sur le bord saillant de cette lame. Cette dernière portion s'ouvre par ses extrémités dans les deux sinus caverneux.

Le sinus coronaire, fort étroit dans toutes ses parties, est formé par-tout par deux lames écartées de la dure-mère. Il reçoit, outre les veines méningées voisines, celles qui se distribuent à la glande pituitaire.

On voit, d'après ce que nous avons dit, que les sinus coronaire, caverneux et transverse qui occupent la partie antérieure et moyenne de la base du crâne,

aboutissent tous dans la première portion des sinus latéraux par le moyen des sinus pétreux supérieurs et inférieurs qui ne doivent être regardés que comme des conduits de communication. Nous reviendrons là-dessus en jetant un coup d'œil sur l'ensemble du système veineux cérébral.

2°. *Sinus occipitaux nés en arrière de chaque sinus latéral.*

Leur origine répond au golfe de la jugulaire. Ils se dirigent obliquement en dedans et en arrière sur les côtes du grand trou occipital, remontent ensuite dans l'épaisseur de la faux cérébelleuse en se rapprochant l'un de l'autre, et devenus enfin parallèles, s'ouvrent chacun en particulier dans la partie inférieure du confluent des sinus.

Les sinus occipitaux formés dans toute leur étendue par deux lames écartées de la dure-mère, sont ordinairement fort étroits sur les côtés du trou occipital, et s'élargissent progressivement en approchant de leurs embouchures. Ils reçoivent les veines méningées de la faux cérébelleuse et des fosses occipitales inférieures.

Le sinus latéral dans la seconde partie de son trajet, c'est-à-dire, depuis le bord supérieur du rocher jusqu'à la protubérance occipitale interne reçoit en haut les veines latérales et inférieures du cerveau, en bas les veines cérébelleuses inférieures.

Veines latérales et inférieures du cerveau, terminées dans les sinus latéraux.

Des veines nombreuses naissent par des ramuscules ténus de la partie latérale de chaque hémisphère cérébral. Leurs origines correspondent à-peu-près au niveau de la ligne demi-circulaire temporale du crâne, et sont tout-à-fait distinctes de celles des veines supérieures qui partent à-peu-près du même endroit. Elles descendent en arrière et en dehors sur l'hémisphère en formant successivement des troncs plus volumineux qui bientôt se réduisent à deux ou trois. A ceux-ci vient s'en joindre un autre, lequel résultant des veines nées à la surface inférieure du lobe postérieur, règne quelque temps sur le bord externe de ce lobe et l'abandonne ensuite pour se porter en dehors.

Ces trois ou quatre troncs veineux rapprochés abandonnent ensemble le cerveau, et environnés chacun par une gaîne arachnoïdienne, se dirigent un peu obliquement en avant pour gagner la partie supérieure du sinus latéral vers le commencement de sa portion horizontale, derrière la base du rocher. Ils pénètrent isolément dans ce sinus en traversant chacun la lame supérieure de la tente du cervelet dans l'endroit où elle se réfléchit en haut pour continuer à tapisser le crâne. On voit les faisceaux fibreux de la dure-mère s'écarter sensiblement entre eux dans l'endroit où chaque veine les traverse.

Veines cérébelleuses inférieures, terminées dans les sinus latéraux

Répandues sur la face inférieure convexe des deux lobes du cervelet, elles se réunissent de chaque côté en deux ou trois troncs qui se recourbent sur la grande circonférence de cet organe et remontent verticalement pour pénétrer dans le sinus latéral correspondant, à des distances assez grandes les unes des autres, en traversant la lame inférieure de la tente du cervelet.

II. *Confluent des sinus.*

Dans l'endroit où les lames de la faux cérébrale écartées les unes des autres vont d'un côté tapisser la surface du crâne, de l'autre se continuer avec la lame inférieure de la tente du cervelet qui elle-même donne naissance en bas à la faux cérébelleuse, il reste entre ces portions membraneuses un espace assez large qui correspond à la protubérance interne de l'occipital. Cet espace, de forme irrégulière, n'appartient proprement à aucun sinus, et chacune des lames qui le forment s'épaissit tellement qu'il en résulte une cavité particulière à laquelle les sinus viennent aboutir, mais qui n'est la continuation ni des uns ni des autres. Je la nomme *confluent des sinus* plutôt pour lui donner un nom quelconque que pour exprimer un idée physiologique exacte; car d'après l'ordre naturel de la circulation veineuse cérébrale, les colonnes sanguines du sinus longitu-

dinal et du sinus droit sont les seules qui viennent se rencontrer dans cette cavité. On sait que les anciens la nommoient *pressoir d'Hérophile.*

Cette cavité lisse et polie, tapissée par la membrane veineuse commune, présente six ouvertures. Deux latérales, très-larges, transversalement ovales, offrant chacune dans leur contour un bourrelet épais, correspondent aux sinus latéraux. Une supérieure, à-peu-près triangulaire, conduit dans le sinus longitudinal. Une quatrième antérieure, ordinairement arrondie, répond au sinus droit. Enfin deux inférieures, plus ou moins larges répondent aux sinus occipitaux.

On voit que le seul endroit où le confluent des sinus ne présente aucune ouverture, c'est sa partie postérieure. Là il correspond à l'occipital et se trouve formé par la lame méningée qui tapisse immédiatement cet os. C'est là aussi le seul endroit où l'on puisse ouvrir la cavité dont je parle de manière à s'en faire une juste image. On la détruit en partie lorsqu'on l'ouvre à l'intérieur du crâne, puisqu'il faut nécessairement alors fendre ou le sinus longitudinal, ou le droit, ou un des latéraux. Au contraire, en ouvrant en arrière la lame méningée qui recouvre l'occipital, on laisse intacts tous les orifices de ces sinus, et on reconnoît sans peine, comme je l'ai dit, que la cavité membraneuse commune à laquelle ils se terminent est tout à-fait distincte des uns et des autres. Cette préparation anatomique est extrêmement facile depuis qu'on a adopté dans les amphithéâtres l'excellente méthode d'employer pour ouvrir le crâne, le marteau au lieu de la scie. On n'a

qu'à briser en arrière l'occipital dans une certaine étendue qui comprenne sa protubérance, et en enlevant les pièces osseuses on découvre la lame crânienne de la dure-mère qu'on incise verticalement dans l'endroit où la faux cérébrale et la tente du cervelet se réunissent.

III. *Sinus longitudinal.*

Il commence à la partie supérieure du confluent des sinus immédiatement au-dessus de la tente du cervelet, remonte d'abord presque verticalement sur l'occipital et règne ensuite tout le long du bord convexe de la faux jusqu'à l'apophyse crista-galli où il finit par un cul-de-sac : ainsi il répond exactement à la ligne médiane comme la faux elle-même. Très-large en arrière, il devient progressivement plus étroit en se prolongeant antérieurement. Sa direction et son trajet sont indiqués sur une tête sèche par la gouttière à laquelle il donne son nom : mais la profondeur de cette gouttière ne détermine point la largeur du sinus. Il est formé, en effet, par trois lames méningées dont une tapisse la gouttière, tandis que les deux autres s'écartent de la première pour se porter obliquement dans l'intérieur du crâne en se rapprochant l'une de l'autre et former ensuite la faux par leur réunion mutuelle. Le sinus longitudinal est donc triangulaire de telle sorte que la base du triangle répond au crâne, et le sommet à la faux : on voit très-bien cette forme en ouvrant le sinus suivant sa longueur. C'est surtout sous les parois de ce sinus et autour des embouchures veineuses qu'on trouve en grande quantité ces granu-

tions blanchâtres nommées ordinairement *glandes de Pacchioni* (1).

L'intérieur du sinus par-tout lisse et poli, tapissé par la membrane veineuse, offre une assez grande quantité de brides qui s'étendent d'une paroi à l'autre dans différentes directions. De ces brides, les unes sont dues, comme nous le dirons bientôt, aux replis que forme la membrane de chaque veine à son embouchure; les autres sont évidemment des faisceaux fibreux de la dure-mère tendus entre les parois. Mais l'aspect lisse que présente chacun de ces faisceaux indique assez que la membrane commune du sinus se replie sur eux et les revêt en particulier.

Le sinus longitudinal reçoit du côté du crâne un assez grand nombre de veines dont les unes, branches des veines frontales, viennent de l'extérieur et pénètrent par les petits trous multipliés de la suture sagittale; les autres viennent du tissu diploïque des os eux-mêmes. C'est à ces veines qu'il faut rapporter en partie l'adhérence toujours très-marquée de la dure-mère au crâne le long du sinus longitudinal et les gouttelettes sanguines qui restent sur cette membrane dans le même endroit, lorsqu'on a enlevé avec effort la voûte du crâne.

Des veines de la dure-mère viennent aussi se rendre dans le même sinus. Mais c'est du cerveau que ce conduit reçoit les veines les plus remarquables et les plus volumineuses.

---

(1) Voyez le tome III, page 60.

Veines cérébrales supérieures.

Ces veines répandues irrégulièrement sur la face convexe de l'un et de l'autre hémisphère, paroissent naître de la substance cérébrale par une foule de ramifications plus ou moins ténues vers les confins des régions temporales. Flexueuses dans leur trajet et placées principalement dans les anfractuosités, elles se rapprochent de la ligne médiane en se réunissant en troncs successivement plus volumineux et moins multipliés. Ces troncs n'occupent plus les anfractuosités seules ; plusieurs passent sur les circonvolutions. Les plus gros et les plus nombreux sont réunis à la partie postérieure et moyenne du cerveau : en devant on n'en trouve qu'un petit nombre. Vers le bord interne de l'hémisphère ils reçoivent les veines de la surface plane qui viennent plus ou moins verticalement se réunir à eux ; puis ils quittent le cerveau, et enveloppés chacun par une gaîne particulière de l'arachnoïde qui jusque là les avoit recouverts, ils gagnent en se recourbant en devant les parties latérales et inférieure du sinus. On les voit s'engager entre les fibres membraneuses et suivre plus ou moins long-temps d'arrière en avant la paroi du sinus avant de s'ouvrir dans son intérieur. Souvent ce trajet est d'un demi-pouce, sur-tout à la partie postérieure, en sorte que les embouchures veineuses sont extrêmement obliques. A mesure qu'on se rapproche de la région frontale, les troncs veineux deviennent moins obliques, suivent moins long-temps la paroi membraneuse, et leur embouchure dans le

sinus est plus rapprochée de l'angle droit qu'elle n'offre cependant jamais.

Presque toutes les veines s'ouvrent obliquement d'arrière en avant, sens inverse du cours du sang dans le sinus. Quelques-unes cependant s'ouvrent d'avant en arrière en offrant la même obliquité.

Si on examine dans le sinus même la disposition des ouvertures veineuses, on reconnoît facilement que la membrane des veines se continue sans interruption dans la cavité du sinus pour le tapisser, que par conséquent le sang n'est nulle part en contact avec la dure-mère, comme les anatomistes semblent ordinairement le supposer.

On remarque aussi que presque par-tout les embouchures veineuses paroissent couvertes en grande partie par des replis membraneux en forme de valvules, continus en arrière avec les parois du sinus, et offrant en devant un bord libre, concave. Un stylet introduit très-obliquement d'avant en arrière sous ce bord libre pénètre aisément jusque dans les veines, et permet de reconnoître exactement l'étendue du trajet que chacune parcourt dans la paroi du sinus avant de s'y ouvrir. On voit alors que le repli valvulaire paroît uniquement dû à la membrane interne du tronc veineux, prolongée librement d'un côté dans l'intérieur du sinus et repliée ensuite sur elle-même en arrière. On aura une idée juste de ce mode d'introduction des veines dans le sinus longitudinal et des replis valvulaires dont nous parlons, en se représentant le trajet oblique que parcourent les uretères entre les membranes de la vessie et l'espèce de valvule qui couvre leur embouchure dans cet organe.

J'observe au reste, 1°. que quand les veines cérébrales supérieures ont un volume très-considérable, souvent les replis valvulaires sont moins marqués ou moins étendus; 2°. que la largeur de ces replis étant toujours en raison directe de l'obliquité des ouvertures veineuses, ils sont en général moins sensibles à mesure qu'on se rapproche de la région frontale où, comme nous l'avons dit, ces ouvertures veineuses sont plus rapprochées de l'angle droit.

IV. *Sinus droit.*

Il commence à la partie antérieure du confluent des sinus, règne tout le long de la base de la faux au-dessus de la tente du cervelet, et finit au milieu de la circonférence interne de celle-ci. Sa direction déterminée par celle de la tente du cervelet, est un peu oblique en haut et en avant. Formé en bas par la lame inférieure de la tente, en haut par l'écartement des deux lames de la faux, il est triangulaire dans toute son étendue, quoique son ouverture postérieure soit ordinairement arrondie. Large en arrière, il se rétrécit beaucoup antérieurement.

Considéré dans son intérieur, le sinus droit offre le même aspect que le sinus longitudinal. Des faisceaux fibreux multipliés le traversent dans toute sorte de directions et font saillie sur ses parois, en laissant cependant le milieu de sa cavité entièrement libre. Ces faisceaux, très-rapprochés en devant, deviennent moins nombreux et moins marqués en arrière. Du reste toute la cavité présente, même sur l'extérieur des faisceaux, l'aspect lisse et poli dû à la membrane veineuse qui la revêt.

Des veines très-remarquables viennent aboutir au sinus droit. Par son extrémité antérieure il reçoit en haut la veine inférieure de la faux, en devant et dans une direction horizontale les veines des cavités cérébrales nommées ordinairement *veines de Galien*. Par sa partie inférieure il reçoit vers le milieu de sa longueur les veines cérébelleuses supérieures.

Veine inférieure de la faux.

On la nomme communément *sinus longitudinal inférieur*. Mais ce n'est réellement qu'une veine d'un volume médiocre, logée dans un canal particulier que présente la faux le long de son bord concave. Cette veine n'existe point à l'extrémité antérieure de la faux ; elle commence vers le tiers moyen de cette cloison, et résulte de la réunion de plusieurs vénules de la faux elle-même. Fort étroite alors elle devient progressivement plus grosse en arrière, où elle se divise enfin en deux branches. L'une continue à suivre le bord concave de la faux, et se jette perpendiculairement dans le sinus droit à son extrémité antérieure, au-dessus de l'ouverture des veines de Galien. L'autre se porte quelque temps en arrière dans le milieu de la largeur de la faux, se recourbe enfin en bas et vient aboutir plus ou moins obliquement dans le même sinus droit vers le milieu de sa longueur. L'embouchure de la première branche se faisant à angle droit, n'offre point de repli valvulaire. Celle de la seconde au contraire en présente ordinairement un très-marqué, dont le bord libre se trouve en devant et en bas.

Cette veine reçoit toutes celles qui se distribuent à la faux : le cerveau ne lui envoie que de fort petits rameaux. Quelquefois cependant on trouve deux veines assez considérables de la surface interne des hémisphères, qui viennent se jeter de l'un et de l'autre côté dans celle que nous décrivons.

Veines des cavités cérébrales.

Ces veines peu multipliées si on les compare aux veines nombreuses et considérables qui occupent l'extérieur du cerveau, ont leurs principales origines dans la moitié inférieure des ventricules latéraux où elles forment sur les origines des nerfs optiques, sur les cornes d'Ammon et surtout dans les replis choroïdiens, des réseaux assez denses auxquels viennent se rendre de nombreuses vénules nées de toutes parts dans la substance cérébrale. Ces réseaux se réduisent bientôt dans chaque ventricule à deux veines principales.

L'une que je nommerai *veine du corps strié*, se contourne obliquement en dedans et en avant dans la rainure qui sépare la couche optique d'avec le corps strié, en suivant exactement le trajet de la bandelette demi-circulaire qui la recouvre. Elle parvient ainsi jusque auprès du pilier antérieur de la voûte. A elle viennent se rendre les rameaux veineux du corps strié.

L'autre veine, postérieure à la première et beaucoup plus volumineuse, appartient dans toute son étendue à la toile choroïdienne dont je lui donnerai le nom. Placée dans le repli extérieur de cette portion

membraneuse et côtoyant exactement avec lui le bord de la voûte à trois piliers, elle se contourne obliquement en avant et en dedans sur la couche optique. Flexueuse dans ce trajet, elle reçoit un grand nombre de ramuscules dont les uns viennent de la toile choroïdienne et de la voûte, les autres nés en grand nombre dans la substance médullaire, traversent verticalement de bas en haut la couche optique. Parvenue à quelque distance du pilier antérieur de la voûte, la *veine choroïdienne* se réunit à celle du corps strié. Le tronc veineux unique qui résulte des deux, continue à se porter en devant, se recourbe ensuite horizontalement en dedans sous la voûte, derrière son pilier antérieur, et changeant tout-à-fait de direction, se porte en arrière sur le milieu de la toile choroïdienne et de la voûte, parallèle à la veine semblable opposée. A cette courbure vient se rendre un rameau plus ou moins gros, né de la partie antérieure et inférieure du corps calleux et dirigé horizontalement en arrière en passant au côté externe du pilier antérieur.

Ce sont ces deux troncs uniques résultant chacun de la veine choroïdienne et de celle du corps strié réunies, qu'on nomme *veines de Galien*. Elles suivent le milieu de la toile choroïdienne, placées dans le canal que forme la pie-mère en pénétrant dans les ventricules, et hors de celui que forme l'arachnoïde dans le premier pour aller tapisser les mêmes cavités. Parvenues au bord postérieur de la voûte et du corps calleux, elles sortent du cerveau et rencontrent aussitôt l'extrémité antérieure du sinus droit dans lequel elles s'introduisent. En y entrant elles se croisent

obliquement entre elles, en sorte que la veine droite va gagner la paroi gauche du sinus, et réciproquement pour la veine gauche. L'une et l'autre cheminent quelque temps dans l'épaisseur de ces parois, s'ouvrent enfin obliquement dans la cavité du sinus en présentant chacune à leur embouchure un repli valvulaire semblable à ceux dont nous avons parlé plus haut.

Veines cérébelleuses supérieures.

Ces veines répandues sur toute la surface supérieure des deux lobes du cervelet et nées de sa substance, se réunissent en deux ou trois troncs principaux qui se dirigent un peu obliquement en haut et en avant en suivant la saillie longitudinale que présente le cervelet sur la ligne médiane. Ils se recourbent bientôt sur eux-mêmes, quittent le cervelet et pénètrent verticalement dans la partie inférieure du sinus droit, vers le milieu de sa longueur, au travers d'un écartement arrondi des fibres de la dure-mère. Quelques veines isolées se prolongeant davantage en avant et en haut vont se jeter dans les veines de Galien, près de leur terminaison au même sinus.

Trajet du sang dans le système veineux cérébral.

Nous divisons ici les sinus en ceux qui occupent la partie antérieure et inférieure du crâne, et ceux qui occupent sa partie supérieure et postérieure.

Parmi les premiers les sinus caverneux sont les plus antérieurs et les plus considérables. En devant

ils reçoivent le sang des veines ophtalmiques, en dedans celui du sinus coronaire. Ce sang qui, en arrière, communique librement d'un sinus caverneux à l'autre par le transverse, est enfin transmis par les sinus pétreux, tant supérieurs qu'inférieurs, dans les sinus latéraux et dans le golfe de la jugulaire.

Les sinus supérieur et postérieurs sont beaucoup plus étendus et plus larges. Le longitudinal commence vers l'apophyse crista-galli, se porte en arrière en suivant la faux, et reçoit dans son trajet le sang de toutes les veines cérébrales supérieures. Il transmet ce sang dans le confluent des sinus auquel il aboutit perpendiculairement.

Le sinus droit commence au milieu de la circonférence interne de la tente du cervelet. Là il reçoit les veines des cavités cérébrales et la veine inférieure de la faux. Dirigé en arrière il reçoit encore en bas, vers le milieu de son trajet, les veines cérébelleuses supérieures, et transmet tout le sang que ces vaisseaux lui ont fourni, dans le confluent des sinus à la partie antérieure duquel il va s'ouvrir.

Les deux colonnes de sang des sinus longitudinal et droit se rencontrent dans le confluent et en sortent aussitôt par quatre ouvertures. En bas les deux sinus occipitaux reçoivent une partie de ce sang et le transmettent de chaque côté dans le golfe de la jugulaire par la voie la plus courte. Mais la plus grande partie de ce fluide s'échappe par les larges orifices des sinus latéraux, parcourt d'arrière en avant ces conduits qui dans leur trajet reçoivent en bas, près du confluent, les veines cérébelleuses inférieures, en haut et près de la base du rocher les veines latérales du

cerveau. Tout ce sang arrive enfin aux golfes des veines jugulaires en se mêlant à celui qu'ont apporté les sinus antérieurs de la base du crâne, et descend dans les veines jugulaires pour se porter à la veine cave et au cœur.

§ IV. *Des Sinus vertébraux.*

Deux grands sinus occupent le canal de l'épine dans toute sa longueur, et se continuent sans interruption depuis le grand trou occipital jusqu'à l'extrémité inférieure du sacrum. Placés derrière les corps des vertèbres, sur les côtés du ligament vertébral postérieur, ils répondent en arrière à la dure-mère dont ils sont tout-à-fait indépendans et à laquelle un tissu cellulaire fort lâche les unit. Aussi les trouve-t-on parfaitement intacts lorsqu'après avoir ouvert en arrière le canal des vertèbres on enlève en même temps ou successivement et la moelle et la gaîne membraneuse que la dure-mere forme à cet organe.

Il y a donc une grande différence entre les sinus vertébraux et les sinus du crâne. Ceux-ci sont essentiellement formés, comme nous l'avons vu, par des lames écartées de la dure-mère, et la membrane veineuse prolongée dans ces écartemens, intimement adhérente à ces lames, ne peut point être considérée comme constituant la paroi solide des conduits sanguins. Les sinus vertébraux au contraire sont essentiellement formés comme les autres parties du système veineux général ; et pour s'en faire une juste image, il faut se représenter deux grandes veines

plus ou moins larges dans les divers points de leur étendue, parcourant de haut en bas le canal vertébral. Mais ces sinus ne se comportent pas tout-à-fait de même dans le canal vertebral proprement dit et dans le canal sacré. Il faut donc les considérer séparément dans ces deux endroits.

1°. *Disposition des sinus vertébraux dans le canal vertébral proprement dit.*

Ces sinus commencent sur les parties latérales du grand trou occipital, au niveau des trous condyloïdiens antérieurs qui leur transmettent chacun une veine, branche de la jugulaire interne. Le tissu qui forme leurs parois adhère au contour de ce trou condyloïdien, tandis que leur membrane interne se continue avec celle de la veine. Ainsi ils n'ont aucune espèce de communication avec le système veineux cérébral. Ils descendent en se rapprochant un peu l'un de l'autre, et se continuent dans le canal de l'épine. Placés dès-lors dans l'enfoncement qui résulte de l'union des corps des vertèbres avec les apophyses transverses et articulaires, ils occupent derrière les corps des vertèbres tout l'espace que laisse de chaque côté le ligament vertébral postérieur avec lequel leur membrane semble se continuer. Leur calibre est donc toujours en raison inverse de la largeur de ce ligament. Dans la région cervicale où il est large, les sinus sont plus étroits : ils augmentent de capacité dans la dorsale et dans la lombaire où le ligament se rétrécit. En général ils sont plus évasés sur les corps des vertèbres, plus étroits sur les fibro-cartilages qui

réunissent ces corps. Ceci est surtout sensible dans la région lombaire où chaque sinus alternativement resserré et dilaté à l'excès, semble offrir d'abord non pas un conduit continu, mais une suite de sinus isolés, demi-circulaires, placés sur les corps des vertèbres, interrompus sur les fibro-cartilages, ayant leurs bords convexes tournés en dedans et enchâssés dans les bords concaves que présente aux mêmes endroits le ligament vertebral rétréci. Mais il est facile de reconnoître ici la continuité du sinus en l'ouvrant dans une de ses portions dilatées et en y introduisant un stylet qu'on dirige verticalement soit en haut, soit en bas; on pénètre sans aucune peine dans les portions dilatées voisines, et en fendant ensuite le sinus le long du stylet, on voit que ce sinus n'existe pas moins sur les fibro-cartilages que sur les portions osseuses.

Depuis leur origine jusqu'au canal sacré les sinus vertébraux, exactement moulés sur les portions osseuses auxquelles ils correspondent, n'ont d'autre forme que celle que ces portions osseuses leur donnent. Considérés dans leur intérieur, ils présentent le même aspect que les sinus du crâne. Comme eux ils paroissent traversés en divers sens par des brides membraneuses irrégulièrement disposées, seulement beaucoup plus ténues et moins résistantes. A voir la transparence de ces brides, on est porté à les regarder comme des prolongemens de la membrane veineuse; il n'est même guère possible de leur supposer une autre origine, puisque cette membrane veineuse mince et délicate n'adhère nulle part à la dure-mère, et que celle-ci étant tout à fait enlevée, le

sinus demeure encore dans la plus parfaite intégrité.

En dedans les sinus vertébraux communiquent entre eux par des prolongemens nombreux qui forment de véritables sinus transverses. Ces conduits anastomotiques occupent constamment le milieu du corps de chaque vertèbre. Ils traversent d'un sinus à l'autre en passant sous le ligament vertébral postérieur. Logés chacun dans une gouttière creusée aux dépens de la vertèbre, ils ont un calibre plus ou moins volumineux selon que cette gouttière est plus ou moins profonde, et cette profondeur est souvent étonnante, surtout dans la région lombaire. En examinant ces conduits dans leur trajet intérieur, après avoir fendu transversalement le ligament vertébral, on voit qu'ils reçoivent des veines très-considérables du tissu spongieux des vertèbres; c'est même là une des sources principales du sang des sinus.

En dehors les sinus vertébraux communiquent avec les branches postérieures des veines vertébrales, intercostales et lombaires. On voit distinctement les orifices de toutes ces veines en ouvrant les sinus suivant leur longueur. Chaque veine aboutit au sinus dans l'intervalle de deux apophyses transverses; souvent même il y a deux veines pour un seul intervalle.

En arrière les sinus vertébraux ne reçoivent que des veines méningées appartenant à la portion de dure-mère qui enveloppe la moelle. Ces veines sont très-multipliées, mais extrêmement ténues, et on ne peut s'assurer de leur existence qu'au moment même de la dissection. C'est alors qu'en détachant doucement la dure-mère on voit une foule de ramus-

cules partir de la membrane, traverser le tissu cellulaire lâche qui l'unit aux sinus, et se terminer à ces conduits. Au moment où l'on coupe ces ramuscules pour continuer la dissection, une petite quantité de sang s'épanche dans ce tissu cellulaire, et lui donne une couleur rougeâtre qu'il n'avoit point auparavant.

2°. *Disposition des sinus vertébraux dans le canal sacré.*

En entrant dans le canal sacré les sinus vertébraux diminuent beaucoup de volume et changent d'aspect. Ce ne sont réellement plus des sinus; ce sont deux simples veines cylindriques, de grosseur médiocre, qui, placées sur les côtés des fausses vertèbres du sacrum et plongées dans une graisse assez abondante, sont tout-à-fait isolées des parties osseuses et ne leur adhèrent nulle part. Elles descendent en suivant la direction du canal et en se rapprochant par conséquent un peu l'une de l'autre jusqu'à la partie inférieure de l'os, et finissent chacune par un rameau ténu qui paroît se perdre dans les graisses.

Dans leur trajet elles communiquent en dehors d'une manière fort sensible, au niveau des trous sacrés antérieurs, avec les veines sacrées latérales, branches de l'hypogastrique. En dedans elles communiquent entre elles par quelques branches transversales. La dernière de ces branches est plus volumineuse que les autres; elle égale même chacune des deux veines qu'elle unit, et cette espèce d'arcade anastomotique paroît la terminaison principale de l'une et de l'autre.

Les sinus vertébraux reçoivent en dedans le sang de la dure-mère et du tissu spongieux des vertèbres. Ils le transmettent en dehors dans les veines vertébrales, intercostales, lombaires et sacrées, qui le portent ensuite dans les troncs auxquels elles appartiennent.

§ V. *De la Veine axillaire.*

C'est le nom que prend la sous-clavière au-devant du scalène antérieur, après avoir fourni la jugulaire externe.

Cette veine se porte obliquement en dehors et en bas au-dessous de la clavicule, descend ensuite dans le creux de l'aisselle, toujours placée au-devant de l'artère; et parvenue vers le tendon du grand pectoral, elle se divise en deux veines brachiales.

Dans son trajet l'axillaire fournit les veines thoraciques externes, acromiale et scapulaire inférieure, distribuées comme les artères de même nom. Mais elle donne de plus deux veines considérables qui ne répondent à aucun tronc artériel, et desquelles dépend tout le système veineux superficiel de l'avant-bras et de la main. Ce sont les veines *céphalique* et *basilique*.

1°. *Veine céphalique.*

Elle naît de l'axillaire immédiatement après son passage sous la clavicule, tantôt par un seul tronc, tantôt par plusieurs branches bientôt réunies. Souvent en cet endroit elle communique par un rameau avec la jugulaire externe. Dirigée obliquement en dehors, elle se porte dans l'intervalle graisseux qui sépare le

grand pectoral du deltoïde, et appliquée sur ce dernier muscle elle descend avec lui jusqu'à son tendon. Là elle devient sous-cutanée, et descend verticalement à la partie externe antérieure du bras jusqu'au pli du coude. Dans ce trajet elle donne un assez petit nombre de rameaux, dont les uns se répandent sur les muscles du bras, les autres sont cutanés.

Quelquefois la céphalique ne naît point immédiatement de l'axillaire, mais de ses branches. On voit alors plusieurs rameaux veineux sortir soit du grand pectoral, soit du deltoïde, se réunir par anastomose vers le tendon de ce dernier muscle, et donner naissance à la céphalique qui commence seulement en cet endroit.

Parvenue au pli du coude, la céphalique donne deux branches. L'une nommée *médiane céphalique*, ordinairement volumineuse, descend obliquement en dedans, et va vers le sommet de l'espace triangulaire formé en cet endroit par les faisceaux musculaires de l'avant-bras, se réunir à la médiane basilique dont nous parlerons plus tard. L'autre nommée *radiale superficielle*, moins grosse, descend le long de la partie externe antérieure de l'avant-bras jusque auprès du poignet, en répandant de toutes parts de nombreux rameaux qui s'étendent jusqu'à la partie postérieure de l'avant-bras.

La céphalique continue ensuite son trajet à la partie externe de l'avant-bras jusqu'à la main. Là elle se détourne en dehors, se porte sur les muscles du premier espace interosseux où elle prend le nom de *céphalique du pouce*, et se divise en une foule de rameaux dont les uns se répandent sur les muscles

du pouce, les autres vont sur le dos de la main concourir à former un réseau veineux sur lequel nous reviendrons bientôt.

Très-souvent la céphalique, au lieu de se distribuer ainsi, se termine presque en entier au pli du coude par la médiane céphalique, et répand seulement à la partie externe de l'avant-bras quelques rameaux fréquemment anastomosés. C'est alors la médiane commune qui va former en bas la céphalique du pouce.

2°. *Veine basilique.*

Elle est plus grosse que la céphalique. Née de l'axillaire au niveau de sa division en brachiales, et profondément cachée en cet endroit dans le creux de l'aisselle, elle descend le long de la partie interne du bras, subjacente à l'aponévrose et côtoyant le nerf cubital qu'elle recouvre. Dans ce trajet elle ne donne que quelques rameaux anastomotiques aux veines brachiales. Un peu au-dessus de la tubérosité humérale interne, elle devient sous-cutanée et se divise en trois branches nommées *médiane basilique*, *cubitale antérieure* et *cubitale postérieure*. Souvent la cubitale antérieure est fournie un peu plus bas par la médiane basilique, le tronc veineux se divisant alors en deux branches seulement.

La médiane basilique descend obliquement en dehors en côtoyant le tendon du biceps, et se réunit tantôt à angle aigu, tantôt par un rameau transversal, à la médiane céphalique. De leur anastomose naissent deux branches. L'une s'enfonce profondé-

ment sous le muscle grand pronateur et va s'unir aux veines radiale et cubitale. L'autre sous-cutanée prend le nom de *médiane commune*. Elle descend sur la surface antérieure de l'avant-bras en y répandant de toutes parts et surtout en dehors, de nombreux rameaux anastomosés avec les céphalique et radiale superficielle. Souvent, comme nous l'avons dit, cette médiane commune détournée elle-même en dehors va suppléer inférieurement la céphalique.

La cubitale antérieure, plus ou moins volumineuse descend au-devant de la tubérosité humérale, et tantôt continue à se porter le long de la partie antérieure interne de l'avant-bras en se subdivisant; tantôt se recourbe aussitôt en arrière au-dessous de la tubérosité, pour s'anastomoser avec la cubitale postérieure. Dans le dernier cas, l'arcade qu'elle forme donne par sa convexité une foule de rameaux qui descendent sur l'avant-bras en s'anastomosant ensemble. Ces rameaux, de quelque manière qu'ils soient produits, vont enfin gagner la paume de la main, où ils deviennent tout-à-fait cutanés.

La cubitale postérieure, toujours plus grosse que l'antérieure, se porte derrière ou sur la tubérosité humérale, descend à la partie interne de l'avant-bras en se rapprochant insensiblement de sa surface postérieure où elle se trouve enfin tout-à-fait, près du poignet. Là elle s'anastomose par de nombreux rameaux avec la céphalique et la radiale superficielle. Enfin elle descend sur le dos de la main près de son bord interne et finit en se subdivisant. C'est dans cette dernière partie de son trajet qu'elle a été nommée autrefois veine *salvatelle*.

Les rameaux réunis des céphalique, radiale superficielle et cubitale postérieure, forment soit sur le poignet, soit sur le dos de la main, un réseau assez compliqué, surtout vers l'extrémité inférieure du métacarpe. Ce réseau donne naissance à des rameaux secondaires qui descendent sur la face postérieure des doigts et se perdent aux tégumens.

Telle est la disposition du système veineux superficiel de l'avant-bras et de la main. Elle est sujette à des variations infinies, au point qu'il est comme impossible de la trouver parfaitement semblable sur deux sujets, et même sur les deux membres du même sujet.

Veines brachiales.

Ces deux veines naissent de l'axillaire au même endroit que la basilique. Quelquefois on n'en trouve qu'une, mais elle ne tarde pas à se diviser. L'une et l'autre descendent en côtoyant l'artère et en l'embrassant de distance en distance par des rameaux anastomotiques qu'elles s'envoient réciproquement. Vers le pli du coude, chacune se divise en deux branches qui suivent l'artère radiale ou cubitale dans toutes ses distributions, en sorte que chaque division artérielle est accompagnée par deux divisions veineuses. Du reste ce système veineux profond n'offre rien de remarquable.

III. DE LA VEINE CAVE INFÉRIEURE.

Cette veine, beaucoup plus considérable que la supérieure, naît en bas et en dehors de l'oreillette droite, et se trouve continue en cet endroit, soit avec les parois de l'oreillette proprement dite, soit avec celles de la veine cave supérieure. La disposition de son ouverture et la grande valvule qu'on y observe ont été examinées à l'occasion du cœur. Nous n'y reviendrons pas ici.

Partie de cet endroit et enveloppée à l'extérieur par la membrane séreuse du péricarde, la veine cave inférieure se dirige obliquement en dehors et en bas, et aussitôt traverse en même temps la membrane fibreuse du péricarde et le diaphragme par une ouverture particulière que ce muscle lui présente. Ce passage a lieu à l'instant même où la veine devient distincte de l'oreillette, et on ne peut point dire que la veine parcoure dans le péricarde un certain trajet avant de sortir, soit de ce sac membraneux, soit du thorax.

Introduite dans l'abdomen, la veine cave inférieure se trouve étroitement embrassée en devant et sur les côtés par le foie qui lui présente une échancrure particulière formée aux dépens du lobe droit en dehors, et du lobule de Spigel en dedans. En arrière elle répond à la partie moyenne inférieure du diaphragme. Quelquefois elle est environnée de tous côtés par le foie et comme plongée dans sa substance. Mais par-tout il est facile de l'isoler de cet organe, auquel elle n'adhère que par un tissu cellulaire

lâche, excepté dans les endroits où elle lui envoie des branches. Pendant son trajet derrière le foie, elle forme une légère courbure dont la convexité est à droite, la concavité à gauche. Son calibre, souvent un peu moindre que dans le reste de son étendue, est aussi quelquefois beaucoup plus considérable, surtout au niveau de la vésicule biliaire.

Parvenue au-dessous du foie, la veine cave descend verticalement sur la partie latérale droite du corps des vertèbres lombaires jusqu'au fibro-cartilage qui réunit la quatrième à la cinquième. Dans cette dernière partie de son trajet, elle est placée à droite de l'aorte, et recouverte d'abord par le duodénum, plus bas par le péritoine, tout-à-fait en bas par l'artère iliaque primitive droite au-dessous de laquelle elle finit en donnant les veines iliaques primitives.

Les branches que fournit la veine cave inférieure pendant son trajet dans l'abdomen sont : les veines diaphragmatiques inférieures, les hépatiques, les capsulaires, les rénales, les spermatiques et les lombaires.

1°. *Veines diaphragmatiques inférieures.*

On en compte ordinairement deux principales. Elles naissent tantôt de la veine cave au niveau de la surface convexe du foie, tantôt des veines hépatiques, et surtout de la supérieure. Leur distribution au diaphragme est tout-à-fait analogue à celle des artères diaphragmatiques inférieures qu'elles accompagnent. Plusieurs rameaux rentrent dans le thorax,

entre les fibres du diaphragme ou par l'ouverture qui donne passage à la veine cave, et vont se distribuer à l'œsophage, au péricarde, etc.

La veine cave fournit en outre plusieurs rameaux isolés qui vont se rendre transversalement aux appendices diaphragmatiques et s'y distribuent.

2°. *Veines hépatiques.*

Leur nombre est variable et leur volume très-inégal. Toujours plusieurs d'entre elles sont fort grosses. On peut distinguer les principales en celles qui appartiennent au lobe gauche et celles qui appartiennent au lobe droit.

Les premières naissent en devant de la veine cave, immédiatement après son entrée dans l'abdomen et au niveau de la surface convexe du foie. On en trouve deux ou trois. La plus considerable s'enfonce dans le milieu de ce lobe, règne pendant quelque temps dans son épaisseur en conservant son volume et en distribuant de tous côtés de nombreux rameaux; enfin elle se subdivise. Les autres pénètrent dans le même lobe, près de son bord libre et du repli péritonéal qu'on a nommé *ligament latéral gauche du foie*. Elles se prolongent aussi quelque temps dans l'epaisseur du lobe et se divisent enfin.

Au même endroit où les veines du lobe gauche prennent leur origine, on voit naître de la veine cave une espèce de ligament qui se continue dans la partie postérieure du sillon longitudinal. C'est le reste du canal veineux qui chez le fœtus termine la veine ombilicale.

Les veines du lobe droit naissent beaucoup plus bas que les précédentes, un peu au-dessus du lobule de Spigel. Elles partent de la convexité de la courbure que forme en cet endroit la veine cave. Une d'entre elles l'emporte de beaucoup en volume sur les autres et sur celles du lobe gauche. Transversalement dirigée à droite, elle pénètre le grand lobe du foie vers le milieu de sa surface inférieure, se prolonge assez loin dans son intérieur, et se subdivise enfin pour s'y distribuer entièrement.

Entre ces deux ordres de veines on trouve ordinairement une ou deux veines plus petites, qu'on pourroit nommer *hépatiques moyennes*. Elles pénètrent le lobe de Spigel par son côté droit et s'y distribuent.

Enfin des rameaux isolés, en nombre incertain, partent en divers points de la veine cave, et vont se perdre au foie sans affecter aucune disposition régulière et constante.

Chacune des veines hépatiques, en entrant dans le foie, s'environne d'une gaîne particulière que lui fournit la membrane propre de l'organe, membrane épaisse et solide, tout-à-fait distincte du péritoine auquel elle est subjacente, et dont un tissu cellulaire lâche la sépare (1). Cette gaîne accompagne la veine

(1) Cette membrane, qui sera examinée plus en détail à l'article du foie, n'est connue que depuis peu de temps. On en doit la découverte et la description exacte à M. Laennec, déjà connu par plusieurs observations très-curieuses et très-intéressantes, soit en médecine, soit en anatomie pathologique.

dans toutes ses distributions et en fortifie les parois. Ceci est surtout sensible pour les veines du lobe gauche, les plus rapprochées de la face convexe, où la membrane dont nous parlons est plus forte et plus dense que par-tout ailleurs.

3°. *Veines capsulaires.*

On en trouve une de chaque côté. La droite naît assez ordinairement de la veine cave, quelquefois cependant c'est la rénale qui la fournit. La gauche naît presque constamment de la rénale vers le milieu de sa longueur. L'une et l'autre assez volumineuses se dirigent transversalement en dehors, et chacune se porte au-devant de la capsule correspondante, dans un sillon que lui offre cette capsule à laquelle elle distribue tous ses rameaux, ainsi qu'au tissu cellulaire abondant et graisseux qui environne le rein.

4°. *Veines rénales.*

Elles sont très-volumineuses et naissent de la veine cave presque à angle droit. La droite, un peu moins grosse que la gauche, se dirige un peu obliquement en bas et en dehors au-devant de l'artère rénale. La gauche, plus volumineuse est aussi plus longue de toute la largeur de l'aorte, au-devant de laquelle elle passe pour se porter ensuite au-devant de l'artère rénale en suivant une direction transversale. Chacune arrivée à la scissure du rein se divise en plusieurs branches divergentes qui pénètrent l'organe dans toute son étendue, toujours placées au-devant

des branches artérielles dont elles suivent la distribution.

Dans son trajet la rénale droite ne donne ordinairement que quelques rameaux capsulaires et adipeux. La gauche fournit de plus en haut la veine capsulaire gauche, en bas la veine spermatique.

5°. *Veines spermatiques.*

Elles sont un peu plus volumineuses que les artères de même nom. La droite naît ordinairement de la partie antérieure de la veine cave, au-dessous de la rénale. La gauche naît de la partie inférieure de la rénale, sur les parties latérales du corps des vertèbres. Leur origine a lieu tantôt par un seul tronc, tantôt par deux branches bientôt réunies.

Chacune se dirige aussitôt un peu obliquement en dehors entre le péritoine et le psoas, puis se recourbe légèrement pour se porter verticalement en bas, toujours placée sur ce muscle. Vers le milieu de son trajet et au-dessous du rein, la veine donne un grand nombre de rameaux qui se portent transversalement en dehors au-devant de la graisse abondante du rein, et s'anastomosent fréquemment ensemble de manière à former un plexus veineux qu'on a nommé *corps pampiniforme*. Souvent le tronc de la veine finit par ce plexus qui se prolonge ensuite inférieurement. D'autres fois la veine demeure entière après l'avoir formé. Parmi les rameaux qu'elle donne en dehors dans les régions lombaire et iliaque, plusieurs remontent sur le péritoine et vont s'anastomoser soit dans le méso-colon, soit dans le mésentère, avec

les veines mésentériques, branches de la veine porte, ce qui établit une communication entre le système veineux général et le système veineux abdominal.

La veine spermatique parvenue près du détroit supérieur du bassin se comporte différemment chez l'homme et chez la femme.

Chez l'homme elle continue à se porter en dehors en côtoyant le psoas, et bientôt s'unit au conduit déférent pour sortir avec lui par l'anneau inguinal. Dans cet endroit elle est déjà divisée en plusieurs branches rapprochées et anastomosées plus ou moins fréquemment ensemble. Ces branches placées hors de la tunique vaginale comme le conduit déférent qu'elles enveloppent, descendent jusqu'au testicule en donnant soit au conduit déférent, soit à l'extérieur de la tunique vaginale, de nombreux rameaux. Ces derniers s'anastomosent avec les rameaux beaucoup plus multipliés que la même tunique vaginale reçoit des plexus vésicaux, des veines dorsales de la verge, etc.

Près du testicule, les branches de la veine spermatique beaucoup plus subdivisées, plus anastomosées, plus volumineuses, forment un plexus considérable. De ce plexus partent plusieurs branches très-grosses qui traversent la tunique albuginée au-devant de la tête de l'épididyme, pénètrent ainsi dans le testicule à sa partie supérieure et postérieure, règnent quelque temps entre la membrane et la substance propre dans laquelle elles se plongent enfin et se distribuent par une infinité de rameaux.

Le plexus lui-même gagne l'épididyme et se prolonge tout le long de la partie supérieure de ce corps

en lui fournissant de très-nombreuses branches, dont aucune ordinairement ne passe de l'épididyme au testicule, comme il est facile de s'en assurer en isolant l'épididyme, qui n'adhère au testicule que par un tissu cellulaire assez lâche. Mais vers l'extrémité mince de l'épididyme le plexus veineux spermatique fournit une grosse branche qui traverse la tunique albuginée du testicule et se perd presque entièrement dans l'épaisseur de cette membrane, en fournissant seulement quelques rameaux à la substance même de l'organe.

Chez la femme, la veine spermatique parvenue près du détroit supérieur, se détourne en dedans, s'enfonce dans le bassin, en passant sur l'artère iliaque externe dont elle croise obliquement la direction, s'engage entre les deux feuillets du ligament large au niveau de leur duplicature, et se porte ainsi jusqu'à l'ovaire. Avant d'y arriver, elle donne une ou plusieurs branches volumineuses, qui vont gagner la trompe et le ligament rond, qu'elles suivent en se distribuant à eux. Parvenue à l'ovaire, la veine se divise en une infinité de rameaux qui forment à la partie inférieure de ce corps, en y pénétrant, un plexus très-serré. Ce plexus se prolonge jusque sur les côtés de la matrice, où les spermatiques s'anastomosent sensiblement avec les veines utérines.

6°. *Veines lombaires.*

Il y en a ordinairement quatre de chaque côté. Elles naissent, tantôt séparément, tantôt par des troncs communs, des parties latérales et postérieure de la

veine cave; quelquefois les iliaques primitives en fournissent une ou deux. Les gauches qui passent sous l'aorte sont plus longues que les droites. Toutes dirigées transversalement sur les corps des vertèbres au-dessous du psoas, vont comme les artères se diviser chacune en branches postérieure et antérieure. La postérieure introduite dans le canal de l'épine par le trou de conjugaison, va s'anastomoser avec le sinus vertébral de son côté. L'antérieure se porte en dehors dans les muscles de l'abdomen ou du bassin et s'y perd en s'unissant aux veines intercostales, épigastrique, circonflexe, iliaque. Souvent dans leur trajet les lombaires communiquent entre elles, au-devant de la colonne vertébrale, par plusieurs rameaux.

7°. *Veine sacrée moyenne.*

Elle naît tantôt de la partie postérieure de la veine cave avant sa bifurcation, tantôt et souvent de la veine iliaque primitive gauche. Elle descend dans le bassin, se place au milieu du sacrum et se comporte ensuite comme l'artère du même nom. Son volume est peu considérable, et le plus souvent ses branches latérales ne s'introduisent point dans le canal sacré, mais s'anastomosent simplement avec les sacrées latérales.

IV. DES VEINES ILIAQUES PRIMITIVES.

Ces deux grosses veines naissent de la veine cave inférieure au niveau du fibro-cartilage qui unit la quatrième vertèbre à la cinquième, et s'écartent aussi-

tôt l'une de l'autre en formant un angle à-peu-près droit pour se diriger obliquement en dehors. La gauche passe au-dessous de l'artère iliaque primitive droite, puis au-devant de la cinquième vertèbre lombaire, et se trouve ensuite en dedans et un peu au-dessous de l'artère iliaque primitive gauche. Parvenues toutes deux vers la symphyse sacro-iliaque, elles se divisent chacune en veine hypogastrique et veine iliaque externe.

§ Ier. *De la veine hypogastrique.*

Elle descend presque verticalement dans le bassin, derrière l'artère qu'elle accompagne. Ses branches, toutes volumineuses, correspondent exactement pour le nombre comme pour le nom à celles de cette artère. Les seules qui offrent des différences sensibles et qui méritent d'être examinées en particulier, sont les sacrées latérales et les vésicales.

1°. *Veines sacrées latérales.*

Elles sont souvent en nombre égal à celui des trous sacrés antérieurs. Elles naissent alors toutes en particulier de l'hypogastrique, se dirigent transversalement au-devant du sacrum, communiquent avec la veine sacrée moyenne, et s'introduisent dans le canal sacré où elles s'anastomosent avec les veines qui terminent les sinus vertébraux. Leur volume, assez considérable, paroît plus grand dans les inférieures que dans les supérieures.

2°. *Veines vésicales.*

Elles sont très-nombreuses et très-grosses. Nées de l'hypogastrique, au même endroit à-peu-près que l'obturatrice, elles ont une distribution un peu différente suivant le sexe.

Chez l'homme les veines vésicales dès leur origine fournissent beaucoup de rameaux qui se portent entre le rectum et la vessie, se distribuent principalement aux vésicules séminales sur lesquelles ils forment un réseau plus ou moins dense. Elles se dirigent ensuite sur les parties latérales et inférieure de la vessie où elles forment par leur réunion et par leurs anastomoses un plexus très-étendu dont les branches volumineuses se répandent dans toute sorte de directions, soit sur la vessie, soit sur la prostate. Plusieurs vésicales continuent leur trajet horizontal sur les côtés de la vessie jusqu'à l'arcade du pubis, sortent par cette arcade en se confondant avec les branches de la veine honteuse interne, et remontent sur les parties latérales du dartos, entre lui et le scrotum, jusqu'à la racine du corps caverneux correspondant. Là elles se divisent en deux ordres de branches.

Les unes se portent en dehors dans l'épaisseur du dartos et du scrotum auxquels elles fournissent une infinité de rameaux, et vont enfin se distribuer à l'extérieur de la tunique vaginale du cordon spermatique et du testicule, en s'anastomosant avec la veine spermatique ou avec une autre veine ordinairement fournie par la fémorale.

Les autres branches sont les veines dorsales de la

verge. Placées d'abord à l'extérieur du corps caverneux, elles le contournent de bas en haut, gagnent sa partie supérieure, et se réduisent ordinairement à un ou deux troncs qui suivent le dos de la verge jusqu'au gland en se distribuant comme les artères dorsales qu'elles accompagnent.

Chez la femme il part de ces veines, dès leur origine, plusieurs rameaux qui vont se rendre entre le rectum et le vagin à leur partie inférieure pour se distribuer à l'un et à l'autre. Des rameaux plus nombreux encore se portent entre le vagin et le bas-fond de la vessie, et se répandent sur ces deux organes en s'anastomosant fréquemment ensemble et avec ceux du côté opposé.

Mais les veines vésicales elles-mêmes se dirigent sur les côtés de la vessie et du vagin où elles forment un plexus très-considérable d'où partent beaucoup de rameaux qui enveloppent la vessie à sa partie supérieure. Malgré leurs anastomoses nombreuses, elles continuent la plupart à se porter horizontalement en devant jusqu'aux grandes lèvres. Là elles se répandent dans le tissu cellulaire abondant de cette partie, dans la peau, dans le muscle constricteur, et forment dans tout le contour de la vulve de nombreux plexus auxquels viennent se perdre les veines honteuses soit internes, soit externes. Plusieurs rameaux nés de ces plexus remontent au-devant de la symphyse et donnent naissance aux veines dorsales du clitoris qui suivent la partie supérieure de ce corps jusqu'à son extrémité.

§ II. *De la veine iliaque externe.*

Placée au-dessous et un peu en dedans de l'artère, elle en suit exactement le trajet pour sortir avec elle par l'arcade crurale. Avant ce passage elle donne les veines épigastrique et circonflexe iliaque tellement semblables aux artères de même nom qu'il est inutile de les décrire.

§ III. *De la veine fémorale.*

La veine iliaque prend ce nom en traversant l'arcade crurale. Elle donne en cet endroit plusieurs rameaux aux glandes inguinales et aux graisses. Chez l'homme elle donne dans le même endroit aux parties génitales une grosse branche qu'on pourroit nommer *veine de la tunique vaginale.* Nee sous l'arcade crurale, elle côtoie en dedans le ligament de Fallope, sur lequel elle remonte un peu pour sortir par l'anneau inguinal en s'unissant au cordon spermatique. Elle descend ensuite sur la tunique vaginale jusque auprès du testicule, et se distribue entièrement à cette tunique en s'anastomosant avec des rameaux de la veine spermatique et des veines vésicales.

Toujours contiguë à l'artère, la veine fémorale fournit des branches profondes dont la description seroit superflue. Mais elle donne de plus une grande veine superficielle qui occupe la cuisse et la jambe et qui ne répond à aucune artère. C'est la saphène interne.

Veine saphène interne.

Elle naît de la fémorale un peu au-dessous du ligament de Fallope, traverse aussitôt en devant les graisses et l'aponévrose fémorale pour devenir superficielle. Dans cet endroit elle donne aux parties génitales quelques veines qu'on nomme *honteuses externes*. Elle donne aussi supérieurement plusieurs veines *sous-cutanées abdominales* qui remontent entre la peau et les muscles de l'abdomen. Une d'entre elles suit assez constamment en dehors le ligament de Fallope et la crête iliaque jusqu'à une certaine distance.

En fournissant ces veines, la saphène elle-même se divise en deux branches d'égal volume.

La première, immédiatement sous-cutanée, c'est-à-dire placée entre la peau et le tissu graisseux qui lui est subjacent, descend obliquement le long de la partie interne de la cuisse en répandant des rameaux nombreux et irréguliers à sa partie antérieure. Parvenue au condyle interne du genou, elle s'anastomose par un seul tronc ou par plusieurs rameaux volumineux avec la seconde branche. Quelquefois elle ne va pas plus loin, d'autres fois elle descend à la partie interne et antérieure de la jambe où elle se perd en se ramifiant, toujours placée entre la peau et la graisse.

La seconde branche qui forme la continuation principale de la veine saphène, se trouve un peu en dedans de la précédente dont elle est séparée par la couche graisseuse sous cutanée. Immédiatement appli-

quée dans tout son trajet sur l'aponévrose qui seule la sépare des muscles, cette branche descend presque verticalement à la partie interne de la cuisse, au devant des muscles adducteurs et droit interne. Elle donne dans ce trajet quelques rameaux qui se contournent sur le faisceau que forment ces muscles réunis et vont se distribuer à la partie postérieure de la cuisse. Ensuite elle passe derrière le condyle interne du fémur, prend une direction oblique en avant et en bas pour gagner la partie antérieure interne de la jambe sur laquelle elle descend ensuite verticalement jusqu'à quelque distance de la malléole interne. Là elle redevient oblique, passe au-devant de cette malléole sur l'articulation du pied, et suit la partie interne supérieure du métatarse jusqu'aux orteils en répandant sur le dos du pied des rameaux irrégulièrement disposés. Près des orteils elle donne un rameau qui continue à se porter dans la même direction le long du gros orteil auquel il se distribue. Puis elle se recourbe en dehors, et forme en s'anastomosant avec la saphène externe une arcade dont la convexité antérieure fournit des rameaux plus ou moins nombreux distribués aux tégumens des orteils.

§ IV. *De la veine poplitée.*

La veine fémorale prend ce nom comme l'artère en traversant le grand adducteur. Placée d'abord derrière l'artère poplitée, puis à sa partie externe, elle la suit exactement et fournit profondément le même nombre de branches. Comme l'artère elle se divise à la jambe en veines tibiale antérieure, tibiale posté-

rieure et péronière. Mais la description de ces veines seroit superflue. La poplitée fournit en outre une veine superficielle pour la jambe. C'est la saphène externe.

Veine saphène externe.

Elle naît de la poplitée avant sa sortie du creux du jarret, descend verticalement à côté du tronc nerveux tibial qu'elle abandonne bientôt pour continuer à descendre dans la même direction entre les tégumens et la réunion des muscles jumeaux jusque vers le tiers inférieur de la jambe. Là elle se détourne un peu en dehors, descend obliquement à côté du tendon d'Achille dont elle s'éloigne toujours davantage, passe enfin derrière et au-dessous de la malléole externe, et se divise en plusieurs rameaux dont les uns embrassent cette malléole, les autres se répandent sur le dos du pied et sur sa partie externe en s'anastomosant avec la saphène interne.

Peu après son origine, la saphène externe donne souvent une ou plusieurs branches récurrentes qui remontent à la partie postérieure de la cuisse et s'y perdent. Dans le reste de son trajet elle fournit un nombre variable de rameaux qui se répandent sur la partie postérieure de la jambe et s'étendent jusqu'à sa partie antérieure.

APPAREIL

DE

L'ABSORPTION.

Considérations générales.

L'appareil absorbant se compose d'une multitude de vaisseaux ténus, qui, nés des surfaces membraneuses et du tissu interne des organes, ont pour fonction de transmettre dans le système à sang noir et les fluides exhalés et les molécules qui ont servi pendant quelque temps à la nutrition. C'est à cet appareil qu'appartiennent aussi les vaisseaux *lactés* ou *chylifères* destinés à porter dans le torrent circulatoire le produit du travail digestif : ces derniers diffèrent absolument des autres sous les rapports physiologiques, mais se confondent avec eux pour la disposition anatomique et pour l'organisation.

L'ensemble de l'appareil absorbant et les caractères communs des vaisseaux qui le composent ont été examinés avec autant de précision que de soin dans l'Anatomie générale. Rappelons seulement ici quelques-unes des considérations qui ont un rapport plus direct avec les détails descriptifs.

1°. Quelque part qu'on examine les absorbans on voit qu'ils forment deux plans distincts, l'un superficiel, l'autre profond. Ainsi tout l'extérieur du corps est recouvert par un réseau d'absorbans placés dans le

tissu cellulaire sous-cutané, tandis que d'autres absorbans occupent les intervalles des organes. C'est aux membres qu'il est le plus facile d'observer cette disposition. On la retrouve sur chaque organe en particulier : le foie, la rate, le poumon environnés à l'extérieur par une multitude d'absorbans, en contiennent aussi de très-nombreux dans leur intérieur. Par-tout les absorbans superficiels sont répandus à-peu-près uniformément, et se comportent d'une manière qui leur est propre; les absorbans profonds au contraire se réunissent en faisceau autour des vaisseaux sanguins dont ils suivent exactement la direction et les rameaux. On conçoit dès-lors que les détails descriptifs doivent porter principalement sur les absorbans superficiels.

Ces deux plans communiquent continuellement ensemble par un grand nombre de rameaux anastomotiques. Souvent ils se réunissent en entier en formant des plexus communs pour se diviser de nouveau peu de temps après : ceci s'observe constamment à l'extrémité supérieure de chaque membre. Enfin ils se confondent toujours à leurs dernières terminaisons, soit dans l'abdomen, soit dans le thorax.

2°. En général les absorbans sont peu flexueux dans leur trajet, mais leurs subdivisions et leurs anastomoses sont extrêmement multipliées; souvent même l'entrecroisement est si continuel que le terme de *plexus* est le seul sous lequel on puisse les décrire. C'est aux membres et surtout aux membres inférieurs que ces communications sont le moins nombreuses, et que les absorbans conservent le plus long-temps leur parallélisme mutuel; cependant il seroit difficile

de suivre un absorbant jusqu'à une certaine distance sans le trouver subdivisé.

Mais ce qu'on doit surtout remarquer ici comme un des caractères les plus distinctifs des absorbans, c'est la fréquence de leurs réunions et de leurs divisions alternatives. Dans le système veineux général, lorsque deux rameaux réunis ont formé un tronc unique, ce tronc pour l'ordinaire ne se sépare plus en rameaux nouveaux, et conserve sa grosseur jusqu'à ce qu'il se joigne à un autre tronc égal à lui, pour donner naissance à une veine plus volumineuse que l'un et que l'autre. Dans l'appareil absorbant, au contraire, on voit sans cesse un grand nombre de rameaux réduits à un seul tronc qui peu après se subdivise en rameaux aussi nombreux que les premiers. La diminution des rameaux et leur réduction à un certain nombre de troncs n'ont donc point lieu d'une manière aussi progressive et aussi régulière dans l'appareil absorbant que dans le système veineux. Aussi observe-t-on que la quantité des absorbans est à-peu près égale dans toutes les parties; on ne les trouve guère moins multipliés au bras ou à la cuisse qu'à l'avant-bras ou à la jambe, et les troncs par lesquels tout l'appareil absorbant doit aboutir aux veines ne sont complets et n'ont reçu tous les rameaux qu'ils doivent représenter qu'à peu de distance de leur embouchure.

3°. C'est une loi constante que tous les absorbans doivent pendant leur trajet traverser un certain nombre de petits organes qui leur sont propres, et que l'on nomme improprement *glandes*, puisqu'ils n'ont aucun rapport d'organisation ni de phénomènes avec

l'appareil des sécrétions. Ces glandes, variables pour la grosseur et pour la forme, se trouvent en plus ou moins grande abondance dans les diverses parties : peu multipliées aux membres, plus nombreuses dans le thorax, accumulées en quantité prodigieuse autour des viscères abdominaux, près des origines immédiates du conduit thorachique, elles sont surtout rapprochées des vaisseaux sanguins, et reçoivent les absorbans superficiels et profonds qui se réunissent aux mêmes endroits. Souvent plusieurs glandes sont rangées à la suite les unes des autres sur le trajet d'un absorbant qui paroît les traverser successivement. Je dis, *qui paroît les traverser*, car il n'est point exact de dire que les absorbans traversent les glandes, et cette locution que j'ai très-souvent employée ne doit être prise que comme une formule descriptive utile pour éviter les longueurs. Tout ce qu'on voit en effet ce sont des absorbans terminés à une glande, et d'autres absorbans naissans de l'autre côté de la même glande; mais ce qui se passe dans l'organe lui-même nous est encore inconnu. Il paroît d'après les injections délicates de Mascagni que le tissu de la glande n'est autre chose qu'une multitude d'absorbans repliés une infinité de fois sur eux-mêmes; mais en supposant ceci démontré, nos connoissances n'en sont guère plus avancées.

4°. Les absorbans se terminent tous par plusieurs troncs dans les veines sous-clavières et jugulaires internes. De ces troncs le plus considérable est celui qu'on nomme *conduit thorachique*. Lui seul reçoit la plupart des absorbans de l'abdomen, des membres inférieurs, et une grande partie de ceux du thorax ;

il aboutit par une seule ou par plusieurs embouchures dans la veine sous-clavière gauche.

D'autres troncs beaucoup plus courts et moins constans, chacun en particulier, reçoivent les absorbans de la tête, du cou, des membres supérieurs et une partie de ceux des organes thorachiques. Presque toujours on en trouve un à droite qui réunit les absorbans axillaires, et qui s'ouvre dans la veine sous-clavière droite. C'est lui qu'on a nommé *grande veine lymphatique droite, tronc des absorbans du côté droit*, etc. en établissant une sorte de comparaison entre lui et le conduit thorachique. Il ne peut cependant y en avoir aucune, car le tronc n'a pour l'ordinaire que quelques lignes de longueur; très-souvent on en trouve un semblable pour les absorbans axillaires gauches, et presque constamment des tronc isolés, ouverts immédiatement dans les veines, terminent la plus grande partie des absorbans de la tête et du cou.

5°. Considérés dans leur organisation intime autant qu'il est possible de la connoître, les absorbans présentent deux membranes, l'une extérieure celluleuse, l'autre interne continue à la membrane commune des veines. Cette membrane interne forme sur elle-même, de distance en distance des replis semi-lunaires ou valvules qui par leur disposition empêchent les fluides de rétrograder des troncs vers les rameaux. Ces valvules sont ordinairement disposées deux à deux. Dans quelques parties, comme au foie, elles sont peu multipliées, et il en résulte moins de difficulté pour les injections qui en général ne peuvent être faites que des rameaux aux troncs.

Lorsqu'on injecte les absorbans, ils se dilatent beaucoup plus dans les intervalles des valvules que dans l'endroit où ces valvules existent, et de là résultent ces *nodosités* qui servent de caractère pour distinguer les absorbans d'avec d'autres vaisseaux également ténus.

Il me reste un mot à dire sur la marche descriptive que j'ai suivie. J'ai cru devoir placer l'exposition des glandes avant celle des vaisseaux, quoique ce ne fût pas l'intention de Bichat dans le temps où il traçoit le plan de ce Traité. Les glandes peuvent en effet être considerées comme les terminaisons immédiates des diverses parties de l'appareil absorbant. Placées de distance en distance, elles indiquent par leur seule position le trajet des vaisseaux, et lorsque cette position est determinee on se forme déjà une image assez exacte de tout l'appareil vasculaire. On ne peut d'ailleurs decrire les vaisseaux sans parler des glandes et sans les supposer connues, tandis qu'on peut décrire les glandes independamment des vaisseaux.

Je ne parle point ici des généralités des glandes. Elles ont été exposées avec tous les détails nécessaires dans l'Anatomie générale, et la précision de ces détails ne permettroit que difficilement de les analyser.

Dans l'etude des absorbans j'ai suivi l'ordre naturel, et j'ai commencé par les rameaux pour finir par les troncs. Il n'y avoit effectivement ici, à ce qu'il me semble, aucune raison suffisante pour intervertir cet ordre. Aucun absorbant ne demande à être décrit en particulier avec une scrupuleuse exactitude; la chose seroit même impossible. On les considère toujours plus ou moins collectivement dans chaque partie et il

est alors tout aussi facile de les prendre dans un sens que dans l'autre. Comment d'ailleurs aller ici des troncs aux rameaux, puisque le nombre des troncs est toujours incertain ? Le conduit thorachique et le tronc absorbant du côté droit ne sont ni toujours, ni même le plus ordinairement les seules terminaisons de l'appareil vasculaire. Il m'a paru plus simple de comprendre, comme Mascagni, tous les vaisseaux sous les trois divisions suivantes.

1°. Des absorbans qui se terminent au conduit thorachique.

2°. Du conduit thorachique.

3°. Des absorbans qui se terminent en partie dans le conduit thorachique, en partie dans les veines gauches ou droites par des troncs particuliers.

DES GLANDES DES ABSORBANS.

Nous considérons les glandes dans le même ordre que les absorbans, et nous commençons par celles des membres inférieurs pour finir par celles de la tête et du cou.

Pour bien voir les glandes absorbantes, il faut nécessairement choisir un jeune sujet. Il n'est en effet aucune espèce d'organes dont le volume et le développement varient autant selon l'âge. L'enfance est la seule époque à laquelle les glandes soient toutes bien prononcées. Chez l'adulte elles diminuent en nombre; chez le vieillard on ne trouve plus guère que celles qui occupent les extrémités des membres; toutes les autres ont disparu ou du moins sont à peine sensibles. Du reste, leur disposition est la même à tous

les âges; leur couleur seule varie en quelques endroits, comme nous l'indiquerons à mesure que l'occasion s'en présentera.

§ Ier. *Des glandes des membres inférieurs.*

On ne trouve pour l'ordinaire aucune glande dans toute l'étendue de la jambe. Quelquefois cependant on en remarque une à la partie antérieure et supérieure de ce membre. Placée entre le tibia et le péroné, elle répond en arrière près de l'endroit où finit le ligament interosseux. On la nomme *glande tibiale antérieure*.

Glandes poplitées. Elles varient en nombre; le plus souvent on n'en trouve que trois ou quatre. Leur volume est peu considérable. Profondément cachées sous l'aponévrose fémorale, elles environnent l'artère poplitée. Leur position respective n'a rien de fixe.

Glandes inguinales. On les distingue en superficielles et profondes Les superficielles situées entre la peau et l'aponévrose fémorale environnent la veine saphène interne près de son origine. Leur nombre varie de sept à douze ou treize; leur volume est d'autant plus considérable qu'elles sont moins nombreuses. Le groupe qu'elles forment se prolonge quelquefois jusqu'à la partie moyenne de la cuisse, les glandes devenant toujours plus rares et plus écartées les unes des autres à mesure qu'on s'éloigne de l'arcade crurale. La couleur de ces glandes, rougeâtre dans la première enfance, blanchâtre dans la jeunesse et dans l'âge adulte, devient souvent légèrement brune chez le vieillard.

Les glandes inguinales profondes situées sous l'aponévrose fémorale qui les sépare des précédentes, sont au nombre de deux, trois ou quatre; quelquefois mais rarement sept. Elles environnent l'artère fémorale dont elles sont plus ou moins rapprochées.

On trouve à tout âge les glandes inguinales superficielles; leur volume seul est différent. Les profondes au contraire manquent souvent chez le vieillard.

§ II. *Des Glandes du bassin.*

On les distingue en iliaques externes, hypogastriques et sacrées.

Glandes iliaques externes. Leur nombre varie de six à dix et plus. Elles environnent les vaisseaux iliaques externes et forment autour d'eux une rangée qui commence auprès de l'arcade crurale, s'étend en haut jusqu'à la partie inférieure des lombes, où ces glandes se continuent avec les lombaires. Trois d'entre elles, plus constantes que les autres, placées sous le ligament de Fallope, au-devant et sur les côtés des vaisseaux iliaques, semblent tenir le milieu par cette position entre les glandes inguinales profondes et les glandes iliaques externes proprement dites.

Glandes hypogastriques. Elles occupent les parties latérales de l'excavation du bassin et se trouvent disséminées autour des vaisseaux sanguins hypogastriques. Leur nombre est incertain. Le groupe qu'elles forment se prolonge plus ou moins sur le trajet de chaque vaisseau en particulier, et l'on peut ranger parmi elles les petites glandes qu'on ren-

contre quelquefois, soit dans l'épaisseur des muscles postérieurs du bassin, sur les artères fessières ou ischiatiques, soit sur la vessie ou sur les organes génitaux internes.

Glandes sacrées. Placées au-devant du sacrum elles occupent l'intervalle des feuillets du méso-rectum. Le groupe qu'elles représentent se continue en haut avec les glandes méso-coliques, sur les côtés avec les hypogastriques.

§ III. *Des Glandes abdominales.*

On peut les diviser en lombaires, mésentériques, méso-coliques, stomachiques et cœliaques.

Glandes lombaires. Elles sont nombreuses et assez grosses pour la plupart. Les unes occupent les côtés des corps des vertebres et se trouvent ou entre les apophyses transverses, ou sur le trajet des vaisseaux sanguins. Les autres, plus remarquables, environnent l'aorte et la veine cave. Toutes forment par leur réunion une rangée qui s'étend de bas en haut depuis l'origine des vaisseaux iliaques primitifs jusque sur les appendices diaphragmatiques. On peut compter parmi ces glandes celles qui entourent les artères rénales dans leur trajet de l'aorte aux reins.

C'est des glandes lombaires que naissent en grande partie les absorbans qui forment les premières origines immédiates du conduit thorachique.

Glandes mésentériques. Elles sont extrêmement multipliées et pour l'ordinaire très-volumineuses. On a cherché souvent à les compter, mais leur nombre est tellement variable que ce calcul ne peut

offrir aucun intérêt, comme il n'offre assurément aucune utilité. Placées entre les deux feuillets du mésentère, ces glandes occupent toute l'étendue de ce repli jusqu'à un pouce de distance du bord concave de l'intestin. Là elles cessent entièrement pour l'ordinaire, en sorte qu'on n'en trouve plus dans cette portion des feuillets péritonéaux qui, comme nous l'avons vu dans le temps, peut alternativement s'étendre sur l'intestin ou l'abandonner. En général ces glandes, plus petites auprès du tube intestinal, augmentent de volume à mesure qu'on se rapproche du bord fixe du mésentère. Elles sont plus grosses et plus nombreuses dans la partie qui répond au jéjunum que dans celle qui répond à l'iléum. Quelquefois vers le bord fixe du mésentère on en trouve plusieurs tellement rapprochées qu'elles paroissent confondues ensemble ; c'est ce qui a donné lieu à l'erreur d'Azelli, qui les prit en cet endroit pour un second pancréas.

Ce sont les glandes mésentériques qui reçoivent immédiatement les absorbans chyleux. De là sans doute la facilité avec laquelle elles s'engorgent dans plusieurs maladies qui portent principalement leur influence sur les fonctions digestives.

Glandes méso-coliques. Leur nombre est fort inférieur à celui des mésentériques. Placées entre les feuillets du méso-colon, elles sont plus multipliées dans la portion transverse que dans les portions lombaires droite et gauche ; elles augmentent un peu dans la portion iliaque. En général elles sont assez rapprochées du bord concave de l'intestin ; quelques-unes même sont disséminées sur sa surface.

Très-souvent ces glandes ne participent en aucune manière à l'engorgement si fréquent des glandes mésentériques : on en conçoit facilement la raison, les gros intestins étant presque entièrement étrangers à l'absorption chyleuse.

Glandes stomachiques. Elles occupent les deux courbures de l'estomac et sont disposées le long des arcades que forment les artères gastriques. Leur nombre est fort petit et ne va guère au-delà de cinq ou six sur chaque courbure.

Glandes cœliaques. Je comprends sous ce nom celles qu'on appelle ordinairement *hépatiques*, *pancréatiques* et *spléniques*, parce que les vaisseaux qui dépendent de l'artère cœliaque peuvent être regardés comme le centre commun de toutes ces glandes. Les unes environnent le tronc de la veine porte au moment où elle s'introduit dans le foie. Les autres sont rangées le long de l'artère splénique. D'autres enfin placées autour de l'artère cœliaque et à l'origine de la mésentérique forment un groupe commun avec les premières lombaires. Ces glandes sont nombreuses et peuvent être regardées comme les points principaux d'origine du conduit thoracique.

§ IV. *Des Glandes thorachiques.*

Elles appartiennent au médiastin, aux parois du thorax et aux poumons.

Glandes médiastines. Les unes, au nombre de trois ou quatre peu volumineuses, se trouvent immédiatement sur le diaphragme. D'autres en quantité à-peu-près egale occupent l'écartement inférieur

du médiastin, et sont disséminées sur le péricarde ou plongées dans le tissu cellulaire. Les plus nombreuses placées dans l'écartement supérieur du médiastin environnent le thymus, les gros vaisseaux, et se confondent avec les glandes inférieures du cou.

Glandes des parois thorachiques. Quelques petites glandes sont répandues çà et là dans toute l'étendue de ces parois entre les muscles intercostaux externes et internes. Les plus constantes se trouvent au niveau des têtes des côtes sur les côtés des corps des vertèbres. D'autres environnent l'œsophage et l'aorte dans l'écartement postérieur des deux plèvres. D'autres enfin, au nombre de six ou dix, sont disséminées vaguement sur le trajet des artères thorachiques internes.

Glandes pulmonaires ou *bronchiques.* Nous avons parlé de ces glandes en traitant des poumons, et Bichat a donné lui-même sur elles plusieurs détails dans l'Anatomie générale. Placées principalement autour des bronches, elles se trouvent aussi répandues en plus ou moins grand nombre dans toute la substance du poumon. Leur couleur noirâtre les distingue de toutes celles des autres parties; mais cette couleur dont on ignore la cause n'est qu'accidentelle, quoique toute l'épaisseur de la glande la présente également. En effet chez l'enfant les glandes bronchiques ne sont point noirâtres et ressemblent à-peu-près pour la couleur à toutes les autres.

Le volume des glandes bronchiques est singulièrement variable. La plus grosse et la plus constante

occupe et remplit l'angle rentrant que forment les bronches en se réunissant à la trachée.

§ V. *Des Glandes des membres supérieurs.*

On les distingue en brachiales et axillaires.

Glandes brachiales. Il est rare de trouver des glandes à l'avant-bras : quelquefois cependant on en rencontre quelques petites sur le trajet des vaisseaux radiaux et cubitaux. Presque toujours on en trouve au moins une au pli du coude, près de la tubérosité humérale interne.

Le long du bras elles sont plus fréquentes : disséminées sur l'artère brachiale, elles forment une rangée plus ou moins continue jusqu'à l'aisselle.

Glandes axillaires. Celles-ci sont volumineuses et existent à tous les âges aussi-bien que les inguinales. Leur nombre est très-variable. Plongées dans le tissu cellulaire abondant du creux de l'aisselle : elles sont placées les unes sur le muscle grand dentelé, les autres autour des vaisseaux sanguins et spécialement sur la veine axillaire. Elles adhèrent quelquefois d'une manière assez intime aux parois de ces vaisseaux aussi-bien qu'aux nerfs du plexus brachial. Le groupe qu'elles forment se continue jusque sous le grand pectoral et sous la clavicule.

§ VI. *Des Glandes de la tête et du cou.*

L'intérieur du crâne ne contient aucune glande. L'extérieur de cette cavité n'en présente pas non plus, si ce n'est derrière l'oreille et vers la nuque où l'on

en trouve quelques-unes qui souvent même manquent absolument. Les principales appartiennent à la face.

Glandes de la face. Elles occupent presque toutes l'échancrure parotidienne, et sont disséminées sur la parotide jusqu'à l'angle de la mâchoire. Quelques-unes plus profondes sont placées sous l'arcade zygomatique ou derrière la parotide. D'autres sont répandues sur la surface externe des buccinateurs : celles-ci manquent très-souvent. Les plus constantes sont celles qui règnent le long de la base de la mâchoire inférieure et qui environnent les muscles digastriques dans leur portion antérieure.

Glandes du cou. Quelques glandes superficielles vaguement disséminées se trouvent entre le peaucier et les muscles plus profonds, sur le trajet de la veine jugulaire externe et de ses rameaux.

Mais les plus remarquables sont celles qui environnent la veine jugulaire et l'artère carotide primitive, au-dessous du sterno-mastoïdien. Elles sont extrêmement nombreuses surtout dans l'enfance : chacune a peu de volume; les plus supérieures sont situées au-dessous et derrière l'apophyse mastoïde; les autres forment une rangée considerable qui s'étend le long des vaisseaux jusqu'à l'ouverture supérieure du thorax. Ces glandes sont nommées ordinairement *jugulaires.* Elles se prolongent en arrière entre la colonne vertébrale et le pharynx sur lequel on en trouve quelques-unes.

D'autres glandes également nombreuses et assez grosses occupent l'espace triangulaire que forment le trapèze, le sterno-mastoïdien et la clavicule : elles

sont plongées dans un tissu cellulaire graisseux abondant, se continuent jusque sous l'aisselle; quelques-unes suivent le trajet des vaisseaux sanguins qui se distribuent à l'épaule.

La partie antérieure et moyenne du cou est presque entièrement dépourvue de glandes. Assez souvent on en remarque une ou deux de chaque côté sur les parties latérales du larynx.

DES ABSORBANS.

Nous avons dit que tous les absorbans peuvent se diviser en ceux qui se terminent au conduit thoracique, et ceux qui se terminent en partie dans ce conduit, en partie immédiatement dans les veines.

ARTICLE PREMIER.

Des Absorbans qui se terminent au conduit thoracique.

§Ier. *Des Absorbans des membres inférieurs.*

Ils se distinguent comme les veines en deux ordres. Les uns sont superficiels, les autres profonds : tous aboutissent aux glandes inguinales.

1°. *Absorbans superficiels.*

Ils occupent le tissu cellulaire sous-cutané, s'y trouvent plongés dans une graisse plus ou moins abondante, et y forment plusieurs réseaux superposés les

uns aux autres. De ces absorbans les uns appartiennent à la jambe, les autres à la cuisse.

Ceux de la jambe se distinguent en antérieurs et postérieurs. Les antérieurs naissent des parties supérieure, latérales et inférieure de chaque orteil par un grand nombre de ramuscules fréquemment anastomosés. Ils se portent sur le dos du pied qu'ils recouvrent entièrement en se réunissant en rameaux un peu plus volumineux auxquels viennent se rendre, soit en dedans, soit en dehors, plusieurs ramuscules anastomotiques des absorbans superficiels de la plante du pied. Ils remontent ensuite sur les parties antérieure et latérales de la jambe qu'ils embrassent en formant par leurs anastomoses nombreuses des aréoles de diverses figures. Le plus grand nombre se réunit à la partie interne en suivant en haut le trajet de la grande veine saphène. Près du genou on en voit plusieurs situés à la partie externe de la jambe, se détourner en arrière et gagner transversalement la partie interne; d'autres enfin placés de même en dehors se prolonger jusqu'au-dessus du genou et se porter transversalement au-dessus de la rotule à la partie interne de la cuisse où tous les absorbans antérieurs de la jambe viennent enfin se réunir.

Les absorbans postérieurs de la jambe nés de toute l'étendue de la plante du pied se portent en arrière et forment par leurs anastomoses des rameaux plus volumineux autour du tendon d'Achille. Ces rameaux remontent en enveloppant la partie postérieure de la jambe et communiquent de chaque côté avec les antérieurs. Près du genou les uns vont s'unir aux antérieurs externes de la jambe, les autres en beau-

coup plus grand nombre passent sur le jarret et se dirigent vers la partie interne de la cuisse. C'est le long de cette partie interne antérieure de la cuisse que tous les absorbans superficiels de la jambe rapprochés et sans cesse anastomosés remontent jusqu'aux glandes inguinales superficielles où ils finissent.

La plus grande partie des absorbans de la cuisse occupe la partie antérieure de ce membre. Ceux qui naissent de sa partie postérieure se contournent bientôt, soit en dedans, soit en dehors, pour se réunir aux premiers. Tous s'anastomosent enfin avec les absorbans superficiels de la jambe, et vont se terminer aux mêmes glandes.

Les glandes inguinales sont aussi le point central de réunion des absorbans superficiels des fesses, du périné, des lombes et de la moitié sous-ombilicale des parois de l'abdomen.

Ceux des fesses plongés dans une graisse abondante communiquent fréquemment ensemble d'un côté à l'autre. Ils se contournent, les uns à la partie externe, les autres à la partie interne de la cuisse et se réunissent soit aux absorbans de ce membre, soit à ceux du périné. Quelques-uns remontent vers la crête iliaque en s'anastomosant avec les absorbans superficiels lombaires.

Ceux du périné n'ont rien de remarquable. Ils se confondent bientôt avec les absorbans internes de la cuisse.

Ceux des lombes nés près de la colonne vertébrale et communiquant entre eux d'un côté à l'autre se dirigent en dehors et en bas au-dessus de la crête

iliaque, en se contournant en devant et finissent aux glandes inguinales. Ils communiquent souvent dans leur trajet, en haut avec les dorsaux superficiels inférieurs, en bas avec les absorbans des fesses et de la cuisse.

Ceux de la moitié sous-ombilicale des parois de l'abdomen s'unissent fréquemment dans leurs origines au niveau de l'ombilic avec les absorbans qui partent du même endroit pour aller supérieurement aux glandes axillaires. Anastomosés entre eux au devant de la ligne blanche, ils recouvrent toute la largeur de l'abdomen par un vaste réseau, et descendent en se réduisant à un petit nombre de troncs plus volumineux jusqu'aux glandes inguinales où ils finissent.

C'est encore aux glandes inguinales que viennent aboutir les absorbans superficiels des parties génitales externes. Nous les réunissons à ceux des membres inférieurs pour ne pas trop multiplier les subdivisions.

De ces absorbans les uns viennent du scrotum, les autres de la verge. Ceux du scrotum, très-nombreux et anastomosés ensemble au niveau de la cloison du dartos, remontent de chaque côté à la partie interne de la cuisse en communiquant et se confondant à leur terminaison avec ceux de la verge et du périné.

Les absorbans superficiels de la verge forment pour l'ordinaire deux faisceaux distincts sur les parties latérales de cet organe, quoique leurs origines immédiates soient fort irrégulières. Chaque faisceau dirigé en arrière s'épanouit beaucoup par les divi-

sions des ramuscules qui le composent et qui se confondent enfin avec ceux de la cuisse pour aller aux glandes. On voit ordinairement un seul tronc suivre pendant quelque temps le milieu de la face dorsale de la verge, et bientôt se diviser en deux rameaux qui, subdivisés eux-mêmes, s'unissent aux autres et se terminent comme eux. Il en est de même chez la femme pour les absorbans superficiels qui naissent, soit du clitoris, soit des grandes lèvres.

Les absorbans superficiels des membres inférieurs et des organes génitaux communiquent sans cesse dans leur trajet avec les profonds par une foule de rameaux.

2°. *Absorbans profonds.*

Ils suivent tous le trajet des vaisseaux sanguins, et forment quatre divisions distinctes qui accompagnent la veine saphène externe, l'artère tibiale antérieure, la tibiale postérieure et la péronière.

Deux troncs absorbans pour l'ordinaire suivent la saphène externe. Ils résultent d'un grand nombre de rameaux nés de la partie externe du pied, soit à la région dorsale, soit à la plantaire. Couverts dans tout leur trajet par l'aponévrose du membre inférieur, ils se dirigent en haut le long du bord externe du tendon d'Achille, puis derrière et entre les muscles jumeaux en recevant de ces parties des rameaux multipliés, gagnent l'espace poplité et traversent une des glandes que cet espace présente. Ils se portent ensuite aux glandes plus profondes du même endroit et s'y unissent aux autres absorbans profonds. Quel-

quefois un des deux en sortant de cette glande remonte le long des vaisseaux fémoraux jusque vers le milieu de la cuisse, là traverse l'aponévrose et s'unit aux superficiels.

Deux troncs aussi suivent l'artère tibiale antérieure. L'un naît profondément à la plante du pied par beaucoup de rameaux qui environnent l'arcade plantaire. Il sort sur le dos du pied avec l'artère pédieuse, entre le premier et le second orteil d'où il reçoit plusieurs rameaux, remonte entre les muscles antérieurs de la jambe, et quelquefois rencontre vers l'extrémité supérieure du tibia une glande dans laquelle il s'enfonce. De cette glande partent ensuite un ou plusieurs vaisseaux qui traversent l'espace interosseux au-dessus du ligament et s'unissent aux absorbans tibiaux postérieurs et péroniers. Souvent cette glande manque, mais le tronc suit toujours le même trajet. L'autre tronc naît de la partie externe du dos du pied, remonte, et vers le tiers moyen de la jambe traverse le ligament interosseux pour s'unir aux absorbans péroniers. Quelquefois le second tronc manque, et alors les rameaux qui ailleurs lui donnent naissance s'unissent au premier tronc.

Les absorbans tibiaux postérieurs naissent de toutes les parties musculeuses, tendineuses, ligamenteuses qui occupent profondément la plante du pied. Plusieurs troncs résultant de ces nombreuses origines remontent avec l'artère tibiale postérieure que souvent ils embrassent par les rameaux anastomotiques qu'ils s'envoient mutuellement. Plus ou moins subdivisés, ils communiquent avec les absorbans péroniers et finissent dans les glandes poplitées profondes.

Les absorbans péroniers nés de même de la plante du pied et de sa partie externe remontent le long de l'artère péronière qu'ils embrassent par plusieurs rameaux, se subdivisent et s'enfoncent dans les glandes poplitées où ils finissent.

C'est donc aux glandes poplitées que se réunissent tous les absorbans profonds de la jambe. Elles reçoivent aussi tous ceux qui appartiennent soit à l'espace poplité, soit à l'articulation du genou.

De ces glandes qui, réunies entre elles par des absorbans plus ou moins nombreux, forment un véritable plexus poplité, partent supérieurement deux, trois ou quatre troncs qui remontent le long des vaisseaux poplités, passent par l'ouverture du grand adducteur, et continuent à se porter supérieurement en suivant les mêmes vaisseaux devenus fémoraux. Subdivisés plus ou moins dans leur trajet, ils reçoivent tous les rameaux profonds de la cuisse, et se terminent enfin dans les glandes inguinales soit profondes, soit superficielles, quelques-uns même s'étendent jusqu'aux premières glandes iliaques placées sous l'arcade crurale.

Parmi les absorbans profonds des membres inférieurs, il faut ranger aussi ceux qui suivent le trajet des vaisseaux obturateurs, ischiatiques et fessiers, quoique ces absorbans ne se rendent pas aux glandes inguinales.

Les premiers appartiennent spécialement aux muscles adducteurs. Ils remontent avec les rameaux de l'artère obturatrice, passent par le trou ovale et vont se terminer à quelques-unes des glandes hypogastriques.

Les absorbans ischiatiques naissent des muscles carré, jumeaux, pyramidal, et en partie du grand fessier. Ils suivent les rameaux de l'artère ischiatique, rentrent dans le bassin et se terminent aux glandes inférieures de cette cavité. Souvent dans leur trajet ils traversent plusieurs autres glandes placées le long des vaisseaux sanguins.

Les absorbans fessiers naissent de toute l'épaisseur des muscles de même nom. Ils suivent les rameaux de l'artère fessière, entrent dans le bassin par la grande échancrure sciatique, et se terminent, les uns directement aux glandes inférieures du bassin, les autres à quelques glandes placées autour des vaisseaux sanguins près de la grande échancrure. D'autres absorbans naissent aussi des muscles du périné, des graisses qui environnent le rectum, etc., et remontent dans le bassin le long des vaisseaux honteux internes pour se confondre avec les précédens dans une même terminaison.

Tous les absorbans profonds se trouvent sur les parties latérales des vaisseaux sanguins qu'ils embrassent fréquemment par des rameaux anastomotiques en formant autour d'eux des plexus plus ou moins compliqués.

§ II. *Des Plexus inguinal, iliaque externe et hypogastrique.*

Les glandes inguinales sont, comme nous l'avons vu ci-devant, distinguées en superficielles et profondes selon leur rapport avec l'aponévrose fémorale. On doit ranger parmi elles trois glandes placées sous

l'arcade crurale et occupant l'une la partie antérieure, les autres les côtés des vaisseaux fémoraux.

C'est à ces glandes que se terminent presque tous les absorbans des membres inférieurs. Chacune d'elles donne naissance à de nouveaux absorbans qui vont aux glandes voisines, en sorte que toutes communiquent ensemble, et forment ainsi par leur réunion avec les absorbans qu'elles reçoivent ou qu'elles s'envoient un plexus nommé *inguinal lymphatique*. Ce plexus qui, comme l'on voit, finit à l'entrée du bassin, est la source d'un autre ordre d'absorbans très-nombreux qui, entrecroisés ensemble continuellement, forment un nouveau plexus nommé *iliaque externe*. Celui ci embrasse les vaisseaux iliaques et se trouve principalement placé entre ces vaisseaux et le muscle psoas. Il remonte ainsi jusque sur les côtés de la dernière vertèbre lombaire, souvent interrompu dans ce trajet par plusieurs glandes.

Près de la dernière vertèbre lombaire, le plexus iliaque externe se réunit au *plexus absorbant hypogastrique*. Celui-ci, placé sur les côtes de l'excavation du bassin, résulte en partie des absorbans obturateurs, ischiatiques, fessiers, etc. dont nous avons déjà parlé, en partie des absorbans uterins, vésicaux, sacrés, etc. qui nous restent à décrire. Ces vaisseaux entrecroisés sont interrompus de temps en temps par un grand nombre de glandes irrégulièrement disséminées, mais ordinairement voisines des vaisseaux sanguins que le plexus recouvre et embrasse. Au-devant du sacrum le plexus hypogastrique communique et se confond avec celui du côte opposé.

Après avoir reçu le plexus hypogastrique, le plexus

iliaque externe remonte sur les côtés de la colonne vertébrale, au-devant de laquelle il communique avec le plexus iliaque externe opposé par un grand nombre de rameaux qui enveloppent l'aorte et la veine cave. Les vaisseaux de l'un et de l'autre plexus se terminent en même temps dans les glandes lombaires d'où partent, comme nous le verrons plus tard, les premières racines immédiates du conduit thorachique.

§ III. *Des Absorbans des parois du bassin et de l'abdomen.*

Ils suivent tous plus ou moins exactement le trajet des vaisseaux sanguins et peuvent être nommés de même.

Parmi ceux des parois du bassin, nous ne remarquerons que les iléo-lombaires et les sacrés. Ceux des parois abdominales sont les épigastriques, les circonflexes iliaques et les lombaires.

Les iléo-lombaires naissent de toute l'étendue du muscle iliaque et de l'os subjacent. Réduits à deux troncs, ils passent transversalement sous le psoas qui leur fournit de nouveaux rameaux. Puis ils se subdivisent, et finissent soit à des glandes lymphatiques placées près de la symphyse sacro-iliaque, soit dans les plexus iliaque externe et hypogastrique.

Les sacrés naissent du tissu graisseux qui environne le rectum, des nerfs sacrés, des muscles pyramidaux et de l'os sacrum lui-même. Plusieurs partent de l'intérieur du canal sacré et sortent par les trous antérieurs. Tous se terminent soit dans les plexus hypogastriques, soit en haut dans les plexus lombaires.

Les autres absorbans des parois du bassin se réunissent aux ischiatiques, fessiers, etc., décrits à l'occasion des absorbans des membres inférieurs.

Les épigastriques naissent des tégumens et de l'aponévrose commune des muscles abdominaux, traversent de dehors en dedans cette aponévrose, et s'enfoncent dans les muscles droits dont ils reçoivent les rameaux aussi-bien que ceux de la partie antérieure des muscles obliques et transverses. Plusieurs troncs résultant de tous ces rameaux réunis embrassent les vaisseaux sanguins épigastriques, descendent avec eux en se subdivisant et en traversant plusieurs petites glandes jusque auprès de l'arcade crurale. Là ils se terminent aux trois glandes qui environnent l'artère iliaque externe et qui, comme nous l'avons dit, appartiennent au plexus inguinal.

Les épigastriques reçoivent dans leur trajet plusieurs absorbans de la partie antérieure du péritoine. Ils communiquent en haut avec les thorachiques internes, en dehors avec les lombaires.

Les circonflexes iliaques naissent en partie des tégumens qui recouvrent les côtés de l'abdomen. Ceux-ci traversent successivement l'épaisseur des muscles obliques et transverse d'où partent d'autres rameaux beaucoup plus multipliés. Tous se dirigent obliquement en bas et en devant vers la crête iliaque, contournent cette crête en suivant le trajet de l'artère dont ils prennent le nom, et se dirigeant en dedans vont enfin se terminer à une des glandes de l'arcade crurale. Dans leur trajet ils reçoivent plusieurs rameaux nés du muscle iliaque et du péritoine.

Les lombaires naissent en très-grand nombre

du muscle quarré, de la partie postérieure des muscles obliques et transverse, enfin de l'intérieur même du canal vertébral. Réduits à un certain nombre de troncs ils suivent le trajet des artères lombaires, passent pour la plupart entre le psoas et le quarré en traversant plusieurs glandes situées entre les apophyses transverses, et parviennent enfin sur les côtés du corps des vertèbres. Là, subdivisés et entrecroisés, ils se terminent, soit en s'enfonçant dans les glandes lombaires, soit en s'anastomosant avec le plexus iliaque externe. Leurs anastomoses mutuelles constituent le *plexus lombaire* qui communique au-devant de la colonne vertébrale avec celui du côté opposé par un très-grand nombre de rameaux.

§ IV. *Des Absorbans des organes génitaux et urinaires.*

1°. *Absorbans des organes génitaux.*

Nous avons déjà vu que les absorbans superficiels des organes génitaux externes chez l'homme et chez la femme se rendent au plexus inguinal et se confondent avec ceux des membres inférieurs.

Les absorbans profonds de la verge suivent le trajet des vaisseaux sanguins, rentrent dans le bassin le long des branches de l'artère honteuse interne et vont se jeter dans le plexus hypogastrique. Il en est de même chez la femme pour les absorbans profonds du clitoris. Quelques-uns de ceux du scrotum se confondent avec les absorbans du testicule et en suivent la disposition. De même chez la femme plu-

sieurs absorbans nés du contour de l'ouverture du vagin remontent le long du ligament rond, et pénétrant par l'anneau inguinal vont se réunir aux absorbans de la matrice.

Les absorbans du testicule sont extrêmement nombreux. Les uns naissent de la tunique vaginale et de l'albuginée qu'ils couvrent entièrement, remontent vers le cordon spermatique et se réunissent aux suivans. Les autres, distincts des premiers, naissent de la substance propre du testicule et de l'épididyme. Réunis tous à la partie supérieure de l'organe et réduits à un nombre de troncs qui varie de six à douze, ils remontent le long du cordon en formant entre eux peu d'anastomoses, passent par l'anneau inguinal et, après avoir formé plusieurs courbures, suivent la plupart le trajet de l'artère spermatique pour se terminer dans les glandes lombaires en se confondant avec les absorbans des reins et en communiquant avec ceux du côté opposé. Les absorbans du testicule ont quelquefois un volume très-considérable.

Les absorbans de la prostate et des vésicules séminales n'ont rien de bien remarquable. Ils se confondent en grande partie avec les absorbans vésicaux et se jettent dans le plexus hypogastrique.

Les absorbans de la matrice sont extrêmement nombreux, et cet organe en est tellement recouvert surtout pendant la gestation qu'il semble en être entièrement formé; ils naissent soit de sa superficie, soit de son tissu intime. Ceux qui appartiennent au col de la matrice se réunissent à ceux qui partent en très-grand nombre des parties latérales du vagin et

se jettent dans le plexus hypogastrique. Ceux qui viennent du corps se prolongent sur le ligament large, s'unissent aux absorbans multipliés qui environnent l'ovaire en forme de plexus remontent avec eux le long des vaisseaux spermatiques et finissent dans le plexus lombaire en s'anastomosant avec les absorbans rénaux. Plusieurs cependant se perdent dans le plexus iliaque externe.

2°. *Absorbans des organes urinaires.*

Les absorbans de la vessie nés dans toute l'étendue de cet organe suivent en général les vaisseaux sanguins. Ils traversent plusieurs petites glandes situées sur le trajet des artères ombilicales. Tous se jettent enfin dans le plexus hypogastrique.

Les absorbans des reins se distinguent en superficiels et profonds. Parmi les superficiels ceux qui sont les plus rapprochés de la scissure du rein s'anastomosent aussitôt en cet endroit avec les profonds. Les autres nés sur toute la surface de l'organe se réduisent bientôt à un certain nombre de troncs plus ou moins volumineux qui se prolongent dans le tissu du rein et communiquent de même avec les profonds.

Les absorbans profonds naissent de toutes parts des substances corticale et tubuleuse, des calices, du bassinet. Réduits à un nombre variable de troncs qui suivent pour l'ordinaire les vaisseaux sanguins, ils sortent du rein par sa scissure en se réunissant aux absorbans superficiels et vont sur les côtés de l'aorte se jeter dans le plexus lombaire en se con-

fondant avec ceux des organes génitaux, etc. Quelquefois on voit deux ou trois de ces troncs remonter vers le diaphragme et s'ouvrir immédiatement dans le conduit thorachique.

On trouve aussi des absorbans sur tout le trajet des uretères. Ils embrassent les conduits et communiquent en bas avec ceux de la vessie, en haut avec ceux des reins.

Les absorbans des capsules surrénales naissent de l'extérieur et du tissu intime de ces organes en s'anastomosant fréquemment ensemble. Plusieurs s'unissent aux absorbans rénaux. Ceux de la capsule droite vont aboutir à quelques glandes situées autour de la veine cave au-dessous du foie, ou se confondent avec les absorbans du foie pour se jeter comme eux dans le conduit thorachique. Ceux de la capsule gauche se rendent à des glandes placées sur l'appendice diaphragmatique correspondante et s'y confondent avec plusieurs absorbans du foie, de la rate et des intestins.

§ V. *Des Absorbans des viscères abdominaux.*

Nous comprenons sous cette division les absorbans des intestins, de l'estomac, du pancréas, de la rate et du foie.

1°. *Absorbans des intestins.*

Ceux-ci plus anciennement connus que ceux des autres parties sont ordinairement nommés *vais-*

sceaux lactés ou *chylifères*, parce qu'un grand nombre d'entre eux a pour usage de transmettre dans le conduit thorachique le chyle, produit de la digestion. Cette espèce d'absorption diffère entièrement de celle qui s'opère dans le tissu intime des organes et qui a pour fin unique le renouvellement de ce tissu. L'une et l'autre ne se font point à la même époque, ou du moins ne sont point liées au même ordre de phénomènes, puisque l'absorption chyleuse succède au travail digestif, et que l'absorption organique fait partie de la nutrition immédiate. Mais l'absorption organique a lieu dans les intestins aussi-bien que l'absorption chyleuse, puisque les intestins sont soumis aux lois de la nutrition immédiate comme les autres organes.

La physiologie voit donc dans les intestins deux ordres d'absorbans tout-à-fait distincts. Les uns naissent de la surface interne de ces organes par des embouchures béantes destinées à recevoir le fluide digestif : ce sont les absorbans chyleux. Les autres naissent dans le tissu même des parois intestinales et se comportent comme ceux que nous avons examinés jusqu'ici : ce sont les absorbans organiques. Il seroit difficile d'injecter les absorbans chyleux par les procédés de l'art, et pour les reconnoître, le meilleur moyen est de saisir sur un animal vivant l'époque de la digestion pendant laquelle ces vaisseaux sont en exercice. Remplis alors par le chyle ils deviennent fort apparens.

Mais en faisant abstraction des considérations physiologiques, l'anatomie ne trouve entre les deux ordres d'absorbans dont il s'agit aucune différence

essentielle. Les uns et les autres en effet mêlés et confondus ensemble au-delà de leurs origines se comportent de la même manière, suivent le même trajet, aboutissent au même terme. On ne doit donc point les distinguer dans les détails purement descriptifs qui nous occupent.

On voit aussi que le nom de *lactés* ou de *chylifères* ne convient pas à tous les absorbans intestinaux, qui doivent ici être tous réunis sous une dénomination générique.

Ces absorbans, quelque part qu'on les examine dans le conduit intestinal, peuvent se diviser en superficiels et profonds. Les superficiels situés entre les membranes et spécialement au-dessous de la péritoneale parcourent un trajet assez long suivant la longueur du tube intestinal en se croisant les uns les autres et en s'anastomosant soit entre eux, soit avec les profonds. Puis ils se recourbent du côté du mesentère ou des méso-colons, s'engagent entre les lames de ces replis et se subdivisent en communiquant avec les profonds, puis traversent les glandes et se portent au conduit thorachique.

Les profonds nés par des ouvertures béantes dans la cavité intestinale ou par des ramuscules dans l'épaisseur des membranes, contournent l'intestin dans sa largeur en suivant diverses directions et en accompagnant pour l'ordinaire les vaisseaux sanguins, puis ils gagnent le mésentère où ils se comportent comme les précédens.

Telle est la disposition générale des absorbans intestinaux. Plus abondans à l'intestin grêle que partout ailleurs ils forment dans le mésentère par leurs

subdivisions une foule de plexus, traversent successivement les glandes multipliées de cette partie et se réduisent près du pancréas à un certain nombre de troncs qui se confondent avec les absorbans de l'estomac, de la rate et du foie.

Les absorbans du cœcum, du colon lombaire droit et du colon transverse se comportent de la même manière entre les lames du méso-colon, et se confondent dans leur terminaison avec ceux de l'intestin grêle.

Les absorbans du colon lombaire gauche et iliaque aussi-bien que ceux du rectum vont aboutir soit aux glandes qui se trouvent au-devant de la colonne vertébrale et de l'aorte, soit à celles qui occupent l'intervalle des deux lames du méso-rectum. Ils se perdent dans les plexus lombaires et hypogastriques.

2°. *Absorbans de l'estomac.*

Ils occupent pour la plupart l'intervalle des tuniques péritonéale et musculeuse. On les distingue en trois ordres sur l'une et l'autre face de l'estomac. Les uns appartiennent à la grosse extrémité de cet organe, se dirigent à gauche et vont en suivant les vaisseaux courts se réunir aux absorbans de la rate. Les autres se portent vers la petite courbure et aboutissent aux glandes que cette courbure présente. Presque tous ceux-ci, même les plus rapprochés du pylore dans leur origine, se dirigent obliquement à gauche et se réunissent en grand nombre près du côté droit du cardia. Après avoir traversé les glandes de cette partie, ils se recourbent

sur eux-mêmes, pour se porter à droite le long de la courbure et du petit épiploon, traversent encore successivement plusieurs glandes, et parvenus au niveau du lobule de Spigel, ils se rapprochent des absorbans hépatiques inférieurs. Réunis à eux ils descendent derrière le pancréas et se confondent enfin entièrement avec les absorbans spléniques et intestinaux dans un plexus commun qui concourt à former les origines du conduit thorachique.

Le troisième ordre des absorbans de l'estomac comprend ceux qui suivant une direction inverse à celle des précédens, se rendent aux glandes situées le long de la grande courbure, autour des vaisseaux gastriques inférieurs. Presque tous se dirigent plus ou moins obliquement à droite, et tous, après avoir traversé plusieurs glandes, se réunissent vers le pylore en formant divers plexus. Réduits à des troncs plus volumineux ils s'enfoncent entre le pylore et le pancréas, se recourbent, et se portent à gauche en suivant quelque temps la partie antérieure de ce dernier organe. Près du lobule de Spigel ils remontent sur le pancréas, le contournent et descendent derrière lui pour aller traverser les glandes situées autour des artères cœliaques et mésentérique supérieure et se confondre avec les absorbans intestinaux.

On doit comprendre dans les absorbans de l'estomac ceux qui appartiennent aux épiploons. Tous en effet se réunissent et se confondent près des courbures avec ceux dont nous venons de parler et se terminent de même.

3°. *Absorbans de la rate et du pancréas.*

On distingue les absorbans de la rate en superficiels et profonds. Les premiers occupent principalement la face convexe de cet organe. Contournés sur les deux faces planes, ils se réunissent aux profonds au niveau de la scissure. Plusieurs pénètrent dans la substance de l'organe peu après leur origine et se confondent de même avec les profonds. Ces derniers nés de toutes les parties du tissu de la rate accompagnent les vaisseaux sanguins, sortent avec eux par la scissure, traversent plusieurs glandes placées sur ces vaisseaux, et forment différens plexus pour se réunir enfin derrière le pancréas avec les absorbans stomachiques, intestinaux, hépatiques, etc.

Les absorbans du pancréas n'ont rien de fort remarquable. Nés dans la substance de l'organe ils suivent ses vaisseaux sanguins et finissent presque aussitôt dans les plexus stomachiques et spléniques.

4°. *Absorbans du foie.*

Il n'est aucun organe qui contienne plus d'absorbans que le foie. On les prépare assez facilement parce qu'une pression modérée fait passer le mercure des troncs dans les rameaux, en sorte que souvent il suffit d'injecter un seul tronc pour remplir tout le système absorbant de l'organe, pourvu qu'il ne se fasse point de rupture, ce qui est très-ordinaire. Ceci prouve que les valvules ou n'existent pas dans les absorbans du foie, ou du moins y sont peu mul-

tipliées. Quand l'injection a parfaitement réussi, le foie vu à quelque distance semble recouvert d'une lame argentine continue.

On distingue les absorbans du foie en superficiels et profonds. Les superficiels appartiennent ou à la face diaphragmatique ou à la face intestinale.

Les absorbans superficiels de la face diaphragmatique du foie se divisent en ceux du lobe droit et ceux du lobe gauche.

1°. Ceux du lobe droit forment quatre faisceaux différens.

Le premier faisceau se compose des absorbans qui naissent dans l'intervalle des feuillets du ligament suspensoire. On peut donc les regarder comme appartenant en partie au lobe gauche. Ils remontent dans l'épaisseur du ligament, et se réduisent à un ou deux troncs, qui entrent dans le thorax par l'espace triangulaire que laisse le diaphragme derrière l'appendice sternale. Ils traversent une ou deux des glandes médiastines, en sortent en se subdivisant, et se réunissent à plusieurs des absorbans thorachiques, cardiaques, péricardins; puis remontent avec eux jusqu'auprès de la veine jugulaire interne gauche en traversant plusieurs autres glandes, pour se terminer enfin dans le conduit thorachique près de son embouchure.

Le second faisceau résulte des absorbans qui naissent sur la partie droite du même lobe près de sa circonférence. Ils se portent entre les lames du ligament latéral droit du foie, et là se divisent en deux ordres. Les uns supérieurs, traversent le diaphragme, se placent entre ce muscle et la plèvre, se dirigent

à gauche en se subdivisant et en se réunissant ensuite, puis ils se recourbent en bas, passent par l'ouverture aortique du diaphragme ou par des écartemens particuliers de ses fibres, et revenus ainsi dans l'abdomen, vont se terminer aux glandes situées entre l'aorte et la veine cave en se confondant avec les absorbans stomachiques, rénaux, etc. Les inférieurs traversent aussi pour la plupart le diaphragme près de son attache aux dernières côtes, longent ces côtes jusqu'à leurs têtes, là traversent quelques glandes et se confondent avec les absorbans intercostaux pour se terminer dans le conduit thorachique. Quelques-uns ne traversent point le diaphragme, mais se dirigent à gauche et en bas pour se terminer près de la veine cave dans les plexus communs dont nous avons déjà parlé plusieurs fois.

Les absorbans qui forment le troisième faisceau naissent sur le milieu du lobe droit et gagnent la partie postérieure du foie. Réduits à un certain nombre de troncs, les uns s'unissent aux absorbans hépatiques déjà décrits, au moment où ceux-ci rentrent dans l'abdomen par l'ouverture aortique : les autres traversent le diaphragme, remontent entre l'aorte et l'œsophage, et réunis aux absorbans de ces parties finissent dans le conduit thorachique.

Les absorbans du quatrième faisceau naissent de la partie antérieure du lobe près du bord mince et de la scissure par laquelle s'introduit la veine ombilicale. Les uns remontent dans le ligament suspenseoire et s'unissent au premier faisceau. Les autres descendent dans la scissure du foie, communiquent avec les absorbans profonds de cet organe et vont

aboutir dans quelques glandes voisines du pylore en se confondant avec les stomachiques. Quelques-uns côtoient le bord mince du foie et vont à droite se réunir aux absorbans inférieurs du second faisceau.

2°. Les absorbans de la face supérieure du lobe gauche forment trois séries. La première comprend ceux qui, rapprochés du ligament suspenseoire, s'introduisent entre ses deux feuillets et s'unissent au premier faisceau des absorbans du lobe droit.

Les absorbans de la seconde série naissent de toute la surface du lobe, se portent entre les lames du ligament latéral gauche et se divisent en supérieurs et inférieurs. Les supérieurs se contournent à droite et vont derrière l'estomac près de sa petite courbure, au-dessous du lobule de Spigel, traversent quelques glandes pour se confondre avec les stomachiques et avec les autres hépatiques. Les inférieurs suivent à gauche la face concave du diaphragme, se subdivisent, et vers la grosse extrémité de l'estomac s'unissent à quelques-uns des absorbans spléniques pour se terminer comme eux dans les plexus qui entourent l'aorte et la veine cave.

Les absorbans de la troisième série naissent de la partie la plus reculée du lobe entre le ligament suspenseoire et le ligament latéral gauche. Réduits à un petit nombre de troncs ils descendent sur le côté droit de l'œsophage et se perdent dans les glandes de la petite courbure de l'estomac.

Les absorbans superficiels de la face intestinale du foie se divisent aussi en ceux du lobe droit et ceux du lobe gauche.

1°. Ceux du lobe droit forment trois séries. La

première comprend tous les absorbans qui naissent à droite entre la circonférence du foie et la vésicule biliaire. Réunis à quelques-uns de ceux de la face convexe et à quelques profonds sortis du foie avec la veine porte, ils se dirigent en bas et à gauche pour se terminer aux glandes qui environnent la veine cave et l'aorte.

La seconde série renferme ceux qui naissent soit sur la vésicule, soit entre son fond et le bord mince du foie. Ils reçoivent plusieurs rameaux anastomotiques de la face convexe. Réunis en troncs plus volumineux ils embrassent la vésicule en s'entrecroisant mutuellement, gagnent le col de ce réservoir membraneux, et se réduisent à deux ou trois troncs qui se terminent à des glandes situées au-dessus de l'intestin duodénum.

La troisième série est formée par les absorbans qui naissent entre la vésicule et le sillon longitudinal. Ils se réduisent à un tronc qui se porte sur la vésicule, s'unit aux absorbans de cette partie et se termine comme eux.

2°. Les absorbans inférieurs du lobe gauche n'ont rien de fort remarquable. Nés de toute l'étendue de ce lobe et de celui de Spigel, ils se confondent bientôt avec les précédens et avec les profonds.

Outre les absorbans dont nous avons parlé, on en trouve beaucoup d'autres qui, nés de l'extérieur du foie, s'enfoncent aussitôt dans la substance de cet organe et s'unissent aux profonds. Ils sont très-nombreux, surtout à la face intestinale. Tous les absorbans superficiels communiquent aussi avec les profonds par une multitude de ramuscules.

Les absorbans profonds naissent dans toute l'étendue du tissu du foie. Leur nombre est par conséquent beaucoup plus considérable que celui des absorbans superficiels. Ils accompagnent les vaisseaux sanguins et les conduits biliaires en formant un grand nombre de plexus, et sortent du foie avec ces vaisseaux. Réunis en grand nombre autour du lobule de Spigel, ils s'engagent entre les lames du petit épiploon, gagnent, presque tous, les glandes qui occupent la petite courbure de l'estomac en se confondant avec les absorbans stomachiques. D'autres descendent derrière l'estomac, au-devant du pancréas et du duodénum, et se perdent dans les plexus absorbans de ces parties. D'autres enfin suivent le trajet de la veine porte, et vont se réunir aux absorbans intestinaux et spléniques.

On voit d'après ces détails que tous les absorbans du foie ne concourent point à donner naissance au conduit thorachique, et que plusieurs vont aboutir à ce vaisseau pendant qu'il traverse le thorax, quelques-uns même près de son embouchure dans la sous-clavière. Cependant, comme le plus grand nombre des absorbans hépatiques se réunit aux plexus intestinaux, stomachiques, etc., nous avons pensé que leur description devoit être jointe à celle des autres absorbans abdominaux.

ARTICLE DEUXIÈME.

Du Conduit thorachique.

On peut regarder presque tous les absorbans que nous avons décrits jusqu'ici comme les origines éloi-

gnées du conduit thorachique. Ses origines immédiates ont lieu par cinq ou six troncs plus ou moins volumineux qui sont la réunion des plexus absorbans de l'abdomen. Le nombre, le volume et l'étendue de ces troncs varient prodigieusement. Presque tous partent des plexus lombaires auxquels aboutissent la plupart des absorbans de l'abdomen, du bassin et des membres inférieurs.

Pour l'ordinaire, le plus considérable de ces troncs commence vers la quatrième ou la troisième vertèbre lombaire, et résulte de plusieurs rameaux naissant des glandes voisines. Il remonte au-devant du corps de ces vertèbres jusque auprès de l'ouverture aortique du diaphragme. Les autres troncs nés un peu plus haut que le premier vont se réunir à lui au niveau des seconde et première vertèbres lombaires, de la dernière dorsale ou dans l'ouverture aortique elle-même. Souvent un autre tronc considérable résultant de plusieurs absorbans intercostaux, descend dans le thorax au côté gauche du conduit thorachique, passe par l'ouverture diaphragmatique, et se recourbe enfin vers la douzième vertèbre dorsale pour se réunir aux autres troncs dont nous venons de parler.

Ainsi se forme le conduit thorachique qui, selon les uns, commence vers la troisième vertèbre lombaire, et, selon les autres, à quelque distance seulement de l'ouverture aortique du diaphragme. Ces derniers sont mieux fondés, puisque c'est seulement à la partie supérieure de l'abdomen que tous les troncs absorbans principaux se trouvent réunis en un seul.

Placé à son origine derrière l'aorte, à la partie

antérieure et un peu latérale gauche du corps de la douzième vertèbre dorsale ou de la première lombaire, le conduit thorachique remonte et traverse l'ouverture aortique pour pénétrer dans le thorax. L'aorte se déjetant bientôt un peu à gauche, il se trouve entre elle et la veine azygos, et continue son trajet dans cette position jusqu'à la sixième, la cinquième ou la quatrième vertèbre dorsale. Là il prend une direction oblique à gauche, passe sous la crosse de l'aorte et remonte jusque au-dessous de l'artère sous-clavière gauche. Placé ensuite à droite de cette artère et sur le muscle long du cou, il se porte jusqu'à la septième ou sixième vertèbre cervicale, là se recourbe sur lui-même, s'engage derrière la veine jugulaire interne, et se dirige en bas pour aller s'ouvrir enfin dans la partie postérieure de la veine sous-clavière gauche à l'endroit où celle-ci donne naissance à la jugulaire interne. Nous supposons ici que le conduit thorachique se termine par un seul tronc. Son embouchure présente deux valvules semi-lunaires opposées l'une à l'autre, dont l'usage est d'empêcher que le sang de la veine ne passe dans le conduit.

Le conduit thorachique n'a pas dans tous les points de son étendue un calibre égal. A son origine et près de son passage par le diaphragme, il paroît quelquefois fort dilaté, et c'est cette dilatation que l'on a nommée *réservoir du chyle, cisterna chyli.* Elle n'est cependant point constante. Souvent même cette portion dilatée n'est autre chose que la réunion de plusieurs troncs absorbans encore distincts, mais entourés par une enveloppe celluleuse commune, et faciles à séparer par la dissection. Immédiatement

après son entrée dans le thorax, le conduit se rétrécit un peu jusqu'à la sixième vertèbre dorsale. Là il se dilate de nouveau en se portant derrière l'aorte. Enfin son calibre devient beaucoup plus considérable immédiatement avant son embouchure dans la veine sous-clavière.

Ordinairement droit dans la plus grande partie de son étendue, le conduit forme cependant toujours quelques légères flexuosités. Elles sont quelquefois très-marquées.

Il est très-fréquent de voir le conduit thorachique se diviser pendant une partie de son trajet en plusieurs branches qui se réunissent ensuite de nouveau en un seul tronc. C'est ce qu'on observe presque toujours entre les cinquième et quatrième vertèbres dorsales. L'espace qui reste entre ces branches écartées a été désigné par Haller sous le nom d'*île*, *insula*. Souvent aussi le conduit thorachique se divise en deux ou trois troncs à sa terminaison. Alors un de ces troncs seulement s'ouvre dans l'angle de réunion des veines sous-clavière et jugulaire interne; les autres aboutissent dans la jugulaire interne, et l'embouchure de chacun est garnie d'une valvule.

Des Absorbans que le conduit thorachique reçoit pendant son trajet dans le thorax.

Plusieurs absorbans partis des plexus abdominaux s'introduisent dans le thorax avec l'aorte, et vont aboutir au conduit thorachique à une plus ou moins grande distance. Il en est de même, comme nous l'avons vu, de plusieurs absorbans hépatiques.

Mais les vaisseaux les plus remarquables que reçoive le conduit thorachique dans son trajet, ce sont les *absorbans intercostaux*. Leurs origines ont lieu non-seulement dans les muscles intercostaux, mais dans ceux qui recouvrent l'extérieur du thorax. En parcourant les espaces intercostaux, ils traversent plusieurs glandes répandues sur les muscles soit externes, soit internes qui remplissent ces espaces. Parvenus sur les côtés de la colonne vertébrale, ils se réunissent aux absorbans qui viennent soit du canal de l'épine, soit des muscles du dos, et traversent avec eux les glandes placées autour des têtes des côtes. Sortis de ces glandes, ils se portent dans les gouttières des vertèbres en formant divers plexus qui se réduisent enfin à un nombre variable de troncs. Ces troncs se dirigent obliquement en bas, et vont aboutir au conduit thorachique fort au-dessous de la vertèbre sur laquelle ils étoient placés. Ceux du côté droit passent devant ou derrière la veine azygos, et parcourent un trajet un peu plus long que les gauches, vu la position du conduit thorachique.

Plusieurs absorbans des espaces intercostaux supérieurs se réunissent aux absorbans pulmonaires et se terminent comme eux.

Il faut joindre aux absorbans intercostaux une foule de rameaux qui se réunissent à eux et qui viennent soit de l'extérieur de la plèvre, soit de l'épaisseur du diaphragme.

ARTICLE TROISIÈME.

Des Absorbans qui se terminent en partie dans le conduit thorachique, en partie dans les veines gauches ou droites par des troncs particuliers.

Ce sont les absorbans des poumons et des autres organes contenus dans le thorax, ceux des membres supérieurs, de la tête et du cou.

§ Ier. *Des Absorbans des poumons.*

On les distingue en superficiels et profonds.

Les superficiels placés sous la plèvre pulmonaire naissent ou de la plèvre elle-même par une foule d'orifices ouverts dans la cavité de cette membrane, ou sur le tissu du poumon par un grand nombre de ramuscules. Les premiers, destinés à reprendre le fluide séreux exhalé sur la plèvre, se trouvent souvent injectés par la seule introduction d'un fluide coloré dans le thorax; les seconds s'injectent à la manière ordinaire. Les uns et les autres se comportent de même. Ils recouvrent les poumons dans toute leur étendue par une multitude de rameaux entrecroisés et formant des aréoles de diverse figure que remplissent des ramuscules plus petits. Les troncs qui résultent enfin de la réunion de ces réseaux vasculaires suivent différentes directions. Les uns s'enfoncent entre les scissures des lobes et se rendent aux glandes qui occupent le fond de ces scissures;

les autres se contournent, soit en avant, soit en arrière, sur les bords de chaque poumon, parcourent sa face interne, et aboutissent aux glandes qui environnent la branche au niveau de son entrée dans l'organe.

Les profonds naissent de toutes les parties qui entrent dans la composition du poumon. Leurs troncs suivent les vaisseaux sanguins et les bronches qu'ils environnent en communiquant avec les superficiels par beaucoup de rameaux. Sortis du poumon, ils se réunissent entièrement aux superficiels dans les glandes bronchiques, d'où ils sortent ensuite en commun pour remonter le long des bronches jusqu'à la trachée. Là ils s'introduisent dans d'autres glandes, et spécialement dans celle qui occupe l'angle rentrant formé par la réunion des bronches et de la trachée.

De cette grosse glande il part en haut un grand nombre d'absorbans. Les uns remontent sur la trachée, traversent quelques glandes placées sur la partie droite de ce conduit, et ensuite se recourbent à droite en se réunissant en un seul tronc qui se porte derrière la veine jugulaire interne, gagne quelques-unes des glandes du cou, et se confondent avec les absorbans de cette partie pour se terminer comme eux dans les veines du côté droit. D'autres en grande quantité vont traverser quelques glandes situées au-devant de la trachée au-dessous de la thyroïde, se réduisent ensuite ordinairement à deux troncs qui se recourbent et se portent obliquement à gauche derriere la jugulaire interne, traversent encore quelques glandes, et enfin s'ouvrent tantôt dans le conduit thorachique, tantôt immédiatement dans les veines.

Plusieurs des absorbans pulmonaires se réunissent dans le thorax même aux absorbans intercostaux et œsophagiens dont ils suivent la disposition.

§ II. *Des Absorbans thorachiques internes, diaphragmatiques, péricardins, thymiques et cardiaques.*

Les absorbans thorachiques internes prennent leur nom des vaisseaux qu'ils accompagnent. Nés de la partie supérieure des muscles abdominaux et anastomosés en cet endroit avec les absorbans épigastriques, ils s'introduisent dans le thorax par l'ouverture étroite qui se trouve entre le diaphragme et l'appendice sternale. Ils remontent ensuite derrière et sur les côtés du sternum en suivant l'artère thorachique interne et traversant plusieurs glandes entre lesquelles ils forment divers plexus. Réunis successivement en branches plus volumineuses, ils se réduisent enfin du côté gauche à un seul tronc qui passe obliquement au-devant de la veine sous-clavière, remonte un peu, se jette dans les glandes inférieures du cou, et se confond ensuite par plusieurs rameaux avec les absorbans de cette partie pour se terminer comme eux dans le conduit thorachique. Du côté droit les absorbans thorachiques internes vont s'ouvrir séparément dans les veines sous-clavière et jugulaire interne.

Dans leur trajet ces absorbans reçoivent au travers des muscles intercostaux une grande partie de ceux qui appartiennent soit aux muscles, soit aux tégumens antérieurs du thorax.

Les absorbans du diaphragme se confondent en

partie avec les intercostaux, en partie avec les hépatiques et avec les autres absorbans abdominaux. Mais leurs troncs principaux occupent la face convexe du muscle et se trouvent entre lui et la plèvre. Plusieurs naissent de cette membrane et se remplissent des fluides colorés qu'on introduit dans le thorax. Ces troncs se dirigent d'arrière en avant en formant diverses aréoles par leurs anastomoses. Ils remontent dans la partie inférieure du médiastin, traversent plusieurs glandes qui s'y trouvent, et se réunissent aux absorbans thorachiques internes de l'un et de l'autre côtés pour se terminer comme eux.

Les absorbans du péricarde et du thymus peu remarquables parcourent le médiastin de bas en haut, traversent plusieurs glandes placées sur la veine cave supérieure et sur l'aorte, et se confondent ensuite soit avec les absorbans thorachiques internes, soit avec les pulmonaires.

Les absorbans du cœur suivent en général le trajet des vaisseaux sanguins. Souvent on réussit à les injecter, surtout sur les sujets maigres, en poussant un fluide coloré dans les artères cardiaques; le fluide passe incolore dans les absorbans. On parvient aussi à injecter immédiatement plusieurs de ceux-ci avec le mercure en les prenant près du sommet du cœur; mais on a beaucoup de peine à les poursuivre jusqu'à leur terme, parce qu'ils se rompent très-facilement lorsqu'ils sont parvenus sur l'aorte.

Les troncs principaux de ces absorbans occupent les bords du cœur et reçoivent en cet endroit les rameaux répandus sur les faces antérieure et postérieure. Les troncs placés sur le bord obtus, parvenus

à la base du cœur, s'enfoncent dans l'intervalle graisseux qui sépare l'oreillette et le ventricule gauches, là se divisent ordinairement en plusieurs rameaux qui remontent sur l'artère pulmonaire et sur l'aorte, en se réunissant à ceux qui règnent le long du bord mince. De cette réunion résulte un tronc plus volumineux qui se porte au-devant de l'aorte, sort du péricarde, et se divise en plusieurs rameaux pour traverser quelques glandes placées sur la courbure aortique et former entre elles différens plexus. Dans ces glandes les absorbans cardiaques se réunissent à plusieurs thymiques, péricardins, thorachiques internes gauches, vont avec eux traverser quelques glandes du cou, et se terminent enfin par plusieurs troncs soit dans le conduit thorachique, soit immédiatement dans les veines sous-clavière et jugulaire internes gauches.

Quelques-uns des absorbans cardiaques suivent les divisions de l'artère pulmonaire, traversent les glandes bronchiques voisines et se confondent avec les absorbans du poumon.

§ III. *Des Absorbans superficiels des membres supérieurs et de l'extérieur du tronc, terminés aux glandes axillaires.*

1° *Absorbans superficiels des membres supérieurs.*

Ils commencent sur les doigts où on les trouve très-nombreux, surtout à la région dorsale. Répandus sur toute cette région ils se réunissent principale-

ment sur les côtés de chaque doigt et gagnent le métacarpe, où, tantôt ils s'anastomosent de manière à former des troncs plus volumineux, tantôt ils continuent simplement leur trajet en s'entrecroisant sans communiquer ensemble. Le dos de la main est recouvert par ces absorbans qui gagnent ensuite la partie postérieure de l'avant-bras où ils paroissent beaucoup plus nombreux, soit parce qu'ils se subdivisent, soit parce qu'ils s'unissent à ceux qui naissent de cette partie elle-même. En remontant ensuite derrière l'avant-bras ils se dirigent un peu obliquement en dedans, et se contournent successivement sur le bord cubital du membre pour gagner sa région antérieure, à laquelle tous parviennent enfin auprès du coude.

Les absorbans antérieurs des doigts sont un peu moins nombreux. Réunis principalement aussi sur les côtés de chaque doigt ils communiquent fréquemment avec les absorbans postérieurs, gagnent ensuite la paume de la main, où souvent ceux des doigts index, médius et annulaire se réduisent à un seul tronc disposé en arcade à-peu-près comme les vaisseaux sanguins du même endroit. Les deux extrémités de ce tronc se continuent alors au-devant du ligament annulaire et gagnent l'avant-bras conjointement avec les absorbans du pouce et du petit doigt qui s'y rendent directement. Parvenus à la partie antérieure de l'avant-bras les absorbans augmentent en nombre parce qu'ils s'unissent soit à ceux qui naissent de cette partie, soit aux absorbans postérieurs qui viennent successivement les joindre. Dirigés presque verticalement en haut ils arrivent au

pli du coude où quelquefois ils rencontrent une ou deux glandes qu'ils traversent. Puis ils continuent à remonter au-devant du bras en se rapprochant de sa partie interne et se réunissant à tous les absorbans superficiels de ce membre. Enfin réduits à un petit nombre de troncs plus ou moins volumineux ils s'enfoncent dans le creux de l'aisselle le long des vaisseaux sanguins et se terminent aux glandes axillaires.

Quelques absorbans superficiels se comportent d'une manière un peu différente. Ils suivent la veine céphalique dans toute son étendue, passent avec elle entre le deltoïde et le grand pectoral, traversent de petites glandes placées au-dessous de la clavicule, remontent sur cet os en formant tantôt un plexus, tantôt un seul tronc et finissent dans les glandes inférieures latérales du cou en se confondant avec les absorbans de cette partie.

2°. *Absorbans superficiels du thorax et de la moitié sus-ombilicale des parois de l'abdomen.*

Nous avons vu que plusieurs de ces absorbans alloient se réunir aux absorbans lombaires, épigastriques, thorachiques internes, etc. Mais le plus grand nombre d'entre eux se rend aux glandes axillaires, et c'est de ces derniers qu'il s'agit maintenant.

Ceux de la partie antérieure de l'abdomen naissent au-devant de la ligne blanche et près de l'ombilic, communiquent en une foule d'endroits avec les absorbans sous-ombilicaux qui vont aux glandes inguinales. Dirigés obliquement en dehors et en haut

ils passent sur l'aponévrose abdominale, sur le muscle grand oblique, sur une partie du grand pectoral en s'approchant progressivement du creux de l'aisselle. Reduits enfin à un certain nombre de troncs ils se plongent dans le tissu cellulaire abondant de cette partie et finissent aux glandes.

Les absorbans superficiels du thorax naissent à la partie antérieure moyenne de cette cavité dans toute son étendue : quelques-uns même ont leurs premières radicules au-devant de la partie inférieure du cou. Dirigés plus ou moins obliquement, les uns de haut en bas, les autres de bas en haut, d'autres transversalement entre le grand pectoral et les tégumens, ils se portent tous en dehors, se contournent sur le bord inferieur du grand pectoral et parviennent au creux de l'aisselle dans lequel ils se terminent comme les précédens.

3°. *Absorbans superficiels du dos.*

Il faut y comprendre ceux de la partie postérieure du cou. Ces derniers, placés entre la peau et le trapèze, commencent par des rameaux ténus vers les apophyses épineuses cervicales et vers l'occiput. De là ils descendent en dehors en suivant la direction oblique des fibres du trapèze et en se réunissant successivement aux troncs plus volumineux, passent sur l'épine de l'omoplate et descendent sur la partie postérieure du deltoïde en se rapprochant du muscle brachial postérieur. Là, réunis à plusieurs absorbans superficiels du deltoïde ils se recourbent transversalement en dedans et vont aux glandes axillaires.

Tous les absorbans superficiels du dos ont les mêmes glandes axillaires pour terme commun, et s'y rendent en suivant des directions differentes, selon le point d'où ils partent. Les supérieurs, nés du trapèze et de la peau qui le recouvre, descendent obliquement en dehors, passent sur le muscle sous-épineux et y rencontrent quelques glandes qu'ils traversent, puis s'engagent entre le grand dorsal et le grand rond pour se rendre aux glandes axillaires, soit isolement, soit en se confondant avec les absorbans cervicaux. Les absorbans moyens du dos naissent de la peau, de l'extrémité du trapèze et de la partie supérieure du grand dorsal; ils suivent la direction transversale des fibres supérieures de ce dernier muscle et vont se réunir aux précédens en traversant aussi quelques-unes des glandes placées sur le sous-épineux. Les absorbans inférieurs nés sur toute l'étendue du grand dorsal, remontent en suivant ce muscle et vont près de son attache se joindre aux absorbans moyens. Plusieurs, et surtout les plus inferieurs, vont gagner la surface axillaire du grand dentelé et se réunissent aux absorbans profonds des parois du thorax.

§ IV. *Des Absorbans profonds des membres supérieurs, terminés aux glandes axillaires.*

Ils suivent tous le trajet des vaisseaux sanguins et peuvent être désignés par les mêmes noms. Nés de tout le contour des doigts, du dos et de la paume de la main, ils se partagent en deux faisceaux qui

accompagnent les artères radiale et cubitale et se trouvent plus ou moins profonds, selon que ces artères sont elles-mêmes plus ou moins enfoncées.

Nous n'insisterons pas sur la description particulière de ces vaisseaux dont la disposition est suffisamment connue par ce que nous venons de dire. Le faisceau radial commence par deux divisions dont l'une occupe la partie externe postérieure de la main, l'autre enveloppe l'arcade palmaire profonde au-devant des interosseux palmaires. Puis il remonte sur l'avant-bras en embrassant l'artère radiale, traverse quelquefois une glande placée vers le milieu du membre et parvient au pli du coude. Le faisceau cubital commence à la main sous l'aponévrose palmaire avec l'arcade palmaire superficielle, suit l'artère cubitale en communiquant sans cesse par ses rameaux avec le faisceau radial. Vers le pli du coude, les deux faisceaux se réunissent, soit entre eux soit avec un troisième qui a accompagné dans tout son trajet l'artère interosseuse. Là les absorbans profonds se réduisent à un certain nombre de troncs qui tantôt traversent une ou deux glandes placées au pli du coude, tantôt lorsque ces glandes manquent, se portent directement au bras. Ils suivent l'artère brachiale, reçoivent dans leur trajet tous les absorbans profonds des muscles qui entourent l'humérus et se réunissent enfin dans les glandes axillaires à tous ceux dont nous avons parlé précédemment.

On peut ranger parmi les absorbans profonds du membre supérieur ceux qui viennent de l'épaisseur des muscles qui recouvrent le thorax sur ses parties latérales. Ces absorbans, nés des grand et petit pec-

toraux, se dirigent plus ou moins obliquement sur la surface externe du grand dentelé qui leur fournit de nouveaux rameaux, et vont aux glandes axillaires.

§ V. *Des Absorbans qui partent des glandes axillaires, et de leur mode de terminaison dans les veines.*

Les absorbans qui entrent dans les premières glandes axillaires passent ensuite successivement de l'une à l'autre et servent à les réunir en formant entre elles, soit des plexus, soit des troncs plus ou moins volumineux. En quittant les glandes les plus supérieures ils se trouvent réduits à trois, quatre ou cinq troncs qui accompagnent la veine sous-clavière jusqu'à son entrée dans le thorax. Là les absorbans du côté gauche se réduisent à un seul ou à deux troncs qui s'engagent derrière le muscle sous-clavier et la première côte, croisent en haut la veine sous-clavière dans laquelle ils s'ouvrent en arrière, tantôt isolément, tantôt en commun avec le conduit thorachique.

Les absorbans axillaires du côté droit se comportent de la même manière. Mais lorsqu'ils sont parvenus dans le thorax ils finissent ordinairement par un seul tronc qui s'ouvre dans l'angle de réunion des veines sous-clavière et jugulaire interne. Ce tronc varie un peu en longueur; souvent il n'a que quelques lignes et jamais il n'a plus d'un demi-pouce. Sa grosseur égale à-peu-près celle du conduit thorachique. Il appartient non-seulement aux absorbans axillaires et par conséquent a ceux des membres supérieurs,

du dos et de l'extérieur du thorax, mais encore à une partie des absorbans hépatiques, pulmonaires, cardiaques, thorachiques internes, et à ceux de la tête et du cou qui nous restent à décrire. C'est ce tronc qu'on a nommé *grand vaisseau lymphatique droit*, et qu'on s'accoutume à regarder comme tenant de son côté la place du conduit thorachique. Cette idée n'est pas tout-à-fait exacte; car, 1°. on peut remarquer, d'après les descriptions déjà faites, que très-souvent les absorbans axillaires gauches s'ouvrent aussi dans les veines par un tronc particulier semblable à celui du côté droit; 2°. que le tronc absorbant droit est très-souvent suppléé par plusieurs vaisseaux isolés qui s'ouvrent tous individuellement dans les veines; 3°. enfin on verra bientôt qu'une partie des absorbans de la tête et du cou se terminent aussi aux veines jugulaire et sous-clavière par des troncs particuliers qui n'ont aucun rapport avec le tronc absorbant du côté droit. On ne peut donc point rapporter tout l'appareil absorbant à deux troncs principaux seulement, et c'est ce qui rendra toujours inexacte et confuse toute description de ces vaisseaux faite des troncs aux rameaux à la manière de celle des artères.

§ VI. *Des Absorbans superficiels de la tête et du cou.*

Ceux de la tête appartiennent ou à l'extérieur du crâne, ou à la face.

Les absorbans superficiels du crâne répandus de toutes parts sous la peau, se réduisent à un

nombre variable de troncs qui descendent sur les côtés de la tête et sur l'occiput en se subdivisant et en s'anastomosant de manière à former diverses aréoles. Raprochés et réunis derrière le pavillon de l'oreille et près de la nuque, ils traversent plusieurs glandes répandues sur les muscles sterno-mastoïdien, trapèze, splenius et occipital. Ces glandes variables en nombre manquent quelquefois presque toutes, et alors les absorbans continuent directement leur trajet en bas. Quelques-uns se portent en arrière sur le trapèze et se confondent avec les cervicaux superficiels dont nous avons parlé ailleurs. Les autres vont gagner les parties latérales et inférieure du cou et se rendent, soit aux glandes qui occupent l'espace triangulaire formé par les muscles trapèze et sterno-mastoïdien, soit à celles qui, un peu plus en devant, environnent la veine jugulaire interne.

Les absorbans superficiels de la face ont tous pour terminaisons immédiates les glandes qui se trouvent au-devant du pavillon de l'oreille et qui occupent l'échancrure parotidienne, ou les glandes repandues le long de la base de la mâchoire inférieure et sur le trajet des vaisseaux faciaux.

Les uns viennent du front et de la moitié externe des paupières. Réunis à plusieurs des absorbans du crâne ils descendent en suivant les vaisseaux temporaux, se divisent, traversent quelques glandes placées au-dessous ou à l'exterieur de la parotide, et continuent en bas leur trajet jusqu'aux glandes qui recouvrent en haut et en dehors le sterno-mastoïdien. Quelques-uns s'enfoncent derrière la parotide et vont s'anastomoser avec les absorbans profonds.

Les autres absorbans faciaux superficiels naissent du milieu du front, de l'extérieur du nez et de la moitié interne des paupières. Ils communiquent avec ceux des parties contenues dans l'orbite, puis se réduisent pour l'ordinaire à deux troncs principaux qui suivent en bas la veine faciale et vont en se subdivisant de nouveau, se terminer à de petites glandes placées sous la base de la mâchoire autour des muscles digastriques. Dans leur trajet ils reçoivent les rameaux absorbans du masseter, des muscles labiaux, des tégumens et du tissu cellulaire graisseux des joues.

Ces glandes absorbantes sous-maxillaires reçoivent encore un grand nombre de rameaux appartenant aux muscles de la partie supérieure et antérieure du cou et même aux muscles de la langue. Elles donnent naissance à de nouveaux absorbans qui descendent obliquement en dehors sur la partie latérale du cou, traversent plusieurs glandes placées sous le sterno-mastoïdien et sur la veine jugulaire interne, et se confondent en grande partie avec les absorbans superficiels du crâne terminés au même endroit. D'autres descendent presque verticalement au-devant du cou, traversent quelques glandes placées sur les côtés du larynx, passent sur la glande thyroïde dont ils reçoivent les rameaux absorbans, et vont aux glandes inférieures du cou se réunir avec les autres absorbans superficiels.

§ VII. *Des Absorbans profonds de la tête et du cou.*

On connoît peu les absorbans de la dure-mère et du cerveau. Ceux qu'on a pu apercevoir sur la dure-mère paroissent suivre le trajet des vaisseaux artériels et se réunir principalement autour de l'artère méningée, pour sortir avec elle du crâne par le trou spléno épineux et se confondre avec les absorbans profonds de la face.

Plusieurs injections fines ont rendu sensibles sur le cerveau, des vaisseaux qui, par leur disposition, par leur forme et leurs nodosités, paroissent être des absorbans. Cependant on a peu de preuves positives sur leur nature. On pense qu'ils suivent les artères carotides et vertébrales et qu'ils sortent du crâne avec elles. Quelques petites glandes absorbantes trouvées dans le canal carotidien semblent confirmer cette opinion. Ainsi on ne peut guère révoquer en doute l'existence des absorbans cérébraux, mais leur histoire anatomique est encore très-obscure.

Les absorbans profonds de la face naissent de l'épaisseur des muscles temporal et masseter, des ptérygoïdiens, de l'intérieur de l'orbite, de la fosse zygomatique. Ceux-là suivent le trajet des vaisseaux sanguins, sortent par les mêmes ouvertures et vont derrière la parotide se rendre aux glandes placées soit dans le fond de l'échancrure parotidienne, soit à la division supérieure de la veine jugulaire interne.

D'autres absorbans nombreux viennent des cavités nasales, du palais et de la partie supérieure du

pharynx. Ils accompagnent également les vaisseaux sanguins et aboutissent avec eux à la partie supérieure et latérale du cou dans les glandes jugulaires. Il en est de même des absorbans de la langue et de ses muscles.

Les absorbans profonds du larynx, de la partie inférieure du pharynx et de l'épaisseur de la glande thyroïde se réunissent dans les glandes inférieures du cou avec les superficiels. Quelques-uns de ceux qui appartiennent à la thyroïde, descendent directement au-devant de la trachée et se confondent avec les absorbans pulmonaires.

Tous les absorbans superficiels profonds, soit de la tête, soit du cou, aboutissent dans les glandes très-nombreuses qui remplissent l'espace triangulaire formé par les muscles trapèze et sterno-mastoïdien, ou dans celles qui environnent la veine jugulaire interne. Ils passent successivement d'une glande à l'autre et forment entre elles divers plexus. Enfin ils se réunissent de l'un et de l'autre côté en un seul tronc. Le tronc gauche, tantôt aboutit dans le conduit thorachique près de sa terminaison, tantôt s'ouvre immédiatement dans la veine sous-clavière ou dans la jugulaire interne. Il en est de même pour le tronc droit qui, tantôt se réunit au tronc absorbant axillaire, tantôt aboutit isolément dans les veines droites.

FIN DU QUATRIÈME VOLUME.

TABLE
DES DIVISIONS
CONTENUES
DANS CE VOLUME.

SUITE DE LA SECONDE PARTIE.

DISCOURS PRÉLIMINAIRE, page v

APPAREIL DE LA RESPIRATION. *Considérations générales*, 1

DES POUMONS, 4

§ Ier. *Disposition. Organisation extérieure*, ibid.
1°. *Volume*, 6
2°. *Pesanteur*, 13
3°. *Forme et Rapports*, 14
4°. *Couleur*, 19
5°. *Densité*, 26
§ II. *Organisation intime*, 27
1°. *Des deux Plèvres*, 28
2°. *Des Conduits aériens*, 41
3°. *Du Système vasculaire des Poumons*, 61
Système capillaire pulmonaire, 67
4°. *Tissu propre des Poumons*, 69

APPAREIL DE LA CIRCULATION. *Considérations générales*, 71

DU PÉRICARDE ET DU COEUR, page 75

ARTICLE PREMIER.

Du Péricarde, 76

§ Ier. *Membrane fibreuse*, 77
§ II. *Membrane séreuse*, 80
Remarques sur l'organisation du Péricarde, 84
Usages du Péricarde, 87

ARTICLE DEUXIÈME.

Du Cœur, ibid.

§ Ier. *Partie droite du Cœur*, 89
Oreillette droite, 90
Ventricule, 94
Organisation de la partie droite du Cœur, 97
§ II. *Partie gauche du Cœur*, 101
Oreillette, 102
Ventricule, 105
Organisation de la partie gauche du Cœur, 108
Mouvemens du Cœur, 112
1°. *Mouvemens des cavités droites*, 116
2°. *Mouvemens des cavités gauches*, 120

SYSTÈME ARTÉRIEL. *Considérations générales*, 123

DE L'AORTE, 128

I. DES ARTÈRES QUE DONNE L'AORTE A SON ORIGINE, 131
Artère cardiaque antérieure, 132
Artère cardiaque postérieure, 133
Disposition générale des Artères cardiaques, 135

II. DES ARTÈRES QUE FOURNIT L'AORTE PAR SA COURBURE, page 136

ARTICLE PREMIER.

Artères carotides primitives, 137

§ Ier. *Artère carotide externe*, 139
Branches antérieures, 140
1°. *Artère thyroïdienne supérieure*, ibid.
2°. *Artère faciale*, 141
3°. *Artère linguale*, 146
Branches postérieures, 148
1°. *Artère occipitale*, ibid.
2°. *Artère auriculaire*, 149
Branche interne. Artère pharyngienne inférieure, 150
Branches qui terminent la carotide externe, 152
1°. *Artère temporale*, ibid.
2°. *Artère maxillaire interne*, 154
Branches que donne la maxillaire interne derrière le col du condyle, 155
Branches que donne la maxillaire interne engagée entre les ptérygoïdiens, 158
Branches que donne la maxillaire interne depuis sa sortie des ptérygoïdiens jusqu'à son entrée dans l'arrière-fond de la fosse zygomatique, 160
Branches que donne la maxillaire interne dans l'arrière-fond de la fosse zygomatique, 162
Remarques sur la distribution de la Carotide externe, 164

§ II. *Artère carotide interne*, 168
Artère ophtalmique, 171
Branches que donne l'Ophtalmique placée en dehors du nerf optique, 172

Branches que donne l'Ophtalmique en passant au-dessus du nerf optique, page 175
Branches que donne l'Ophtalmique placée en dedans du nerf optique, 180
Branches de terminaison de l'Ophtalmique, 183
Artère cérébrale antérieure, 185
Artère cérébrale moyenne, 186
Remarques sur la distribution de la Carotide interne, 188

ARTICLE DEUXIÈME.

Artères des Membres supérieurs, 190
§ Ier. *Artère sous-clavière*, ibid.
Branches supérieures, 192
1°. *Artère vertébrale*, ibid.
Artère basilaire, réunion des deux Vertébrales, 197
Artère cérébrale postérieure, 198
Remarques sur la disposition des artères cérébrales, 199
2°. *Artère thyroïdienne inférieure*, 204
Branches inférieures, 205
1°. *Artère thorachique interne*, ibid.
2°. *Artère intercostale supérieure*, 209
Branches externes, 211
1°. *Artère scapulaire postérieure*, ibid.
2°. *Artère scapulaire supérieure*, 212
3°. *Artère cervicale profonde*, 214
§ II. *Artère axillaire*, 215
Branches que donne l'axillaire en passant sur le thorax, 217
1°. *Artère acromiale*, ibid.
2°. *Artère thorachique externe supérieure*, 218
3°. *Artère thorachique externe inférieure*, 219

Branche que donne l'axillaire dans le creux de l'aisselle, page 220
Artère scapulaire inférieure, ibid.
Branches que donne l'axillaire à la partie supérieure du bras, 222
1°. *Artère circonflexe postérieure*, ibid.
2°. *Artère circonflexe antérieure*, 223
§ III. *Artère brachiale*, 224
Branches antérieures, 225
Branches postérieures, 226
Branches externes, ibid.
Branches internes, ibid.
1°. *Branches internes supérieures*, ibid.
2°. *Branches internes inférieures*, 229
Artère radiale, 230
1°. *Portion antibrachiale*, 231
2°. *Portion carpienne*, 234
3°. *Portion palmaire*, 236
Artère cubitale, 238
1°. *Portion antibrachiale profonde*, 239
2°. *Portion antibrachiale superficielle*, 243
3°. *Portion palmaire*, ibid.
Remarques sur la disposition générale du système artériel des membres supérieurs, 245

III. DES ARTÈRES QUE FOURNIT L'AORTE PAR SA PORTION THORACHIQUE, 249

§ Ier. *Branches antérieures*, ibid.
Artères bronchiques, 250
Artères œsophagiennes, 252
Artères médiastines postérieures, ibid.
§ II. *Branches latérales. Artères intercostales aortiques*, 253

IV. DES ARTÈRES QUE FOURNIT L'AORTE PAR SA PORTION ABDOMINALE, 256

§ Ier. *Artères fournies antérieurement par l'aorte abdominale*, page 257
Artère cœliaque, ibid.
1°. *Artère gastrique supérieure*, 258
2°. *Artère hépatique*, 260
3°. *Artère splénique*, 263
Artère mésentérique supérieure, 265
Branches que donne la mésentérique par sa concavité, 267
Branches que donne la mésentérique par sa convexité, 269
Artère mésentérique inférieure, 272
§ III. *Artère fournies latéralement par l'aorte abdominale*, 275
Artères capsulaires, ibid.
Artères rénales, ibid.
Artères spermatiques, 277
Artères lombaires, 279
1re *Artère lombaire*, 280
2e *Artère lombaire*, 281
3e *Artère lombaire*, ibid.
4e *Artère lombaire*, 282
5e *Artère lombaire*, 283
§ III. *Artères fournies supérieurement par l'aorte abdominale*, ibid.
Artère diaphragmatique droite, 284
Artère diaphragmatique gauche, 285
§ IV. *Artère sacrée moyenne, fournie inférieurement par l'aorte abdominale*, 286
Remarques sur la disposition générale des artères que fournit l'aorte dans le thorax et dans l'abdomen, 288

V. DES ARTÈRES PAR LESQUELLES L'AORTE SE TERMINE, 293

ARTICLE PREMIER.

Artère hypogastrique ou pelvienne, 294

§ Ier. *Branches postérieures*, page 294
Artère iléo lombaire, ibid.
Artère sacrée latérale, 295
Artère fessière, 297
§ II. *Branches antérieures*, 299
Artère ombilicale, ibid.
Artères vésicales, 301
Artère obturatrice, ibid.
§ III. *Branches internes*, 303
Artère hémorroïdale moyenne, ibid.
Artère utérine, 304
Artère vaginale, ibid.
§ IV. *Branches inférieures*, 305
Artère ischiatique, ibid.
Artère honteuse interne, 306

ARTICLE DEUXIÈME.

Artère du membre inférieur, 310
§ Ier. *Artère iliaque externe*, ibid.
Artère épigastrique, 311
Artère circonflexe iliaque, 312
§ II. *Artère fémorale*, 313
Branches internes, 315
Branches externes, 316
Branches antérieures, 317
Branches postérieures. Artère musculaire profonde, 318
§ III. *Artère poplitée*, 322
1°. *Portion poplitée*, 323
Branche articulaire supérieure interne, ibid.
Branche articulaire supérieure externe, 325
Branche articulaire moyenne, ibid.
2°. *Portion jambière*, 326
Branches jumelles, ibid.

Branche articulaire inférieure interne, page 327
Branche articulaire inférieure externe, ibid.
Artère tibiale antérieure, 328
Artère pédieuse, 330
Tronc tibial postérieur, 333
1°. *Artère péronière*, ibid.
2°. *Artère tibiale postérieure*, 335
1°. *Artère plantaire interne*, 336
2°. *Artère plantaire externe*, 337
Remarques sur la diposition générale des artères du bassin et des membres inférieurs, 339

SYSTÈME VEINEUX. *Considérations générales*, 342

I. DES VEINES CARDIAQUES, 348

1°. *Veines cardiaques postérieures*, ibid.
2°. *Veines cardiaques antérieures*, 351

II. DE LA VEINE CAVE SUPÉRIEURE, ibid.

1°. *Veine thorachique interne droite*, 353
2°. *Veine thyroïdienne inférieure droite*, ibid.
3°. *Veine azygos*, 354
§ Ier. *Des Veines sous-clavières*, 356
Veines fournies par la seule sous-clavière gauche, 358
1°. *Veine thorachique interne gauche*, ibid.
2°. *Veine thyroïdienne inférieure gauche*, ibid.
Veines fournies par les deux sous-clavières, 359
1°. *Veines intercostales supérieures*, ibid.
2°. *Veine vertébrale*, 361

3°. *Veine jugulaire externe*, page 362
Veine maxillaire interne, 365
Veine temporale, ibid.

§ II. *De la Veine jugulaire interne*, 366
1°. *Veine thyroïdienne supérieure*, 367
2°. *Veine faciale*, ibid.
3°. *Veine linguale*, 369
4°. *Veine pharyngienne*, 370
5°. *Veine occipitale*, ibid.

§ III. *Du Système veineux cérébral, suite de la veine jugulaire interne*, 371
I. *Sinus latéraux*, 375
1°. *Sinus pétreux nés en devant du sinus latéral*, 377
Sinus transverse, réunion des sinus pétreux, 379
Sinus caverneux, nés de chaque côté de la réunion des sinus pétreux et transverse, ibid.
Sinus coronaire, placé entre les caverneux, 384
2°. *Sinus occipitaux, nés en arrière de chaque sinus latéral*, 385
Veines latérales et inférieures du cerveau, terminées dans les sinus latéraux, 386
Veines cérébelleuses inférieures, terminées dans les sinus latéraux, 387
II. *Confluent des Sinus*, ibid.
III. *Sinus longitudinal*, 389
Veines cérébrales supérieures, 391
IV. *Sinus droit*, 393
Veine inférieure de la faux, 394
Veines des cavités cérébrales, 395
Veines cérébelleuses supérieures, 397
Trajet du sang dans le système veineux cérébral, ibid.

§ IV. *Des Sinus vertébraux*, page 399
1°. *Disposition des sinus vertébraux dans le canal vertébral proprement dit*, 400
2°. *Disposition des sinus vertebraux dans le canal sacré*, 403
§ V. *De la Veine axillaire*, 404
1°. *Veine céphalique*, ibid.
2°. *Veine basilique*, 406
Veines brachiales, 408

III. DE LA VEINE CAVE INFÉRIEURE, 409

1°. *Veines diaphragmatiques inférieures*, 410
2°. *Veines hépatiques*, 411
3°. *Veines capsulaires*, 413
4°. *Veines rénales*, ibid.
5°. *Veines spermatiques*, 414
6°. *Veines lombaires*, 416
7°. *Veine sacrée moyenne*, 417

IV. DES VEINES ILIAQUES PRIMITIVES, ibid.

§ Ier. *De la Veine hypogastrique*, 418
1°. *Veines sacrées latérales*, ibid.
2°. *Veines vésicales*, 419
§ II. *De la Veine iliaque externe*, 421
§ III. *De la Veine fémorale*, ibid.
Veine saphène interne, 422
§ IV. *De la Veine poplitée*, 423
Veine saphène externe, 424

APPAREILS DE L'ABSORPTION. *Considérations générales*, 425

DES GLANDES DES ABSORBANS, 431

§ Ier. *Des Glandes des membres inférieurs*, 432

§ II. *Des Glandes du bassin*, page 433
§ III. *Des Glandes abdominales*, 434
§ IV. *Des Glandes thorachiques*, 436
§ V. *Des Glandes des membres supérieurs*, 438
§ VI. *Des Glandes de la tête et du cou*, ibid.

DES ABSORBANS, 440

ARTICLE PREMIER.

Des Absorbans qui se terminent au conduit thorachique, ibid.

§ Ier. *Des Absorbans des membres inférieurs*, ibid.
1°. *Absorbans superficiels*, ibid.
2°. *Absorbans profonds*, 444
§ II. *Des Plexus inguinal, iliaque externe et hypogastrique*, 447
§ III. *Des Absorbans des parois du bassin et de l'abdomen*, 449
§ IV. *Des Absorbans des organes génitaux et urinaires*, 451
1°. *Absorbans des organes génitaux*, ibid.
2°. *Absorbans des organes urinaires*, 453
§ V. *Des Absorbans des viscères abdominaux*, 454
1°. *Absorbans des intestins*, ibid.
2°. *Absorbans de l'estomac*, 457
3°. *Absorbans de la rate et du pancréas*, 459
4°. *Absorbans du foie*, ibid.

ARTICLE DEUXIÈME.

Du Conduit thorachique, 464
Des Absorbans que le conduit thorachique reçoit pendant son trajet dans le thorax, 467

ARTICLE TROISIÈME.

Des Absorbans qui se terminent en partie dans le conduit thorachique, en partie dans les veines gauches ou droites par des troncs particuliers, page 469

§ Ier. *Des Absorbans des poumons*, ibid.

§ II. *Des Absorbans thorachiques internes, diaphragmatiques, péricardins, thymiques et cardiaques*. 471

§ III. *Des Absorbans superficiels des membres supérieurs et de l'extérieur du tronc, terminés aux glandes axillaires*, 473

1°. *Absorbans superficiels des membres supérieurs*, ibid.

2°. *Absorbans superficiels du thorax et de la moitié sus-ombilicale des parois de l'abdomen*, 475

3°. *Absorbans superficiels du dos*, 476

§ IV. *Des Absorbans profonds des membres supérieurs, terminés aux glandes axillaires*, 477

§ V. *Des Absorbans qui partent des glandes axillaires, et de leur mode de terminaison dans les veines*, 479

§ VI. *Des Absorbans superficiels de la tête et du cou*, 480

§ VII. *Des Absorbans profonds de la tête et du cou*, 483

Fin de la Table du quatrième volume.